



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Αθήνα, 13 - 12 - 2006**

**Αριθ. πρωτ.: 123942**

**Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 17671 – ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 9212090  
Πληροφορίες: Γ.Τσιάμπα  
Τηλέφωνο: 210 9212164**

**ΠΡΟΣ: 1. ΦΑΡΜΑ ΧΗΜ Α.Β.Ε.Ε.  
Τ.Θ. 26, Τ.Κ. 57022  
ΒΙ.ΠΕ.Θ. – ΣΙΝΔΟΣ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
(με απόδειξη)**

**2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  
Διευθύνσεις Γεωργίας (με e-mail)  
Έδρες τους**

**3. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό  
Ινστιτούτο  
Τμήμα Ελέγχου  
Γεωργικών Φαρμάκων  
Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά**

**4. Τμήματα Β, Γ, Ε της Δ/σής μας**

**ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.**

**ΘΕΜΑ: “Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό  
προϊόν (ζιζανιοκτόνο)  
FENOFARM 5.5 EW”**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Ο**

**ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) για “την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί” και ειδικότερα το άρθρο 8 (παρ. 2 και 3) και 9 (παρ. 1).
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ 674/Β/13.9.88) Απόφασή μας, «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το κεφάλαιο Β (παρ. 1).
3. Τη με αριθ. 83345/28.7.88 (ΦΕΚ 599/Β/24.8.88) Απόφασή μας, όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων» όπως ισχύει σήμερα.
4. Τη με αριθ. 265/2002/ 3.9.2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19.9.2002) ΚΥΑ με θέμα την “ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων”, καθώς και τη με αριθ. 108114/30.7.2003 (ΦΕΚ 1121/Β/8.8.2003) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
5. Τη με αριθ.119409/6-6-2006 Απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 7781 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) FENOXAPROP-P-ETHYL ANOPIΓKAXHM 5.5 EW.
6. Το με αριθμ. 123951/14-6-2005 μας στο οποίο αναφέρονται τα εθνικά ανώτατα όρια υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας fenoxarprop-p-ethyl.
7. Τη αριθ. Υ132/11.10.2004 (Β’ 1533/14-10-2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό»

8. Τη με αριθμ. 301509/19-11-2004 (B'1762/30-11-2004) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της εξουσίας να υπογράφουν με εντολή Υφυπουργού ».
9. Τις από 29-4-2004 και 28-11-2006 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 28-11-2006 πρωτόκολλο εξέτασης φακέλου της εταιρείας ΦΑΡΜΑ ΧΗΜ Α.Β.Ε.Ε

## Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

**I.** Χορηγούμε στην εταιρεία ΦΑΡΜΑ ΧΗΜ Α.Β.Ε.Ε. οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά με αριθμό **7806** του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1. Εμπορικό όνομα:** FENOFARM.

**2. Μορφή:** Εναιώρημα λάδι σε νερό (EW).

**3. Εγγυημένη σύνθεση:** Fenoxarprop-p-ethyl 5.5% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 94.35 % β/β

Περιέχει αντιφυτοτοξικό παράγοντα Fenchlorazole ethyl 2.75% β/β

**4. Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία : 95% min

**5. α. Παρασκευαστής της δ.ο:** SINOCHEM NINGBO LTD, Κίνας.

**β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. :** SINOCHEM NINGBO LTD, Κίνας (η Δ/ση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στην Δ/ση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής και είναι εμπιστευτική ).

**γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο. :** Όπως προσδιορίζονται στο σημείο ζ ( ΕΝΤΥΠΙΑ IVa, IVb και V) της αίτησης με ημερομηνία 29-4-2004 και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

**6. α. Κάτοχος της έγκρισης :** ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ- ΒΙ.ΠΕ.Σίνδου, Θεσσαλονίκη

**β. Υπεύθυνος επικοινωνίας :** -

**γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση :** Ο κάτοχος της έγκρισης.

**7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ-ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Θεσσαλονίκη.

**8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** SINOCHEM NINGBO LTD, Κίνας

**9.α. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ-ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Θεσσαλονίκη.

**β.Συσκευασία: 9α. Είδος-Μέγεθος:** α.1 Φιάλες των 250, 500 κ.εκ. και 1 λίτρο

: α.2 Δοχεία των 3 (τριών), 5 (πέντε) και 10 λίτρων.

**9β. Υλικό συσκευασίας:** β1. COEX, Αλουμίνιο

β2. COEX

**Σύνολο συσκευασιών : 9**

**10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται-Τρόπος δράσης:**

Μεταφυτρωτική καταπολέμηση αγροστωδών ζιζανίων στο σιτάρι.

Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και μεταφέρεται στις ρίζες και τα ριζώματα.

**11. Τρόπος εφαρμογής:**

Ψεκασμός φυλλώματος με 10-30 λίτρα νερό στο στρέμμα με πίεση 2.5-3 ατμ. (38-45 PSI) και μπεκ τύπου σκούπας.

## 12. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού κατά τα 3/4 με νερό. Ανακινείτε καλά τη φιάλη συσκευασίας και προσθέστε την απαιτούμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας συγχρόνως το ψεκαστικό υγρό. Στην περίπτωση που αδειάζει η φιάλη, τότε ξεπλύνετε τρεις φορές και ρίξτε το νερό του ξεπλύματος στο δοχείο του ψεκαστικού. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό με συνεχή ανάδευση.

## 13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ./στρ.)	Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.)	ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
Σιτάρι (σκληρό και μαλακό)	Αγρωστώδη ζιζάνια	125-150	10-30	Από το στάδιο των 2 φύλλων μέχρι και το σχηματισμό του δεύτερου κόμβου των ζιζανίων.  Ειδικά στη φάλαρη συνιστάται να εφαρμόζεται μέχρι τα μέσα του αδελφώματος.	1

### Παρατηρήσεις:

#### 1. α) Δεν καταπολεμά τα ζιζάνια:

Αγρόπυρο (*agropyron repens*)  
Βρόμος (*bromus spp*)  
Φεστούκα (*festuca spp*)  
Αγριοκρίθαρο (*hordeum murinum*)  
Δεματόχορτο (*imperata cylindrica*)  
Ηρα (*lolium spp.*)  
Κοινή πόα (*poa annua*)  
Λεία λειβαδοπόα (*poa pratensis*)  
Όλα τα κυπερώδη (*cyperaceae*)  
και όλα τα πλατύφυλλα

#### β) Ευαίσθητα ζιζάνια:

Σετάρια (*setaria spp.*)  
Τραχεία λειβαδοπόα (*poa trivialis*)  
Αλεπονουρά (*alopcurus spp.*)  
Αγριοβρώμη (*avena spp.*)  
Φάλαρη (*phalaris spp.*)  
Ανεμόχορτο (*apera spica-venti*)

2. Οι μεγάλες δόσεις εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια ξεπεράσουν το στάδιο του αδελφώματος καθώς επίσης και για την καταπολέμηση της φάλαρης.

3. Να μην ψεκάζετε όταν οι καλλιέργειες δεν είναι εύρωστες.

4.Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκτόνα (SZ):

SZ1 Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.

- SZ2 Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.
- SZ3 Μη σπέρνετε και μη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια πριν περάσουν 30 ημέρες από την εφαρμογή του ή προκειμένου για σιτηρά 120 ημέρες.
- SZ5 Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
- SZ7 Μην ψεκάσετε όταν φυσάει.
- SZ8 Μην διπλοψεκάσετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις.
- SZ11 Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνίσταται.
- SZ12 Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε τα ψεκαστικά μέσα με νερό και απορρυπαντικό

#### 14. Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στο σιτάρι, στη σίκαλη και στο triticale. Είναι φυτοτοξικό για τα υπόλοιπα σιτηρά.

#### 15. Συνδυαστικότητα:

Συνδυάζεται με diclofor-methyl, για ταυτόχρονη καταπολέμηση και του Lolium spp. (Ηρα). Για ταυτόχρονη καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων συνδυάζεσθε με bromoxynil octanoate, ioxynil octanoate, mecoprop Εστέρα, MCPA Εστέρα, clorsulfuron .

#### 16. Σήμανση τοξικότητας: Xi-Ερεθιστικό N-Επικίνδυνο για το περιβάλλον

#### 17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

**R36/38** Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα

#### 18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):

**R50/53** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

#### 19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S & SY φράσεις):

- S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από τα παιδιά.
- S13** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- S20/21** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.
- S24/25** Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα.

**Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης**

#### 20. Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω εισπνοής: μεταφέρετε το θύμα στον καθαρό αέρα και κρατήστε το ήρεμο.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα βρεγμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Καλέστε γιατρό αν χρειασθεί.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό επι 15 λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης, καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε του την ετικέτα.

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777**

#### 21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

- S60/61** Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά την διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
- SO4** Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή την συσκευασία του.

**SO5** Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή και μην χρησιμοποιείτε ψεκασμένα φυτά για διατροφή ζώων.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:**

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα ( τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής , για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**22. Απαγορεύσεις (Α φράσεις):**

**A1** Απαγορεύεται η εφαρμογή του με αεροψεκασμούς.

**A2** Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

**23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):-**

**Π1-Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: --**

**24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:**

Στην αρχική, κλειστή συσκευασία του σε ξηρό χώρο και σε θερμοκρασία 5-30°C διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια. (Η ημερομηνία λήξης δεν θα αναγράφεται στην ετικέτα).

**II. Ετικέτα:**

**α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97), τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19-9-2002) ΚΥΑ και με την παρούσα Απόφαση.

**β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2010.**

**β.** Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσής της.

**Ε.Υ.  
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ**