



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Αθήνα 23 - 10 - 2008

Αριθ. πρωτ.: 123463

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Τ.Κ.: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Γ. Τσιάμπα
Τηλέφωνο: 210 928 7228
FAX: 210 92 12 090**

**ΠΡΟΣ: ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.,
Δ. Γληνού 32,
542 49 - Θεσσαλονίκη
(με απόδειξη)**

ΚΟΙΝ.: 1) Γραφείο κ. Υπουργού

2) Γραφείο Γεν. Γραμ. κ. Κ. Σκιαδά

**3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο**

**Τμήμα Ελέγχου Γεωργ. Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά**

4) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.

**5) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Δ/σεις Αγροτικής Ανάπτυξης**

6) Τμήματα Β', Γ', Ε' της Δ/σής μας

7) Γραμματεία της Δ/σής μας

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης
στο φυτοπροστατευτικό προϊόν,
(ζιζανιοκτόνο) YPSILON DORIAN 50 SC.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) για "την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί" και ειδικότερα το άρθρο 8 (παρ.2 και 3) και 9 (παρ.1).
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ 674/Β/13.9.88) Απόφασή μας, «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το κεφάλαιο Β (παρ. 1).
3. Τη με αριθ. 83345/28.7.88 (ΦΕΚ 599/Β/24.8.88) Απόφασή μας, όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων» όπως ισχύει σήμερα.
4. Τη με αριθ. 265/2002/ 3.9.2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19.9.2002) ΚΥΑ με θέμα την "ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων", όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 73/2-6-2006 (ΦΕΚ 832/Β/6-7-2006) ΚΥΑ, καθώς και τη με αριθ. 108114/30.7.2003 (ΦΕΚ 1121/Β'/8.8.2003) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 149/2008 της Επιτροπής της 29-1-2008 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση των παραρτημάτων II, III και IV για τον καθορισμό ανώτατων ορίων καταλοίπων στα προϊόντα που καλύπτονται από το παράρτημα I του κανονισμού».

11. Τρόπος εφαρμογής:

Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους με 30-50λίτρα νερό / στρέμμα, με πίεση μικρότερη από 3 ατμ. (45 psi).

12. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

- Γεμίστε το ψεκαστικό με νερό μέχρι την μέση.
- Αραιώστε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό.
- Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση.
- Ξεπλύνετε το δοχείο με νερό τουλάχιστον 3 φορές, ρίχνοντας τα αποπλύματα στο ψεκαστικό.

13. Φάσμα δράσης:

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΣΤΟΧΟΙ	Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα ανά στρέμ.	Δόσεις κ.εκ. ανά στρ.	Μέγιστ. Αρ. Εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο.	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αραβόσιτος	Ετήσια πλατύφυλλα και μερικά αγρωστώδη ζιζάνια ⁽¹⁾	30-50	150-200 ⁽²⁾	1	Προφυτρωτικά ⁽³⁾ μετά τη σπορά της καλλιέργειας ή Μεταφυτρωτικά , έως τα 3-5 φύλλα (περίπου 10 εκ. ύψος)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(1) ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ

Πλατύφυλλα:

Βλήτο τραχύ (*Amaranthus retroflexus*)

Καφέλλα (*Capsella bursa-pastoris*)

Λουβουδιά (*Chenopodium album*)

Αντράκλα (*Portulaca oleracea*)

Κοινή Πόα *Poa annua*)

Πολυκόμπι (*Polygonum aviculare*)

Αγριοσινάπι (*Sinapis arvensis*)

Αγριοντοματιά (*Solanum nigrum*)

Ζωχός (*Sonchus oleraceus*)

Στελλάρια (*Stelaria media*)

Αγριοραπανίδα (*Raphanus raphanistrum*).

Ανθεκτικά ζιζάνια:

Αγριοπαμπακιά (*Abuthylon theophrasti*)

Αγριομελιτζάνα (*Xanthium strumarium*)

Τάτουλας (*Datura stramonium*)

Καθώς και πολυετή ζιζάνια που πολλαπλασιάζονται με ριζώματα, κονδύλους ή βολβούς.

(2) Η χαμηλή δόση να εφαρμόζεται σε ελαφράς, ενώ η υψηλότερη σε μέσης ή βαριάς σύστασης εδάφη.

(3) Μετά την εφαρμογή, εάν δεν ακολουθήσει βροχή τουλάχιστον 10-15 χιλιοστών εντός δύο εβδομάδων, να γίνεται ενσωμάτωση με ελαφρύ πότισμα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ (SZ φράσεις):

(SZ1) : Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.

(SZ2): Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.

S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις): -Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π-φράσεις):

(Π1) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 60 ημέρες

24. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:

Να αποθηκεύεται σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97), τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19-9-2002) ΚΥΑ και με την παρούσα Απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2012.

β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσής της.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



Κ. ΣΚΙΑΛΑΣ