



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 29-12-2008

Αριθ. πρωτ: 126249

Ταχ. Δ/ση : Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας : 176 71 – Αθήνα
Πληροφορίες : Αλ. Φονταρά
Τηλέφωνο : 210 92 87 227
FAX : 210 92 12 090

ΠΡΟΣ: κ. Κ. Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
Δ. Γούναρη 4, 54621 Θεσσαλονίκη
(με απόδειξη)

ΚΟΙΝ.: 1) Γραφείο κ. Υπουργού
2) Γραφείο Γεν. Γραμ. κ. Κ. Σκιαδά
3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά
4) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. - Έδρες τους
5) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Δ/σεις Αγροτικής Ανάπτυξης
6) Τμήματα Β', Γ' & Ε' της Δ/σής μας
7) Γραμματεία της Δ/σής μας

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο
φυτοπροστατευτικό προϊόν
(μυκητοκτόνο- επενδυτικό σπόρων)
VITAVAX-C 37,5/37,5 WP»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) για “την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί και ειδικότερα το άρθρο 8 (παρ. 2 και 3) και 9 (παρ.1).
2. Τη με αριθ. 85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων» Κεφ. Β., παρ. 1.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», όπως ισχύει σήμερα.
4. Τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19-9-2002) ΚΥΑ με θέμα την «ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 73/2-6-2006 (ΦΕΚ 832/Β/6-7-2006) ΚΥΑ καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β'/8-8-2003) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
5. Τη με αριθ. 2008/934/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής της 5^{ης} Δεκεμβρίου 2008, που δημοσιεύθηκε στο τεύχος 1333/11-14/11.12.2008 της επίσημης εφημερίδας της Ε.Ε., σχετικά με τη μη καταχώριση ορισμένων δραστικών ουσιών στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν αυτές τις ουσίες.

6. Τη με αριθμό 75698/11.07.1995 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 6627 οριστική έγκριση κυκλοφορίας αλλά ανακλήθηκε για τυπικούς λόγους, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν VITAVAX-C 37.5/37.5 WP, το οποίο περιέχει τις ίδιες δραστικές ουσίες, στην ίδια περιεκτικότητα και είναι ίδιας μορφής με το αιτούμενο σκεύασμα.
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 149/2008 της Επιτροπής της 29-1-2008 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση των παραρτημάτων II, III και IV για τον καθορισμό ανώτατων ορίων καταλοίπων στα προϊόντα που καλύπτονται από το παράρτημα I του κανονισμού».
8. Το Π.Δ. 206/2007 (ΦΕΚ 232 Α/19-9-2007) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Τη με αριθ. 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β/18-1-2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με “Εντολή Υπουργού”».
10. Τις από 9-5-2008 και 15-12-2008 αιτήσεις του κ. Κ. Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, καθώς και το από 15-12-2008 πρωτόκολλο εξέτασης του σχετικού φακέλου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά με αριθμό **60.244** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο- επενδυτικό σπόρων) με τα ακόλουθα στοιχεία:

- 1. Εμπορικό όνομα:** VITAVAX-C 37,5/37,5 WP
- 2. Μορφή:** Βρέξιμη σκόνη χρώματος κόκκινου (WP)
- 3. Εγγυημένη σύνθεση:** carboxin 37,5% β/β
captan 37,5% β/β
βοηθητικές ουσίες: 21,02 % β/β
- 4. Περιεκτικότητα** των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία:
carboxin: 97% min., captan: 93% min.
- 5. α. Παρασκευαστής των δ.ο.:** carboxin: CHEMTURA CORPORATION , ΗΠΑ
captan: MAKTHESHIM CHEMICAL WORKS LTD, Ισραήλ
- β. Εργοστάσιο παρασκευής των δ.ο.:** carboxin: CHEMTURA CANADA Co, Καναδάς
captan: MAKTHESHIM CHEMICAL WORKS LTD, Ισραήλ
(Οι διευθύνσεις των εργοστασίων έχουν δηλωθεί στη Δ/ση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής και είναι εμπιστευτικές).
- 6. α. Κάτοχος της έγκρισης:** Κ.Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. Γούναρη 4, 546 21 Θεσσαλονίκη
- β. Υπεύθυνος επικοινωνίας :** --
- γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:** Κ.Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. Γούναρη 4, 546 21 Θεσσαλονίκη
- 7. α. Παρασκευαστής του σκευάσματος :** CHEMTURA CORPORATION, ΗΠΑ
- β. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** CHEMTURA ITALY Srl., Ιταλία
- 8. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ , Οινόφυτα Βοιωτίας
- 9. Συσκευασία: α. Είδος-Μέγεθος:** α1. Σακούλα μέσα σε κουτί 200 γρ.
α2. Σακίδια των 200, 300 και 400 γρ.
α3. Σάκοι των 20, 25 και 30 κιλών
- β. Υλικό συσκευασίας:** β1. Σακούλα P/E, κουτί χάρτινο
β2. Σακίδια P/E ή σύνθετα πάχους από 60-100 μ.
β3. Σάκοι τριπλοί χάρτινοι με εσωτερικό P/E ή polybags με εσωτερικό P/E.
- 10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:**
Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση, για απολύμανση σπόρων σποράς.
- 11. Τρόπος εφαρμογής:** Εφαρμόζεται με επένδυση των σπόρων σποράς.

Η επένδυση των σπόρων γίνεται:

α) Μέσα σε μηχανήματα για απολύμανση μεγάλων ποσοτήτων σπόρων με συνεχή λειτουργία με τη χρήση ενός πυκνού πολτού (slurry) στις παρακάτω αναλογίες και με την εξής διαδικασία:

Στην ποσότητα του νερού που απαιτείται κατά περίπτωση, προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος VITAVAX-C 37,5/37,5 WP μέσα στο δοχείο της μηχανής.

Αφήνουμε για λίγο χρόνο μέχρι να διαλυθεί η βρέξιμη σκόνη και στη συνέχεια βάζουμε σε λειτουργία το σύστημα ανάδευσης για μερικά λεπτά της ώρας.

β) Με χρήση πιο απλών συσκευών (π.χ. μιας μπετονιέρας βαρελιού ή και πλαστικών σάκων), πρέπει αρχικά να διαβραχεί ο σπόρος με λίγο νερό, με ανάμιξη για 1 λεπτό της ώρας. Ακολουθεί προσθήκη της αντίστοιχης ποσότητας VITAVAX-C 37,5/37,5 WP και ανάμιξη επί 3-5 λεπτά της ώρας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Να μην χρησιμοποιούνται οι επενδεδυμένοι σπόροι για τροφή ανθρώπων ή ζώων καθώς και για παραγωγή βαμβακελαίου ή βαμβακοπλακούντα (βαμβακόπιττα).

Στους σάκους που συσκευάζονται απόροι επενδεδυμένοι, να αναγράφεται η φράση «Οι σπόροι αυτοί είναι επενδεδυμένοι με carboxin και captan. Να μην χρησιμοποιηθούν για τροφή ανθρώπων ή ζώων ή για παραγωγή βαμβακελαίου ή βαμβακοπλακούντα».

12. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: ---

13. Φάσμα δράσης:

Απολύμανση σπόρων

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	ΔΟΣΕΙΣ γρ. / 100 κιλά σπόρου	Όγκος νερού κ.εκ./100 κιλά σπόρου	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αραβόσιτος	Ριζοκτονίαση (<i>Rhizoctonia solani</i>) Πύθιο (<i>Pythium butleri</i>) Φουζαρίωση (<i>Fusarium moniliforme</i>) Γυμνοί άνθρακες (<i>Ustilago maydis</i>) Ελμινθοσπορίωση (<i>Helminthosporium sp.</i>)	300	500	1	2-3 ημέρες πριν τη σπορά.
Βαμβάκι	Ριζοκτονίαση (<i>Rhizoctonia solani</i>) Πύθιο (<i>Pythium spp</i>) Φουζαρίωση (<i>Fusarium spp</i>)	300	500	1	2-3 ημέρες πριν τη σπορά.
Αραχίδα	Ριζοκτονίαση (<i>Rhizoctonia solani</i>)	500	500	1	2-3 ημέρες πριν τη σπορά.

Φασόλι	Ριζοκτονίαση (<i>Rhizoctonia solani</i>) Πύθιο (<i>Pythium spp</i>) Φουζαρίωση (<i>Fusarium spp</i>)	400	500	1	2-3 ημέρες πριν τη σπορά.
Αρακάς	Ριζοκτονίαση (<i>Rhizoctonia solani</i>) Πύθιο (<i>Pythium spp</i>) Φουζαρίωση (<i>Fusarium spp</i>)	400	500	1	2-3 ημέρες πριν τη σπορά.

14. Φυτοτοξικότητα:

Δεν προκαλεί μείωση της βλαστικότητας των σπόρων στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.

15. Συνδυαστικότητα: Εφαρμόζεται μόνο του. Δεν συνδυάζεται με άλλο φυτοπροστατευτικό προϊόν.

16. Σημάνσεις : Xn - Επιβλαβές, N - Επικίνδυνο για το Περιβάλλον

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

R40 – Υποπτο καρκινογένεσης.

R43 – Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

R48/22 – Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO και R φράσεις):

R50/53 – Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

19. Προφυλάξεις για τον χρήστη και την δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

S1/2 – Να φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά

S13 – Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές

S20/21 – Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε

S36/37/39 – Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/ προσώπου

S45 – Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό).

SY8 Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

20. Πρώτες βοήθειες - αντίδοτο :

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείξτε την ετικέτα.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

S60 Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα.

S61 – Αποφύγετε την ελευθερωσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας

SP1 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακίδια, σάκοι), μαζί με τα κουτιά αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

22.Απαγορεύσεις (A φράσεις): Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

23.Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: ---

(Π3) Μη χρησιμοποιείτε σπόρους επενδεδυμένους με VITAVAX-C 37.5/37.5 WP ως τροφή ή ζωοτροφή.

Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)	Προϊόντα	MRLs (mg/kg)
carboxin, captan	Έχουν καθοριστεί Ευρωπαϊκά MRLs στον Κανονισμό 396/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008	

24.Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης :

Διατηρείται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε θερμοκρασίες από 15-25°C, σε χώρο καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97), τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19-9-2002) ΚΥΑ και με την παρούσα Απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2010.

β. Η αποθήκευση, διάθεση στην αγορά και χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων του ανωτέρω φυτοπροστατευτικού προϊόντος, από πρόσωπα διάφορα του κατόχου της έγκρισης, επιτρέπεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011.

Ε.Υ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ

Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ