



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Αθήνα 23 - 12 - 2008

Αριθ. πρωτ.: 125344

**Ταχ.Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71, Αθήνα
FAX: 210-92 12 090
Πληροφορίες: Γ. Τσιάμπα
Τηλέφωνο: 210-928 7228**

**ΠΡΟΣ: Νικόλαο Κοσμίδη,
Θέση Ποταμιά, Τ.Κ. 32011
Οινόφυτα Βοιωτίας
(με απόδειξη)**

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης
στο φυτοπροστατευτικό προϊόν,
(ζιζανιοκτόνο) ROCKET 90 WG.**

**ΚΟΙΝ.: 1) Γραφείο κ. Υπουργού
2) Γραφείο Γεν. Γραμ. κ. Κ. Σκιαδά
3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά
4) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. - Έδρες τους
5) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Δ/σεις Αγροτικής Ανάπτυξης
6) Τμήματα Β', Γ' & Ε' της Δ/σής μας
7) Γραμματεία της Δ/σής μας**

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) για “την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί” και ειδικότερα το άρθρο 8 (παρ. 2 και 3) και 9 (παρ. 1).
2. Τη με αριθ.85418/24-8-88 (ΦΕΚ674/Β/13-9-88) απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων » Κεφ Β.παρ.1.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων» όπως ισχύει σήμερα.
4. Τη με αριθ. 265/2002/ 3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19.9.2002) ΚΥΑ με θέμα την “ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων”, καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β'/8-8-2003) απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 149/2008 της Επιτροπής της 29-1-2008 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση των παραρτημάτων II, III και IV για τον καθορισμό ανώτατων ορίων καταλοίπων στα προϊόντα που καλύπτονται από το παράρτημα I του κανονισμού».

6. Τη με αριθ. 2008/934/EK Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 5/12/2008, η οποία δημοσιεύθηκε στο τεύχος L 333/11/11-12-2008 της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με “τη μη καταχώριση ορισμένων δραστικών ουσιών στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν αυτές τις ουσίες.
7. Τη με αριθμό 116186/21-2-2007 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 7812 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο όμοιας περιεκτικότητας και μορφής φυτοπροστατευτικό προϊόν COTORAN 90 WG που περιέχει την ίδια δραστική ουσία.
8. Το Π.Δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 232 Α’).
9. Τη με αριθ. 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β’/18-1-2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με “Εντολή Υπουργού”».
10. Τις από 22-10-2008 και 09-12-2008 αιτήσεις του κ. Νικόλαο Κοσμίδη, και με το από 09-12-2008 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

I. Χορηγούμε στον κ. Νικόλαο Κοσμίδη, οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά με αριθμό **7898** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** ROCKET 90 WG.
2. **Μορφή:** Βρέξιμοι κόκκοι WG
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** fluometuron 90%β/β
Βοηθητικές ουσίες: 4,25% β/β
4. **Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 94%min
5. **α. Παρασκευαστής της δ.ο.** Agan Chemical Manufacturers Ltd, ΙΣΡΑΗΛ.
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Agan Chemical Manufacturers Ltd, ΙΣΡΑΗΛ.
γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: Όπως προσδιορίζονται στο τμήμα ζ (Εντυπα IVa, IVb και V) της αίτησης με ημερομηνία 22-10-2008 (αριθ. πρωτ. ΥΑΑ&Τ 123361) και παραμένουν στα αρχεία της αρμόδιας αρχής
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** Νικόλαος Κοσμίδης, Θέση Ποταμιά, Τ.Κ. 32011 Οινόφυτα Βοιωτίας.
β. Υπεύθυνος επικοινωνίας: -
γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: Νικόλαος Κοσμίδης, Θέση Ποταμιά, Τ.Κ. 32011 Οινόφυτα Βοιωτίας
7. **α. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Νικόλαος Κοσμίδης, Θέση Ποταμιά, Τ.Κ. 32011 Οινόφυτα Βοιωτίας.
β. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Agan Chemical Manufacturers Ltd, ΙΣΡΑΗΛ
8. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ- Οινόφυτα, Βοιωτίας
9. **Συσκευασία: 9^α. Είδος – Μέγεθος:** Κουτιά και Σακίδια των διακοσίων πενήντα (250), τριακοσίων (300), πεντακοσίων (500), εξακοσίων (600), εννιακοσίων (900) γρ. και ενός και οχτώ (1,8), δύο και επτά (2,7) και 3,6 (4 x 900) κιλών.
9β. Υλικό: Κατάλληλα κουτιά χάρτινα με εσωτερικό σακίδιο PE.
Σύνθετα σακίδια PE/Πολυεστέρας ή PE/Αλουμινίου/Πολυεστέρας ή PE/Πολυαμιδίου.
10. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:** Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση μονοετών πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων. Δρα διασυστηματικά. Απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και δευτερεύοντος από το φύλλωμα. Παρεμποδίζει την φωτοσύνθεση.

11. Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκάσμος του εδάφους με 30-60 λίτρα νερό/στρ, προσπαρτικά με ενσωμάτωση στα 5 - 8 εκ. με δισκοσβάρνα ή φρέζα ή αμέσως μετά τη σπορά και ακολουθεί ελαφρό πότισμα ή μεταφυτρωτικά, με κατευθυνόμενο ψεκάσμο στην βάση των βαμβακοφύτων όταν έχουν ύψος 10-15 εκατοστά .

Η εφαρμογή να γίνεται με μπεκ τύπου σκούπας, πίεση ψεκαστικού μέχρι 3 atm. (45psi) και με σταθερή ταχύτητα 4 περίπου χιλιομέτρων ανά ώρα, υπό συνεχή ανάδευση.

12. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό και συνεχίζουμε την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού.

13. Φάσμα δράσης:

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ	ΔΟΣΗ κ.εκ./στρ.	Όγκος ψεκαστικού υγρού Λίτρα/στρ.	ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Βαμβάκι	Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια.	140-270	30-60	Προσπαρτικά με ενσωμάτωση στα 5-8 εκ. με δισκοσβάρνα ή φρέζα ή Αμέσως μετά τη σπορά. Ακολουθεί ελαφρό πότισμα	1
		110	30-60	Μεταφυτρωτικά όταν το βαμβάκι έχει ύψος 10-15 εκ.	1

- Παρατηρήσεις :

1. Η δόση είναι ανάλογα με τον τύπο του εδάφους. Οι μεγαλύτερες δόσεις στα βαριά εδάφη και οι μικρές σε ελαφρά εδάφη.
2. Η προσπαρτική εφαρμογή συνιστάται για ξηρά εδάφη ή όταν αναμένεται να επικρατήσουν συνθήκες ξηρασίας μετά την εφαρμογή.
3. Σε 7-10 ημέρες από την εφαρμογή του να ακολουθεί βροχή ή άρδευση με 20-30 κ.μ. νερό / στρ.
4. Εάν χρησιμοποιηθεί σε δόση μεγαλύτερη από 220 γρ./ στρ. τότε δεν θα πρέπει να φυτεύονται μετά την συγκομιδή του βάμβακος ευαίσθητες καλλιέργειες (σιτάρι, σόγια, ζαχαρότευτλα, λάχανα, κολοκυνθοειδή, αραχίδα, τομάτα και μελιτζάνα) παρά μόνο αφού περάσει ένας χρόνος.
5. Ευαίσθητα ζιζάνια :
Solanum nigrum (Αγριοτοματιά)
Digitaria sanguinalis (Αιματόχορτο)
Echinochloa spp (Μουχρίτσα)
Amaranthus spp (Βλήτο)
Setaria spp (Σετάριας)

Chamomilla recutita (Χαμομίλι)
Chenopodium spp. (Λουβουδιές)
Gallium aparine (Μεγαλόκαρπη Κολλητσίδα)
Lolium spp. (Ηρες)
Portulaca oleracea (Αντράκλα)
Senecio vulgaris (Μαρτιάκος)
Sinapis arvensis (Αγριο σινάπι)
Xanthium strumarium (Αγριομελιτζάνα)
Rumex spp (Λάπαθο)
Polygonum persicae (Αγριοπιπεριά)
Polygonum aviculare (Πολυκόμπι)

Τα πιο σπουδαία ανθεκτικά ζιζάνια είναι τα ακόλουθα:

Abutilon theophrasti (Αγριοβαμβακιά)
Hibiscus trionum (Αγριόιβισκος)
Convolvulus arvensis (Περιπλοκάδα)
Malva sylvestris (Μολόχα)

Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκτόνα:

- SZ1 Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα, σπόρους.
- SZ2 Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.
- SZ3 Πριν περάσουν 5 μήνες από την εφαρμογή του μη σπέρνετε και μη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια.
- SZ5 Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
- SZ6 Αν ρυπανθούν τα νερά της άρδευσης να μη χρησιμοποιηθούν για άμεση άρδευση.
- SZ7 Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
- SZ9 Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 3 atm
- SZ10 Χρησιμοποιήστε μπεκ τύπου σκούπας.
- SZ12 Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με πετρέλαιο και μετά με νερό και απορρυπαντικό.

14. Φυτοτοξικότητα: Είναι απόλυτα εκλεκτικό για το βαμβάκι και δεν παρουσιάζει καμία φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον τρόπο εφαρμογής και τις οδηγίες χρήσεως που αναγράφονται στην ετικέτα.

15. Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα.

14. Σημάνσεις: N – Επικίνδυνο για το περιβάλλον.

15. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις): -

16. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):

RO2 Μέτρια τοξικό για τις μέλισσες.

R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S φράσεις):

- S1/2 Να φυλάσσεται κλειδωμένο μακριά από παιδιά.
- S13 Να φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές.
- S20/21 Μην τρώτε, πίνετε και μην καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.
- SY8 Μετά τη χρήση πλύνετε αμέσως χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε

πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο Σε περίπτωση κατάποσης εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.

S61 Αποφύγετε την διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (Σακίδια, κουτιά) αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):

Απαγορεύεται η πώληση του σε ερασιτέχνες.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)	Προϊόντα	MRLs (mg/kg)
Fluometuron	Έχουν καθοριστεί Ευρωπαϊκά MRLs στον Κανονισμό 396/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008	

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης: Διατηρείστε το στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώροι, μακριά από ήλιο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97), τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β' /19-9-2002) ΚΥΑ και με την παρούσα Απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2010.

β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσής της.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ

Κ. ΣΚΙΑΛΑΣ