



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 07 - 06 - 2010  
Αριθ. πρωτ: 185877

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Γ. Τσιάμπα  
Τηλέφωνο: 210 928 7228  
e-mail: [syg064@minagric.gr](mailto:syg064@minagric.gr)

Προς: NTY ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.)  
Σολωμού 12 & Βασ. Γεωργίου  
152 32 Χαλάνδρι  
(με απόδειξη)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ.  
7535/18-12-2002 έγκρισης στο  
φυτοπροστατευτικό προϊόν  
(ζιζανιοκτόνο) SAFARI 50 WG ως  
προς τον παρασκευαστή του  
σκευάσματος, την εγγυημένη  
σύνθεση και την ημερομηνία λήξης  
της έγκρισης».

Κοιν.: 1. Γραφείο Υπουργού κ. Κ.  
Μπατζελή  
2. Γραφείο Υφυπουργού  
κ. Μ. Καρχιμάκη  
3. Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις  
Δ/νσεις Γεωργίας - Έδρες τους  
4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό  
Ινστιτούτο  
Τμήμα Ελέγχου Γ. Φαρμάκων  
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά  
5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. - Έδρες τους  
6. ΕΣΥΦ  
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα  
7. Εσωτερική διανομή:  
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της  
Δ/νσής μας  
-Γραμματεία της Δ/νσής μας  
8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων  
Λιδότου 26, Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/97 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) με τίτλο «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτής.
2. Τη με αριθ. 132795/30-9-2009 (ΦΕΚ 2186/Β/2-10-2009) Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη «καταχώριση των δραστικών ουσιών chlorsulfuron, cyromazine, dimethachlor, etofenprox, lufenuron, penconazole, tri-allate και triflurosulfuron στο Παράρτημα Ι του Προεδρικού διατάγματος 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α' 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/77/ΕΚ της Επιτροπής της 1.7.2009».

3. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2008.
4. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 214 Α’).
5. Τη με αριθ. 316049/24-11-2009 (ΦΕΚ 2401/Β’/1-12-2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μιχαήλ Καρχιμάκη».
6. Τη με αριθ. πρωτ. 135625/24-12-2009 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας **NTY PONT ELLAS A.E.**

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. **7535** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **SAFARI 50 WG** που χορηγήθηκε με την αριθ. 114613/18-12-2002 και τροποποιήθηκε με τις αριθ. 124139/3-1-2007 και 121569/19-8-2008 Υπ. Αποφάσεις, ως προς τον **παρασκευαστή του σκευάσματος, την εγγυημένη σύνθεση και την ημερομηνία λήξης της έγκρισης**, και η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

### 1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

<b>7535</b>
<b>18-12-2002</b>
<b>30 – 06 - 2014</b>

### 1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
- 1.2.β Μορφή:

<b>SAFARI 50 WG</b>
<b>Βρέξιμοι κόκκοι (WG)</b>

### 1.3 Δραστική ουσία (εξ)

- α) Κοινή ονομασία των δραστικών ουσίας κατά ISO

Triflusulfuron-methyl
-----------------------

- β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

<b>Triflusulfuron-methyl: 96,00 % β/β min.</b>
--

- γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

DuPont International Operations Sarl 2 Chemin du Pavillon CH-1218 Le Grand Saconnex Geneva, Switzerland
--

- δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:  Dupont Agricultural Caribe Industries, Ltd USA  (η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκονται στο Παράρτημα I της παρούσας).
--

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Triflusulfuron-methyl όπως έχουν κατατεθεί από την Παρασκευάστρια Εταιρεία DuPont International Operations Sarl, Switzerland κατά την διαδικασία συμμόρφωσης με την οδηγία καταχώρησης με ημερομηνία 24-12-2009 (Αρ.Πρ. Υ.Α.Α.Τ. 135623) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

NTY ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  
Σολωμού 12 & Βασ. Γεωργίου  
Τ.Κ. 152 32 Χαλάνδρι  
Τηλ.: 210 6889 700  
Fax: 210 6889 799  
E-mail: Costas.Anagnostou@grc.dupont.com

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης):

Ο κάτοχος της έγκρισης.  
(NTY ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.)

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

DuPont International Operations Sarl  
2 Chemin du Pavillon  
CH-1218 Le Grand Saconnex  
Geneva, Switzerland

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

DuPont de Nemours (France) S.A.S  
Agricultural Products, France

(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

DuPont de Nemours (France) S.A.S  
Agricultural Products, France

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: Triflusulfuron-methyl **50 % β/β**  
Βοηθητικές ουσίες: **47,91 % β/β**

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στην Πρόταση DPD του σκευάσματος με ημερομηνία 26-1-2004 (Αρ. Πρ. 92419) και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

## 2 Συσκευασίες:

### 2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Βάζο	σαράντα (40), ογδόντα (80) και εκατόν είκοσι (120) γραμμαρίων.	Βάζο πολυαιθυλενίου (HDPE) μέσα σε χάρτινο κουτί. Βάζο πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) μέσα σε διαφανές πλαστικό κουτί (PET).
2	Σακούλα	σαράντα (40) γραμμαρίων και 3 x 40 γραμμαρια.	Σακούλα από υδατοδιαλυτό φιλμ PVAL τύπου (TOHCELLO) που περιέχεται μέσα σε φάκελλο από σύμμικτο υλικό. Κάθε φάκελλος σύμμικτου υλικού περιέχει μία ή τρεις υδατοδιαλυτές σακκούλες.

### 3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

#### Τρόπος εφαρμογής

Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος με πίεση μικρότερη από 2.5 atm (40 psi) με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους και 20-50 λίτρα ψεκαστικού υγρού/στρέμμα, υπό συνεχή ανάδευση με μπέκ τύπου σκούπας.

#### Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Η απαιτούμενη ποσότητα συνιστάται να διαλύεται σε βυτίο γεμάτο κατά το ¼ νερό με συνεχή ανάδευση. Απογεμίζεται το βυτίο με νερό και προστίθεται το λάδι. Το διάλυμα πρέπει να ετοιμάζεται λίγο πριν την εφαρμογή. Σε περίπτωση ανάμειξής του με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα συνιστάται πρώτα να μπαίνει το SAFARI 50 WG στο βυτίο και μετά να προστίθεται τα άλλα σκευάσματα.

**Προσοχή! Τα ψεκαστικά να καθαρίζονται σχολαστικά μετά τη χρήση.**

#### Συνδυαστικότητα:

- Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης.
- Δεν συνιστάται η ανάμειξη του SAFARI 50 WG με σκευάσματα που περιέχουν clopyralid.
- Σε περίπτωση ανάμειξης με σκευάσματα που περιέχουν ethofumesate συνιστάται η δόση τους να μην ξεπερνά τα 25 γραμ. δ.ο./στρέμμα.
- Σε περίπτωση ανάμειξής του με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα συνιστάται πρώτα να μπαίνει το SAFARI 50 WG στο βυτίο και μετά να προστίθενται τα άλλα σκευάσματα.

#### Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας, ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

#### 4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το SAFARI 50 WG είναι εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των σουλφονουριών για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων σε ζαχαρότευτλα. Εφαρμόζεται όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε νεαρό στάδιο ανάπτυξης (2-4 πραγματικά φύλλα). Η πρόσληψη της δραστικής ουσίας γίνεται κυρίως από το φύλλωμα και σε μικρό βαθμό από την ρίζα των ζιζανίων. Τα συμπτώματα της δράσης του στα ζιζάνια (αναστολή της ανάπτυξης χλώρωση κ.ά.) εμφανίζονται μέσα σε 10-15 μέρες από την εφαρμογή του, ενώ ο θάνατος των ζιζανίων επέρχεται αργότερα.

#### 5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ/ στρέμμα (max)	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
<b>ZAXAPO-TEYTAA</b>	Πλατύφυλλα Ζιζάνια*	4 + 50 κ.εκ. λάδι Sunoil 11 E	20-50	Μεταφυτρωτικά, δυο ψεκασμοί καλύψεως <b>1<sup>ος</sup></b> : στάδιο κοτυληδόνων μέχρι τα 4 φύλλα της καλλιεργείας <b>2<sup>ος</sup></b> : 7-12 ημέρες αργότερα <b>**3<sup>ος</sup></b> : μετά τον 2 <sup>ο</sup> και μέχρι το στάδιο του κλεισίματος των γραμμών. <b>**</b> (μόνο για την καταπολέμηση ζιζανίων που φυτρώνουν όψιμα π.χ. αγριοπαμπακιά).	3

\* **Ευαίσθητα ζιζάνια:** *Abutilon theophrasti* (αγριοπαμπακιά), *Aethusa cynapium* (αιθούζα), *Amaranthus retroflexus* (τραχύ βλήτο), *Ammi majus* (ασπροκέφαλος), *Anagallis arvensis* (αναγαλλίδα), *Capsella bursa-pastoris* (καψέλα), *Chamomilla recutita* (χαμομήλι), *Datura stramonium* (τάτουλας), *Myagrurn perfoliatum* (μύαγρο), *Polygonum persicaria* (αγριοπιπεριά), *Raphanus raphanistrum* (ραπανίδα), *Sinapis arvensis* (άγριο σινάπι), *Solanum nigrum* (στύφνος), *Veronica persica* (βερόνικα) .

**Μετρίως ευαίσθητα:** *Amaranthus blitoides* (πλαγιαστό βλήτο), *Atriplex* spp., *Bilderdykia convolvulus* (αναρριχώμενο πολύγονο), *Cirsium* spp., (κίρσιο), *Echinochloa* spp. (μουχρίτσα), *Galium aparine* (μεγαλόκαρπη κολλητσίδα), *Lamium* sp. (Λάμιο), *Papaver rhoeas* (παπαρούνα), *Polygonum aviculare* (πολυκόμπι), *Polygonum lapathifolium* (λαπάτσα), *Stellaria media* (στελλάρια), *Xanthium strumarium* (αγριομελιτζάνα) .

**Ανθεκτικά:** *Chenopodium album* (λουβουδιά), *C. hybridum*, *Fumaria officinalis* (καπνόχορτο), *Veronica hederifolia* (βερόνικα) .

#### Παρατήρηση:

Η παραπάνω ταξινόμηση των ζιζανίων είναι με βάση την αποτελεσματικότητα της διπλής εφαρμογής του SAFARI 50 WG μαζί με Sunoil 11 E.

### Παρατηρήσεις:

1. Το στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων κατά την εφαρμογή, έχει μεγάλη σημασία για την άριστη καταπολέμησή τους. Η αποτελεσματικότερη καταπολέμηση των ευαίσθητων πλατύφυλλων ζιζανίων επιτυγχάνεται όταν οι εφαρμογές γίνονται τότε που τα περισσότερα ζιζάνια έχουν φυτρώσει και βρίσκονται σε μικρό στάδιο ζωικής ανάπτυξης (κοτυληδόνες μέχρι 2 πραγματικά φύλλα).
2. Το σκεύασμα μπορεί να εφαρμοστεί μεταφυτρωτικά, σε οποιοδήποτε στάδιο των ζαχαρότευτλων από τις κοτυληδόνες και μέχρι το κλείσιμο των γραμμών.
3. Για ταυτόχρονη αποτελεσματική καταπολέμηση και των μέτρια ευαίσθητων ή και των ανθεκτικών ζιζανίων, όταν υπάρχουν, συνιστάται το SAFARI στη δόση 4 γρ./στρ. μαζί με Sunoil 11 E (50 κ.εκ./στρ.) να συνδυάζεται με ένα σκεύασμα ethofumesate 50% SC (στη δόση 50 κ.εκ. σκευάσ./στρ.) και με ένα σκεύασμα dismedipham/phenmedipham 8/8% EC (στη δόση 50-70 κ.εκ. σκευάσ./στρ.).
4. Με στόχο την αποφυγή ή την καθυστέρηση εμφάνισης ανθεκτικών ζιζανίων συνιστάται η εναλλαγή ή/και ανάμειξη με σκευάσματα που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης.
5. Ικανοποιητική υγρασία πριν και αμέσως μετά την εφαρμογή προάγει την αποτελεσματικότητα του ζιζανιοκτόνου. Κάτω από πολύ ξηρικές συνθήκες εδάφους μπορεί να παρατηρηθεί μειωμένη αποτελεσματικότητα.
6. Θερμός και υγρός καιρός μετά την εφαρμογή επιταχύνουν τη ζιζανιοκτόνο δράση, ενώ Ψυχρός και ξηρός καιρός μπορεί να την επιβραδύνουν. Σε ψυχρό καιρό ή ξηρασία τα ζιζάνια μπορεί να είναι λιγότερο ευαίσθητα.
7. Η επανάληψη του ψεκασμού δεν είναι απαραίτητη αν βρέξει 6 ώρες μετά τον ψεκασμό. Να αποφεύγεται η εφαρμογή του αν αναμένεται βροχή.

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

### **Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκτόνα:**

- SZ1** Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.
- SZ2** Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.
- SZ3** Μη σπέρνετε και μην φυτεύετε άλλη καλλιέργεια εκτός από ζαχαρότευτλα πριν περάσουν 4 μήνες από την εφαρμογή του. Μετά τους 4 μήνες και μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος μπορούν να σπαρούν μόνο σιτηρά. Αποφύγετε την φύτευση ανθοκομικών και καλλωπιστικών δενδρυλλίων ή φυτωρίων πριν περάσουν 12 μήνες από την εφαρμογή του.
- SZ5** Μη ψεκάσετε κοντά σε πηγές νερού, κανάλια κ.λ.π. Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
- SZ7** Πάρτε μέτρα για την αποφυγή της διαφυγής σταγονιδίων του ψεκαστικού υγρού σε παρακείμενες καλλιέργειες (ελάχιστη απόσταση 5 μ.). Μην ψεκάσετε όταν φυσάει.
- SZ8** Μην διπλοψεκάσετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις.
- SZ11** Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται.

**SZ12** Αμέσως μετά τον ψεκάσμό είναι απαραίτητος ο σχολαστικός καθαρισμός του ψεκαστήρα ως εξής:

1. Αδειάστε το βυτίο τελείως και γεμίστε το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό. Ξεπλύνετε το βυτίο και την μπάρα με καθαρό νερό για τουλάχιστον 5 λεπτά και αδειάστε τελείως.

2. Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό. Προσθέστε διάλυμα καθαρισμού 0.5 λίτρα αμμωνίας για οικιακή χρήση (6%) για κάθε 100 λίτρα νερό.

Αφήστε το διάλυμα να κυκλοφορήσει μέσω της αντλίας, μπάρας και μπέκ για τουλάχιστον 15 λεπτά, με συνεχή ανάδευση. Αδειάστε ξανά.

3. Επαναλάβετε άλλη μια φορά το 2.

4. Γεμίστε τελείως το βυτίο με καθαρό νερό για τουλάχιστον 5 λεπτά, οδηγώντας το νερό να περάσει από την αντλία και την μπάρα.

Φίλτρα και μπέκ πρέπει να αφαιρούνται και να καθαρίζονται χωριστά σε ένα δοχείο που περιέχει το διάλυμα καθαρισμού (στην ίδια συγκέντρωση που αναφέρεται στο σημείο 2). Ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

**7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

---

**ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ**

Λόγω της σχετικά μικρής υπολειμματικής διάρκειας της δ.ουσίας στο έδαφος, η χρήση του SAFARI δεν απαιτεί κανένα περιορισμό για την καλλιέργεια της επόμενης χρονιάς σε συνθήκες κανονικής αμειψισποράς. (βλ. και ειδικές προφυλάξεις).

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

---

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

- Μην ψεκάζετε με πολύ υψηλές (>23 °C) ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (παγετός), ή όταν αναμένονται τέτοιες συνθήκες.

- Ο ψεκάσμος να γίνεται νωρίς το πρωί ή το βράδυ αν αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες (>23 °C) κατά την διάρκεια της ημέρας.

- Κάτω από ορισμένες συνθήκες μετά τον ψεκάσμό μπορεί να εμφανιστούν παροδικά κιτρινίσματα, αποκλειστικά και μόνο στο φύλλωμα που υπήρχε κατά τον ψεκάσμό. Αυτά τα συμπτώματα δεν έχουν επίδραση στην επόμενη ανάπτυξη της καλλιέργειας ούτε στις αποδόσεις ή τον ζαχαρικό τίτλο.

- Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργεια που υποφέρει από προσβολές εντόμων, ή ασθενειών, ζημιές από προηγούμενες εφαρμογές ζιζανιοκτόνων, ασφυξία, όξινο pH, τροφοπενίες, κ.λ.π.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις.

**9** Σήμανση σκευάσματος:

**N** – Επικίνδυνο για το περιβάλλον

**10** Φράσεις R

**R50/53:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

**11** Φράσεις S

**S1/2:** Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.  
**S13:** Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές.  
**S20/21:** Μην τρώτε πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.  
**S36/37:** Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.  
**S35:** Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο.  
**S57:** Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί ρύπανση του περιβάλλοντος.  
Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό  
**Sp1:** Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του

**«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης»**

**12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

**Πρώτες βοήθειες – αντίδοτο:**

*Σε περίπτωση κατάποσης:* Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Χορηγήστε 1-2 ποτήρια νερό. Προκαλέστε εμετό μόνον αν ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του. Μη προκαλέσετε εμετό χωρίς ιατρική συμβουλή. Μην χορηγήσετε τίποτε από το στόμα σε αναισθητο άτομο.

*Σε περίπτωση εισπνοής:* Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Χορηγήστε οξυγόνο ή κάντε τεχνητή αναπνοή αν είναι αναγκαίο. Συμβουλευτείτε γιατρό μετά από σοβαρή έκθεση.

*Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:* Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

*Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:* Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό.

**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : (210) 7793777**

**13** Προστασία των καταναλωτών

**13.1** Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)

Triflurosulfuron-methyl

Προϊόντα	MRLs (mg/kg)
Έχουν καθοριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά MRLs στο Παράρτημα III του Κανονισμού 396/2005.	



**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια	ΡΗΙ(ημέρες)
Ζαχαρότευτλα	90

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια εφόσον παραμένει καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.

**15** **A. Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων αυτή χορηγήθηκε.

Η έγκριση θα ανακληθεί στις **30-06-2012** εάν δεν υποβληθεί από τον κάτοχο της έγκρισης αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο με τα στοιχεία του Παραρτήματος III για αξιολόγηση σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο Παράρτημα VI του Π.Δ. 115/97.

**B** Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση του από τη χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί παράπτωμα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ**

**M. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ