



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 11 – 3 - 2003

Αριθ. πρωτ.: 95844

Ταχ. Διεύθυνση: Ιπποκράτους  
Ταχ. Κώδικας: 101 64 – ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 36 17 103  
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 212 45 08

ΠΡΟΣ: 1. BAYER ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.  
Ακακιών 54 Α - Πολύδροσο  
151 25 - ΜΑΡΟΥΣΙ  
(με απόδειξη)  
2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  
α) Διευθύνσεις Γεωργίας  
Έδρες τους  
β) Διευθύνσεις Εμπορίου  
Έδρες τους  
3. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό  
Ινστιτούτο  
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών  
Φαρμάκων  
Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά  
4) Τμήματα Β, Γ και Ε Δ/σης μας

ΘΕΜΑ: "Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
κυκλοφορίας στο φυτοπροστα-  
τευτικό προϊόν (εντομοκτόνο  
για ερασιτεχνική χρήση)  
CONFIDOR FORTE "

ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.721/77 (ΦΕΚ 298/Α/1977) για "την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων" και ειδικότερα τα άρθρα 2 (παρ. 2) και 5 (παρ. 2 και 8).
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ 674/Β/13.9.88) Απόφασή μας, "για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων" και ειδικότερα το Κεφ. Β, παρ. 1.
3. Τη με αριθ. 83345/28.7.88 (ΦΕΚ 599/24.8.88) Απόφασή μας όσον αφορά "τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων", καθώς και το με αριθ. 115/15.5.97 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.97) Π.Δ.
4. Τη με αριθ. 74015/4.5.90 Απόφασή μας με θέμα "προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα σκευάσματα γεωργικών φαρμάκων προκειμένου να χρησιμοποιούνται από ερασιτέχνες-διαδικασία έγκρισης και διάθεσής τους στην αγορά".
5. Τις με αριθ. 68321/16.3.93, 66976/28.2.94 και 97212/14.5.99 Αποφάσεις μας με τις οποίες χορηγήθηκε και διευρύνθηκε η με αριθ. 1616 οριστική έγκριση κυκλοφορίας του όμοιας σύνθεσης φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνου) CONFIDOR.
6. Τη με αριθ. 399580/30.10.2001 (ΦΕΚ 1479/Β/31.10.2001) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη".
7. Τις από 17-12-2001, 16-9-2002 και 15-11-2002 σχετικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 15-11-2002 πρωτόκολλο πληρότητας του φακέλου.

## Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **1974** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο για ερασιτεχνική χρήση) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** CONFIDOR FORTE
2. **Μορφή:** Υγρό διάλυμα (SL)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** imidacloprid 20,6% β/ο  
βοηθητικές ουσίες: 80,74% β/β
4. **Καθαρότητα technical από το οποίο παρασκευάζεται:** 96% min.
5. **Παρασκευαστής:** BAYER AG, Γερμανίας.
6. **Αντιπρόσωπος:** BAYER ΕΛΛΑΣ ABEE, Ακακίων 54 Α, 151 25 – Μαρούσι..
7. **Τυποποιητής:** BAYER ΕΛΛΑΣ ABEE, Ύπατο Θηβών.
8. **Συσκευαστής:** BAYER ΕΛΛΑΣ ABEE, Ύπατο Θηβών.
9. **Συσκευασία: α. Είδος-Μέγεθος:** Φιάλες των **5, 7,5, 10, 15 και 20** κ.εκ.  
**β. Υλικό:** Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) ή COEX, με ειδικό πάμα ασφαλείας. Το πάμα θα είναι τέτοιο, που τα παιδιά κάτω των πέντε ετών να μην μπορούν να το ανοίξουν και επιπλέον να αποσφραγίζεται εύκολα από τους ενήλικες και να εξασφαλίζει τη στεγανότητα κατά την επανασφάλιση (ξανακλείσιμο) της συσκευασίας. Επί της συσκευασίας πρέπει να φέρονται υποχρεωτικά οι ενδείξεις που ορίζονται με την παρ. 2β της υπ' αριθ. 83345/28.7.88 Υπ. Απόφασης (κύρια στήλη) και να συνοδεύονται από το πρόσθετο έντυπο που ορίζεται με τις παρ. 4 και 5 της ίδιας Απόφασης.

10. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης:**

Διασυστηματικό εντομοκτόνο, επαφής και στομάχου.

11. **Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκάσμοι φυλλώματος πλήρους καλύψεως ή ριζοποτίσματα.

12. **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**

Δεν χρειάζεται προδιάλυση. Ρίχνουμε το CONFIDOR FORTE **κατ' ευθείαν** στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά και προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

13. **Φάσμα δράσης:**

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
<b>13.1 ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ</b>			
<b>Εσπεριδοειδή:</b> (Γκρέιπ-φρουτ, λεμονιά, μανταρινιά, πορτοκαλιά)	-Εριώδης Αλευρώδης (Aleurothrixus floccosus)	7,5 κ.εκ./10 λίτρα νερό	Ψεκάσμος στο χρονικό διάστημα Απριλίου-Σεπτεμβρίου με την εμφάνιση των νυμφών του εντόμου (στάδια L1 και L2). Σε περίπτωση προχωρημένης προσβολής (μικτός πληθυσμός παρουσία μελιτώματος) συνιστάται η προσθήκη (TANK-MIX) θερινού λαδιού ή πολτού σε δόση 100 κ.εκ.
	-Φυλλοκνίστης (Phyllocnistis citrella)	5-7,5 κ.εκ./10 λίτρα νερό	Ψεκάσμος φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής.
<b>Ροδακινιά</b>	-Αφίδες	2,5-3 κ.εκ./10	Ψεκάσμος φυλλώματος με την

	(Myzus persicae, Myzus nicotianae)	λίτρα νερό	εμφάνιση της προσβολής. Ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται με την επανεμφάνιση της προσβολής που μπορεί να συμβεί το νωρίτερο σε 28 ημέρες μετά τον πρώτο ψεκασμό.
<b>Τομάτα υπαίθρου</b>	-Αφίδες (Macrosiphum euphorbiae) -Αλευρώδης (Trialeurodes vaporariorum)	5 κ.εκ./10 λίτρα νερό	Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής.
<b>Αγγούρι</b>	-Αλευρώδης (Trialeurodes vaporariorum)	0,05 κ.εκ. σκευάσματος / φυτό, με 7,5-12,5 κ.εκ./100 τ.μ. (ανάλογα με την πυκνότητα των φυτών)	Ριζοπότισμα. Προληπτική εφαρμογή.
<b>Πατάτα</b>	-Αφίδες (Macrosiphum euphorbiae) -Δορυφόρος (Leptinotarsa decemlineata)	5 κ.εκ./100 τ.μ.	Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής.

#### Παρατηρήσεις:

1. Στα εσπεριδοειδή, σε προγράμματα “ολοκληρωμένης αντιμετώπισης,” συνιστάται να εφαρμόζεται όταν υπάρχει μικρός πληθυσμός ακμαίων του παρασίτου *Cales noacki* ωρίμων για ωτοκία.
2. Στα εσπεριδοειδή σε περίπτωση προχωρημένης προσβολής (μικτός πληθυσμός, παρουσία μελιτωμάτων) ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται 20-30 ημέρες από τον προηγούμενο.
3. Στα εσπεριδοειδή, για την καταπολέμηση του Φυλλοκνίστη (*Phyllocnistis citrella*), η μικρή δόση συνιστάται για μικρή πίεση προσβολής ενώ η μεγάλη δόση για μεγάλη πίεση προσβολής.
4. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:
  - Εσπεριδοειδή: 2 εφαρμογές.
  - Ροδακινιά: 2 εφαρμογές.
  - Τομάτα: 2 εφαρμογές.
  - Αγγούρι: 2 εφαρμογές.
  - Πατάτα: 1 εφαρμογή.

#### 14. Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιεργείες, δόσεις και για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

#### 15. Συνδυαστικότητα: -----

16. **Σήμανση τοξικότητας:** -----
17. **Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):** -----
18. **Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):**  
**RO1** -Πολύ τοξικό για τις μέλισσες.  
**RO15** -Βλαβερό για τα πουλιά.
19. **Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):**  
**S1/2** -Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.  
**S13** -Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.  
**S20/21** -Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.  
**S24/25** -Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια.  
**S26** -Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό και στη συνέχεια συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.  
**S36** -Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και γυαλιά.  
**SY8** -Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκάσμό.  
**S35** -Καταστρέψτε τα κενά δοχεία συσκευασίας. Η χρήση τους για οποιοδήποτε σκοπό είναι επικίνδυνη.
20. **Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:**  
**S45** -Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε του το δοχείο ή την ετικέτα.  
**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.  
**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.**
21. **Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):**  
**SO1** -Μην ψεκάζετε ανθισμένα φυτά. Καταστρέψτε τα ανθισμένα ζιζάνια.
22. **Απαγορεύσεις (A φράσεις):** -----
23. **Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):**  
**(Π1)** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:  
-Εσπεριδοειδή: **21** ημέρες  
-Ροδακινιά: **14** ημέρες  
-Τομάτα: **7** ημέρες  
-Αγγούρι: **7** ημέρες  
-Πατάτα: **14** ημέρες
24. **Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:**  
Διατηρείται σε χώρο ξηρό, δροσερό και χωρίς να εκτίθεται απ' ευθείας στο φως.  
Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.
25. Επιτρέπεται η πώληση του σε ερασιτέχνες.
- II. Πώληση σε καταστήματα:** Επιτρέπεται η πώλησή του από:
- α.** Τα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων.  
**β.** Από οποιοδήποτε άλλο κατάστημα, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα οριζόμενα με το Ν. 220/73, το Π.Δ. 353/74 και το Ν. 1845/89 όσον αφορά τον υπεύθυνο πώλησης και τον ξεχωριστό και κατάλληλο χώρο διάθεσης.

### III. Κείμενο ετικέτας:

- α. Θα είναι σύμφωνο με το άρθρο 22 (παρ. 1) του Ν. 721/77, τα οριζόμενα από την υπ. αριθ. 83345/28.7.88 Υπ. Απόφαση (εκτός από την παρ. 1β του κεφ. Γ΄ της Απόφασης αυτής που αφορά τη χρήση παραστάσεων) και με την παρούσα Απόφαση.
- β. Στην ετικέτα του σκευάσματος επιβάλλεται η απεικόνιση φυτών ή εχθρών για τα οποία προορίζεται, ώστε να γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι προορίζεται για ερασιτεχνική χρήση. Επίσης επιβάλλεται η αναγραφή της φράσης “επιτρέπεται η πώληση του σε ερασιτέχνες”.
- γ. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**IV. α.** Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **31-12-2007**.

- β. Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

**Ε. ΑΡΓΥΡΗΣ**