



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 16-08-2004

Αριθ. πρωτ.: 119959

Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 3-5
Ταχ. Κώδικας: 101 64 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 36 17 103
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 212 45 08

ΠΡΟΣ: 1) ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ Α.Β.Ε.Ε.
Τ.Θ. 26, Τ.Κ. 570 22
ΒΙ.ΠΕ.Σίνδου – Θεσσαλονίκη
(με απόδειξη)
2) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
α) Διευθύνσεις Γεωργίας
Έδρες τους
β) Διευθύνσεις Εμπορίου
Έδρες τους
3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά
4) Τμήματα Β, Γ και Ε Δ/σης μας

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση οριστικής έγκρισης
κυκλοφορίας στο φυτοπροστα-
τευτικό προϊόν (ακαρεοκτόνο)
ΟΜΕΡΤΑ 50 WP ”

ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 (ΦΕΚ 298/Α/1977) για «την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα τα άρθρα 2 (παρ. 2) και 5 (παρ. 2 και 8).
2. Τη με αριθ. 85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) Απόφασή μας, «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το Κεφ. Β, παρ. 1.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-1988 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», καθώς και το με αριθ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) Π.Δ.
4. Τη με αριθ. 265/2002/ 3.9.2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19.9.2002) ΚΥΑ με θέμα την “ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων”, καθώς και τη με αριθ. 108114/30.7.2003 (ΦΕΚ 1121/Β'/8.8.2003) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
5. Τη με αριθ. 75499/12.10.98 Απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 2084 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο όμοιας σύνθεσης φυτοπροστατευτικό προϊόν VENDEX 50 WP.
6. Τη με αριθ. 230642/15-3-2004 (ΦΕΚ 525/23-3-2004) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και την τροποποίηση και συμπλήρωσή της για «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελο Μπασιάκο και Αλέξανδρο Κοντό».
7. Τις σχετικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας καθώς και το από 2-4-2004 πρωτόκολλο πληρότητας φακέλου.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **14060** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ακαρεοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** OMERTA 50 WP
 2. **Μορφή:** βρέξιμη σκόνη (WP)
 3. **Εγγυημένη σύνθεση:** fenbutatin oxide 50% β/β
βοηθητικές ουσίες: 48,5% β/β
 4. **Καθαρότητα technical** από το οποίο παρασκευάζεται: 97% min, του οίκου SINOCHEM NINGBO IMP. & EXP. CO., LTD, Xieru Town, Zhenhai, District, Ningbo, Zhejiang Province, Κίνας.
 5. **Παρασκευαστής :** ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ Α.Β.Ε.Ε., Τ.Θ. 26, 570 22 – ΒΙ.ΠΕ.Σίνδου.
 6. **Αντιπρόσωπος :** -----
 7. **Τυποποιητής:** SINOCHEM NINGBO IMP. & EXP. CO., LTD, Κίνας.
 8. **Συσκευαστής:** ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ Α.Β.Ε.Ε., ΒΙ.ΠΕ.Σίνδου.
 9. **Συσκευασία:** 9α Είδος - Μέγεθος: Σακούλες των 200, 250, 350, 400, 500 και 800 γραμ., 1 κιλού, 2, 3 και 5 κιλών.
9β Υλικό: Σακούλες πολυαιθυλενίου εντός χαρτοκυτίων.
10. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:** Ακαρεοκτόνο επαφής.
11. **Τρόπος εφαρμογής :** Ψεκασμοί καλύψεως.
12. **Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:**
- Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού με νερό μέχρι τη μέση.
 - Διαλύουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό αναδεύοντας.
 - Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση.

13. Φάσμα δράσης :

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ (γραμ./100 λίτρα νερό)	ΤΡΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκάλια, Μανταρίνια, Λεμόνια, Γκρέϊπ φρουτ)	<ul style="list-style-type: none">- Κηλιδωτός Τετράνυχος (Tetranychus urticae)- Παραμορφωτικό Ακάρι (Aceria sheldoni)- Aculus pelekassi- Phyllocoptuta oleivora- Κόκκινος Τετράνυχος (Panonychus ulmi)	45 - 55	Ψεκασμοί καλύψεως, όταν εμφανίζονται 2-3 ακάρεα ανά φύλλο Ψεκαστικός Ογκος: 100-200 λίτρα νερού/στρέμμα
ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά)	<ul style="list-style-type: none">- Κόκκινος Τετράνυχος (Panonychus ulmi)- Κηλιδωτός Τετράνυχος (Tetranychus urticae)- Μπριόμπια (Bryobia sp.)	45 - 55	Ψεκασμοί καλύψεως, όταν εμφανίζονται 2-3 ακάρεα ανά φύλλο Ψεκαστικός Ογκος: 100-200 λίτρα νερού/στρέμμα
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδακινιά)	<ul style="list-style-type: none">- Κόκκινος Τετράνυχος (Panonychus ulmi)- Κηλιδωτός Τετράνυχος (Tetranychus urticae)- Μπριόμπια (Bryobia sp.)	45 - 55	Ψεκασμοί καλύψεως, όταν εμφανίζονται 2-3 ακάρεα ανά φύλλο Ψεκαστικός Ογκος: 150-250 λίτρα νερού/στρέμμα

ΑΜΠΕΛΙ	- Κηλιδωτός Τετράνυχος (Tetranychus urticae) - Κίτρινος Τετράνυχος (Eotetranychus carpini)	45 - 55	Ψεκασμοί καλύψεως, όταν εμφανίζονται 2-3 ακάρεα ανά φύλλο Ψεκαστικός Ογκος: 50-100 λίτρα νερού/στρέμμα
ΛΑΧΑΝΙΚΑ Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Αγγούρι, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθι Φασόλι	- Κηλιδωτός Τετράνυχος (Tetranychus urticae)	45 - 55	Ψεκασμοί καλύψεως, όταν εμφανίζονται 2-3 ακάρεα ανά φύλλο Ψεκαστικός Ογκος: 50-100 λίτρα νερού/στρέμμα
ΒΑΜΒΑΚΙ	- Κηλιδωτός Τετράνυχος (Tetranychus urticae)	45 - 55	Ψεκασμοί καλύψεως, όταν εμφανίζονται 2-3 ακάρεα ανά φύλλο Ψεκαστικός Ογκος: 50-100 λίτρα νερού/στρέμμα
ΛΥΚΙΣΚΟΣ	Κηλιδωτός Τετράνυχος (Tetranychus urticae)	45 - 55	Ψεκασμοί καλύψεως, όταν εμφανίζονται 2-3 ακάρεα ανά φύλλο Ψεκαστικός Ογκος: 50-100 λίτρα νερού/στρέμμα
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ	- Κηλιδωτός Τετράνυχος (Tetranychus urticae)	45 - 55	Ψεκασμοί καλύψεως, όταν εμφανίζονται 2-3 ακάρεα ανά φύλλο Ψεκαστικός Ογκος: 50-100 λίτρα νερού/στρέμμα

Μπορεί να προκαλέσει ανθεκτικότητα στα ακάρεα. Αν παρατηρηθεί μην αυξάνετε τις δόσεις αλλά χρησιμοποιείτε σκεύασμα με άλλη δραστική ουσία (συμβουλευτείτε γεωπόνο).

14. Φυτοτοξικότητα :

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες, για τις συνιστώμενες δόσεις και στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες εφόσον τηρούνται οι οδηγίες της ετικέτας.

15. Συνδυαστικότητα :

Δεν συνδυάζεται με τα αλκαλικά σκευάσματα, το Ziram και το Βρέξιμο Θείο. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε τριπλό συνδυασμό φαρμάκων, χωρίς προηγούμενη δοκιμή του συνδυασμού. Μη χρησιμοποιείτε προσκολλητικά.

16. Σημάνσεις Τοξικότητας: T+ (δηλητήριο), N (επικίνδυνο για το περιβάλλον).

- 17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις) :**
- R26** Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται.
 - R36/38** Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.
 - R41** Κίνδυνος σοβαρής βλάβης των ματιών.
- 18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις) :**
- RO3** Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες.
 - R50** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
 - R53** Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
- 19. Προφυλάξεις για τον χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):**
- S1/2** - Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
 - S13** - Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
 - S20/21** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.
 - S23** - Μην εισπνέετε το ψεκαστικό νέφος.
 - S25** - Αποφεύγετε επαφή με τα μάτια
 - S26** - Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
 - S28** - Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.
 - S29** - Μη ρίχνετε τα υπολείμματα στην αποχέτευση.
 - S36/37/39** Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.
 - S38** - Σε περίπτωση μη επαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείστε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.
 - S45** - Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).
Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη, εφόσον ζητηθεί.
 - SY2** - Φοράτε γάντια από νεοπρένιο ή PVC, μπότες από καουτσούκ, ολόσωμη φόρμα και αναπνευστική συσκευή που να προστατεύει και τα μάτια όταν χειρίζεστε ή εφαρμόζετε το σκεύασμα.
 - SY7** - Πλύνετε τα ρούχα της δουλιάς μετά τον ψεκασμό.
 - SY8** - Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.
 - SY10** Μην αυξάνετε τις δόσεις.
Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη, εφόσον ζητηθεί.
- 20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:**
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Εάν εμφανισθούν συμπτώματα, ζητείστε ιατρική παρακολούθηση.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Απομακρύνετε τυχόν μολυσμένα ρούχα και πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Πλύντε τα ΑΜΕΣΩΣ με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή.
- ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΣΤΟΜΑΤΟΣ:** ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΕ ΕΜΕΤΟ. Μην δώσετε τίποτα από στόματος. Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή.
- ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό.
- ΓΙΑΤΡΟΙ :** Σε περιπτώσεις σοβαρής μόλυνσης, τα συμπτώματα που μπορεί να εμφανισθούν είναι δύσπνοια, διάρροια, εμετός, λήθαργος και γενική κατάπτωση. Θεραπεία ανάλογα με τα συμπτώματα.
- Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777.**

SO3 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Αποφεύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες.

S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα.

S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελητίο δεδομένων ασφαλείας.

22. Απαγορεύσεις (Α φράσεις):

A1 Απαγορεύεται η εφαρμογή του με αεροψεκασμούς.

A2 Απαγορεύεται η χρήση του στα θερμοκήπια.

A3 Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε κατοικημένες περιοχές ή σε απόσταση 50 μέτρων από αυτές.

Απαγορεύεται η πώληση του σε ερασιτέχνες.

23. Περιορισμοί για τη προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

Π1 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Μηλοειδή, 14 ημέρες. Κηπευτικά/Μποστανικά: 3 ημέρες. Ροδακινιά: 2 ημέρες.

Εσπεριδοειδή/βαμβάκι/καλλωπιστικά φυτά/λυκίσκος/αμπέλι, 1 ημέρα.

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-συνθήκες αποθήκευσης: Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από ακραίες θερμοκρασίες. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο χρόνια.

II. Κείμενο Ετικέτας:

α. Θα είναι σύμφωνο με το άρθρο 22, παρ. 1, του Ν.721/77 και με την παρούσα Απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **31-12-2008**.

β. Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ