



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Αθήνα 18.12.2003**

**Αριθ. Πρωτ.:117725**

**Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 3-5  
Ταχ. Κώδικας: 101 64 ΑΘΗΝΑ**

**TELEFAX: 3617103**

**Πληροφορίες: Α.Φονταρά  
Τηλέφωνο: 212-44-98**

**ΘΕΜΑ:Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
κυκλοφορίας στο γεωργικό  
φάρμακο (μυκητοκτόνο)  
COURE F 30/15 WG.**

**ΠΡΟΣ: 1) ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε.  
Μουρούζη 9,  
106 74 ΑΘΗΝΑ**

**(Με απόδειξη)**

**2) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις**

**α) Δ/νσεις Γεωργίας  
Έδρες τους**

**β) Δ/νσεις Εμπορίου  
Έδρες τους**

**3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό  
Ινστιτούτο**

**Τμήμα Ελέγχου  
Γεωργικών Φαρμάκων  
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά**

**4) Τμήματα Β', Γ' & Ε' της Δ/σης μας**

**ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.**

**Α Π Ο Φ Α Σ Η  
Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

**Έχοντας υπόψη :**

1. Τις διατάξεις του Ν.721/77 για «την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ.2 και το άρθρο 5 παρ.8.
2. Τη με αριθ.85418/24-8-88 (ΦΕΚ674/Β/13-9-88) απόφασή μας για «την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το Κεφ Β., παρ.2.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», καθώς και το με αριθ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) Π. Δ.
4. Τη με αριθ. 98918/2-6-99 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 6770 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο ομοίως σύνθεσης αλλά διαφορετικής μορφής από το αιτούμενο σκεύασμα, ΦΑΛΤΟΚΟΥΡ 30/15 WP.
5. Τη με αριθ. 399580/30-10-2001 (Β'1479/31-10-2001) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ε. Αργύρη και Φ. Χατζημιχάλη».
6. Τις από 14-2-03 και 27-5-03 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 27-05-03 πρωτόκολλο εξέτασης του σχετικού φακέλου.

## Αποφασίζουμε

- I.** Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό 6916 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν, (μυκητοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:
- 1. Εμπορικό όνομα :** COURE F 30/15 WG
  - 2. Μορφή :** Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
  - 3. Εγγυημένη σύνθεση:** folpet 30 % β/β  
μεταλλικός χαλκός 15 % β/β σε μορφή οξυχλωριούχου χαλκού  
βοηθητικές ουσίες 40,56 % β/β
  - 4. Καθαρότητα technicals** από τα οποία παρασκευάζεται: folpet 92 % min του οίκου I.Q.V. S.A., Ισπανίας, οξυχλωριούχος χαλκός 94 % min (56 % Cu), του οίκου I.Q.V. S.A., Ισπανίας.
  - 5. Παρασκευαστής:** INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES (I.Q.V.) S.A., Ισπανία
  - 6. Αντιπρόσωπος:** ANOPΓKAXHM A.E. Μουρούζη 9, 106 74 Αθήνα
  - 7. Τυποποιητής:** Ο παρασκευαστής
  - 8. Συσκευαστής:** Ο παρασκευαστής
  - 9. Συσκευασία: 9α.Είδος-Μέγεθος:** Σακούλα σε κουτί, ή σακίδια τυπωμένα ή σάκοι τυπωμένοι 150, 250, 350, 500, 700 γρ., 1 κιλού, 1,4 κιλών, 1,5 κιλών και 2 κιλών  
**9β.Υλικό: β1.** Σακούλα PE ή PE/PA ή PE/PET, κουτί χάρτινο  
**β2.** Σύνθετα πλαστικά σακίδια ή σάκοι (PE/PA ή PE/PET ή PE/AL/PET)

### 10.Στόχος για τον οποίο προορίζεται-Τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

### 11.Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμοί φυλλώματος.

### 12.Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

- Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση.
- Ρίξτε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας.
- Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

### 13.Φάσμα δράσης:

Καλλιέργειες	Ασθένειες	Δόσεις	Όγκος ψεκαστικού υγρού λίτρα/στρέμ.	Χρόνος εφαρμογής
Αμπέλι	Περονόσπορος (Plasmopara viticola)	250-300 γρ./στρέμμα	50-150 (επιτραπέζια)	Εφαρμογές με την εμφάνιση της βλάστησης και επανάληψη κάθε 10-15 ημέρες.
	Φόμωση (Phomopsis viticola)	350 γρ./100 λίτρα νερό	50-100 (οινοποιήσιμα)	
	Βοτρύτης (Botrytis cinerea)	350 γρ./στρέμμα		

Λαχανικά Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά	Περονόσπορος (Phytophthora infestans) Βοτρύτης (Botrytis cinerea)	250-300 γρ./100 λίτρα νερό	50-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη κάθε 10-15 ημέρες ανάλογα με την εξέλιξη των ασθενειών.
Πατάτα	Περονόσπορος (Phytophthora infestans) Βοτρύτης (Botrytis cinerea)	250-300 γρ./100 λίτρα νερό	50-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη κάθε 10-15 ημέρες ανάλογα με την εξέλιξη των ασθενειών. Εφαρμογές από την έναρξη της βλάστησης.

**Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:**

Αμπέλι 4, Τομάτα 4, Μελιτζάνα 4, Πιπεριά 4, Πατάτα 4.

**14. Φυτοτοξικότητα:**

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Είναι φυτοτοξικό στα κολοκυνθοειδή.

**15. Συνδυαστικότητα:**

Δεν συνδυάζεται με ισχυρά όξινα και αλκαλικά σκευάσματα, με ελαιώδη σκευάσματα και thiram.

**16. Σημάνσεις :** Xn, Επικίνδυνο-Xi, Ερεθιστικό

**17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο ( R φράσεις):**

**R36** Ερεθίζει τα μάτια.

**R40** Πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων.

**R43** Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

**18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):**

**RO3** Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες.

**RO4** Πολύ τοξικό για τα ψάρια.

**19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):**

**S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

**S13** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

**S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, ή καπνίζετε.

**S23** Μην εισπνέετε τη σκόνη ή το ψεκαστικό υγρό.

**S24/25** Αποφύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια.

**S26** Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύντε αμέσως με άφθονο νερό επί 15΄ και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**S27** Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν λερωθεί με το σκεύασμα.

**S36/37/39** Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

**SY10** Μην αυξάνετε τις δόσεις και τηρείτε αυστηρά τα όρια τελευταίας επέμβασης πριν τη συγκομιδή.

**SY12** Κρατήστε μακριά από την ψεκασμένη περιοχή άσχετα πρόσωπα και οπωσδήποτε έγκυες γυναίκες.

-Μην ψεκάζετε αντίθετα στον άνεμο.

-Να αποφεύγεται η είσοδος σε έκταση που ψεκάστηκε με COURE F 30/10 WG επί 4 ημέρες μετά τον ψεκασμό.

**20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο :**

Σε περίπτωση κατάποσης χορηγήστε γάλα ή νερό και προκαλέστε εμετό ή κάνετε πλύση στομάχου.

Ο εμετός προκαλείται με μηχανικό ερεθισμό του φάρυγγα με μη αιχμηρό αντικείμενο ή με σιρόπι ιπεκακουάνας.

Δεν προκαλείται εμετός και δεν γίνεται πλύση εάν το άτομο δεν έχει τις αισθήσεις του.

Μετά τον εμετό ή την πλύση χορηγήστε άνθρακα σε αρκετή ποσότητα.

Αντίδοτο Πενικιλλαμίνη.

Τηλ.Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) - 7793777

**21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):**

**SO3** Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

**22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):**

Απαγορεύεται η χρήση του στα θερμοκήπια.

**23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):**

(Π1) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Αμπέλι: 40 ημέρες

Λαχανικά που τρώγονται αφού μαγειρευτούν: 20 ημέρες.

Λαχανικά που οι καρποί τους τρώγονται ωμοί: Στο τέλος της πρώτης ανθοφορίας.

**24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:**

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο.

Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

**II. Ετικέτα:**

**α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 22 , παρ.1 του Ν.721/77 και με την παρούσα απόφαση.

**β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2007.**

**β.** Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν την λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται αίτηση ανανέωσης.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

**Ε. ΑΡΓΥΡΗΣ**