



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Ιπποκράτους 3-5
Ταχ. Κώδικας: 101 64 Αθήνα

Πληροφορίες: Γ. Τσιάμπα
Τηλέφωνο: 36 17 571

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης κυκλοφορίας
στο φυτοπροστατευτικό προϊόν
(φυτορρυθμιστική ουσία),
Stabilan 40 SL.

Αθήνα 3 - 2 - 1999
Αριθμ. Πρωτ. 88115

ΠΡΟΣ:

1. Ελληνικό Εμπόριο
Δ. Σαουντζής ΕΠΕ
Σκουφά 29,
106 73 - ΑΘΗΝΑ
(Με απόδειξη)
2. Δ/νσεις Γεωργίας
Εδρες τους
3. Δ/νσεις Εμπορίου
Εδρες τους
4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά
ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Σ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 721/77 "Περί έγκρισεως κυκλοφορίας και ελέγχου γεωργικών φαρμάκων" και ειδικότερα την παρ. 2 του άρθρου 2 & και το άρθρο 5, παρ. 2.
2. Τη με αριθ. 85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας για την "τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων". Κεφ. Β παρ. 1.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά τον "καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων" καθώς και το Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97).
4. Τη με αριθ. 164884//17-4-1985 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 8066 οριστική έγκριση κυκλοφορίας Stabilan 40 SL.
5. Τη με αριθ. 3396/3-11-98 (ΦΕΚ 1165/τ.Β/9-11-98) απόφαση του κ. Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για "ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας κ.κ. Κων/νο Βρεττό και Παρασκευά Φουντά".
6. Τις από 13-8-98 και 21-12-98 σχετικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό 8066 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν με τα παρακάτω στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα** : STABILAN.
2. **Μορφή** : Υδατικό διάλυμα (SL)

3. **Εγγυημένη σύνθεση:** chlormequat chloride 38% β/ο
 Βοηθητικές ουσίες: 62,62% β/β
4. **Καθαρότητα technical** του Οίκου NUFARM - Αυστρίας: 95% min
5. **Παρασκευαστής :** Nufarm GmbH & Co KG, Αυστρία.
6. **Αντιπρόσωπος :** Ελληνικό Εμπόριο Δ. Σαπουντζής ΕΠΕ, Αθήνα
7. **Τυποποιητής :** Nufarm GmbH & Co KG, Αυστρία.
8. **Συσκευαστής :** ΛΑΠΑΦΑΡΜ ΑΕ, Μενάνδρου 73, 10437 Αθήνα.
9. **Συσκευασία:** 9α. Είδος-Μέγεθος: Φιάλες των:50, 100, 150, 200, 250, 500 και 1000 κ. εκ.
 9β. Υλικό: Πολυαιθυλένιο (PE).
10. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης:**
 Ρυθμιστής ανάπτυξης για τον έλεγχο της βλάστησης καθώς και της ανθοφορίας / καρπόδεσης σε διάφορες καλλιέργειες.
11. **Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμός του φυλλώματος.
12. **Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού και του διαλύματος για πότισμα:**
 Γεμίστε το ψεκαστικό μέχρι τη μέση με νερό προσθέστε την αναγκαία ποσότητα σκευάσματος και υπό συνεχή ανάδευση προσθέστε το υπόλοιπο νερό.

13. **Φάσμα δράσης:**

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΗ κ. εκ.	ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ¹
Αμπέλι (ένσπερμες ποικιλίες)	Αύξηση καρπόδεσης, περιορισμός βλάστησης.	50-60 σε 100 λίτρα νερό	Ψεκασμός 1-2 εβδομάδες πριν την άνθηση.
Σταφίδες	Αποφυγή ανθόρροιας (αντί χαρακώματος).	125-150 σε 100 λίτρα νερό	>>
Ελιά	Μείωση ανθόρροιας - Αύξηση καρπόδεσης.	250-400 σε 100 λίτρα νερό	Ψεκασμός 1-3 εβδομάδες πριν την άνθηση.
Τομάτα	Απόκτηση βραχύτερων και ισχυρότερων φυτών.	100-150 σε 100 λίτρα νερό (4-5 λίτρα / τμ.)	<u>Στα σπορεία.</u> Με διαβροχή ή πότισμα, όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ. Επανάληψη της εφαρμογής 1 ή 2 φορές μετά από 3-5 ημέρες.
	Περιορισμός ανάπτυξης των φυτών - Αύξηση καρπόδεσης.	300-350 σε 100 λίτρα. νερό	<u>Στο χωράφι.</u> Εφαρμογή με ψεκασμούς. α. Με 15 λίτρα/στρ. Στην έναρξη της άνθησης. β. Με 35 λίτρα/στρ. 15 ημέρες μετά τον πρώτο ψεκασμό. γ. Με 50 λίτρα/στρ. 15 ημέρες μετά τον δεύτερο ψεκασμό.
Βαμβάκι	Περιορισμός του ύψους των φυτών - Αύξηση καρπόδεσης.	10 στο στρ.	<u>Ψεκασμοί καλύψεως.</u> α. 45 ημέρες μετά το φύτεμα. β. Μιά με δύο επαναλήψεις μετά από 7 -10 ημέρες.

Σιτάρι	Παρεμπόδιση πλαγιάσματος.	700-800 με 10-50 λίτρα νερό/στρ.	Ψεκασμός όταν τα φυτά έχουν 5-7 φύλλα & ύψος 15-25 εκ. (τέλος αδελφώματος - αρχή καλαμώματος).
	Αύξηση παραγωγής.	200-300 με 10-15 λίτρα νερό/στρ.	Ψεκασμός 15-20 ημέρες μετά την έναρξη του καλαμώματος.

14. **Φυτοτοξικότητα:** Το Stabilan 40 SL δεν προκαλεί συμπτώματα φυτοτοξικότητας όταν χρησιμοποιείται στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως.

15. **Συνδυαστικότητα:** -----

16. **Σημάνσεις:** Xn, Επικίνδυνο.

17. **Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):**

R₂₂ - Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης.

18. **Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):**

RO₃ - Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες.

R₅₂ - Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς.

19. **Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία :**

S_{1/2} - Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.

S₉ - Διατηρείστε σε χώρο καλά αεριζόμενο.

S₁₃ - Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S_{20/21} - Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, ή καπνίζετε.

S₂₃ - Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό.

S_{27/SY₆} - Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν μολυνθεί, πλύνετε τα πριν τα ξαναφορέσετε.

S₂₈ - Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

S₃₅ - Καταστρέψτε τα κενά υλικά συσκευασίας με τρύπημα αφού τα ξεπλύνετε και ρίξετε τα αποπλύματα στο ψεκαστικό.

S_{36/37/39} - Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών και προσώπου.

S₄₆ - Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

SY₁₀ - Μην αυξάνετε τις δόσεις.

SY₁₁ - Μην ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το φάρμακο ή τα κενά υλικά συσκευασίας του.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.

20. **Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:** Δεν έχει ειδικό αντίδοτο. Συμπτωματική θεραπεία.

21. **Προφυλάξεις για το Οικοσύστημα (SO φράσεις):** ----

22. **Απαγορεύσεις (A φράσεις):** ----

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

Π₁ Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: ----

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Το Stabilan 40 SL πρέπει να αποθηκεύεται, στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας. Όταν αποθηκεύεται σύμφωνα με τις παραπάνω συνθήκες, παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

II. Κείμενο ετικέτας:

α. Να είναι σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 721/77 και με την παρούσα.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

α. Η έγκριση αυτή ισχύει μέχρι 31- 12 - 2003.

β. Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, να υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Κ. ΒΡΕΤΤΟΣ