



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 8 - 7 - 2009  
Αριθ. πρωτ: 130524

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150

Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ

TELEFAX: 210 92 12 090

Πληροφορίες: Γ. Τσιάμπα

Τηλέφωνο: 210 928 7228

e-mail:

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ.  
7523/27-3-1998 έγκρισης στο  
φυτοπροστατευτικό προϊόν  
BIGROW 50 SC (ζιζανιοκτόνο) ως  
προς τον παρασκευαστή της  
δραστικής ουσίας και του  
σκευάσματος, το εργοστάσιο  
παρασκευής και συσκευασίας του  
σκευάσματος και την ημερομηνία  
λήξης της έγκρισης»

Προς: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ  
ΑΕΒΕ

Εθνικής Αντιστάσεως 73 &  
Σποράδων  
Τ.Κ. 152 31 Χαλάνδρι-Αθήνα  
(με απόδειξη)

- Κοιν.: 1. Γραφείο Υπουργού κ. Σ.  
Χατζηγάκη  
2. Γραφείο Υφυπουργού  
κ. Κ. Κιλτίδη  
3. Γραφείο Γ.Γ. κ. Κ. Σκιαδά  
4. Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις  
Δ/νσεις Γεωργίας - Έδρες τους  
5. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό  
Ινστιτούτο  
Τμήμα Ελέγχου Γ. Φαρμάκων  
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά  
6. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. - Έδρες τους  
7. ΕΣΥΦ  
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα  
8. Εσωτερική διανομή:  
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της  
Δ/νσής μας  
-Γραμματεία της Δ/νσής μας  
9. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων  
Λιδότου 26, Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/97 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) με τίτλο «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτής.
2. Τη με αριθ. 128485/29-4-2009 (ΦΕΚ 859/Β/7-5-2009) Κοινή Υπουργική Απόφαση για την «καταχώριση των δραστικών ουσιών clofentezine, dicamba, difenconazole, diflubenzuron, imazaquin, lenacil, oxadiazon, picloram και pyriproxyfen στο παράρτημα Ι του Προεδρικού διατάγματος υπ' αριθ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α' 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2008/69/ΕΚ της Επιτροπής της 1<sup>ης</sup> Ιουλίου 2008".

3. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2008.
4. Το Π.Δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 232 Α’).
5. Τη με αριθμό 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β’/18-1-2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής διεύθυνσης Προϊσταμένους Διεύθυνσης και προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με ‘Έντολή Υπουργού’»
6. Τη με αριθ. πρωτ. 125676/19-12-2008 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας **ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ**.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**Τροποποιούμε την με αριθ. 7523 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος BIGROW 50 SC που χορηγήθηκε με την αριθ. 58130/27-3-1998 Απόφασή μας, ως προς τον παρασκευαστή της δραστικής ουσίας και του σκευάσματος, το εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος και την ημερομηνία λήξης της έγκρισης και η οποία διαμορφώνεται ως εξής:**

### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

#### **1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

**7523**

**27-3-1998**

**31 – 12 - 2013**

#### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

**BIGROW 50 SC**

1.2.β Μορφή:

**Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)**

#### **1.3 Δραστική ουσία (εξ)**

α) Κοινή ονομασία των δραστικών ουσίας κατά ISO

Lenacil  
(Χημική ομάδα: uraciles)

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

Lenacil: 97,5% β/β min

γ) Παρασκευαστής των δ.ο.:

**DuPont International Operations Sarl,**  
chemin du Pavillon, CH-1218,  
Le Grand-Sacconnex Geneva, Switzerland  
ΕΛΒΕΤΙΑ

δ) Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
**Schirm GmbH Division Hermania**  
**Γερμανία**  
(οι Δ/νσεις των εργοστασίων είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας lenacil όπως έχουν κατατεθεί από την Παρασκευάστρια Εταιρεία DuPont International Operations Sarl κατά την διαδικασία συμμόρφωσης με την οδηγία καταχώρησης με ημερομηνία 22-12-2008 (Αρ.Πρ. Υ.Α.Α.Τ. 125757) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ,  
Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων,  
Τ.Κ. 115231-Χαλάνδρι  
Τηλ.:211-120 5570  
Fax: 211-120 5572  
E-mail: [technical@alfagro.gr](mailto:technical@alfagro.gr)

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης):

Ο κάτοχος της έγκρισης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
**Schirm GmbH Division Hermania**  
**Γερμανία**  
(οι Δ/νσεις των εργοστασίων είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**1. ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ ,**  
Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτία  
32 011 –Οινόφυτα ,Βοιωτία  
Τηλ. 22620-30821-3  
Φαξ. 22620-30820  
**e-mail: [nikos.kosmidis@alfagro.gr](mailto:nikos.kosmidis@alfagro.gr)**

**2. Schirm GmbH Division Hermania**  
Germany

(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία Ienacil 50% (β/ο)  
Βοηθητικές ουσίες 54,6 β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος έχει κατατεθεί στο φάκελο της έγκρισης του προϊόντος.

**2**

**Συσκευασίες:**

**2.2 Συσκευασίες:**

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	200, 400, 500, 800 κ.εκ. & 1 λίτρου	HDPE. COEX , SELLAR, PET
2	Δοχείο (Μπιτόνι)	2 - 3,5 – 4 & 5 λίτρα	COEX (PE/PP)

**3. Οδηγίες χρήσης:**

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

**Τρόπος εφαρμογής:** Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους (προφυτρωτικά) ή της καλλιέργειας (μεταφυτρωτικά) με 20-40 λίτρα ψ.υ./στρ. Πίεση ψεκαστικού μέχρι 3 ατμ.(45 psi) και μπεκ τύπου σκούπας. Σκόπιμο είναι ο ψεκασμός να γίνεται με συνεχή ανάδευση του ψεκαστικού υγρού.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Ανακινήστε καλά το δοχείο ή τη φιάλη με το σκεύασμα πριν το χρησιμοποιήσετε. Διαλύετε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε λίγο νερό. Γεμίστε το ψεκαστικό μέσο μέχρι το ¾ με νερό και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος (που έχετε διαλύσει σε νερό). Υπό συνεχή ανάδευση προσθέστε το υπόλοιπο νερό. Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται 3 φορές και τα νερά ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο.

**Συνδυαστικότητα:** Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκεύασματα

#### **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

1. Το **BIGROW 50 SC** εφαρμόζεται σε καλά ψιλοχωματισμένο υγρό

έδαφος ελεύθερο φυτρωμένων ζιζανίων.

2. Η υγρασία είναι απαραίτητη για αποτελεσματική ζιζανιοκτονία. Μέσα σε 3-5 μέρες από την εφαρμογή χρειάζεται ν' ακολουθήσει βροχή ή πότισμα.

3. Σε πολύ υποβαθμισμένα εδάφη (με περιεκτικότητα σε οργανική ουσία μικρότερη από 1% και περιεκτικότητα σε άμμο ή χαλίκι μεγαλύτερη από 50%) να μην εφαρμόζεται δόση μεγαλύτερη από 160 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για διαχείριση τους ως επικίνδυνα απόβλητα

#### **4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστώδων και ορισμένων πλατύφυλλων ζιζανίων.

#### **5** 5.1 Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος κ.εκ/ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
<b>ΦΡΑΟΥΛΑ</b>	Ετήσια πλατύφυλλα & ορισμένα αγρωστώδη ζιζάνια.	320 σε ελαφρά εδάφη 400 σε μέτρια εδάφη	20 - 40	α. <u>Εφαρμογή σε νέες φυτείες</u> (1 <sup>ος</sup> χρόνος): 1 <sup>η</sup> εφαρμογή: Το Φθινόπωρο, 10-14 μέρες μετά τη φύτευση, 2 <sup>η</sup> : Νωρίς την Άνοιξη λίγο πριν ξεκινήσει η βλάστηση μέχρι να φανούν τα μπουμπούκια. β. <u>Σε εγκατεστημένες φυτείες:</u> (2 <sup>ος</sup> & 3 <sup>ος</sup> χρόνος): 3 <sup>η</sup> εφαρμογή: αργά το καλοκαίρι μετά τη συγκομιδή μέχρι το Φθινόπωρο. 4 <sup>η</sup> : Νωρίς την Άνοιξη πριν ξεκινήσει η βλάστηση μέχρι να φανούν τα μπουμπούκια.	<b>2</b>          <b>2</b>

<b>ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ</b>	Ετήσια πλατύφυλλα & ορισμένα αγρωστώδη ζιζάνια.	80-110 σε ελαφρά εδάφη  130-160 σε μέτρια & βαριά εδάφη.	20 - 40	α. <u>Πριν τη σπορά:</u> Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους & ενσωμάτωση σε βάθος 3-5 εκ. με ελαφρύ φρεζάρισμα ή τεχνητή βροχή. β. <u>Αμέσως μετά τη σπορά:</u> Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους & ενσωμάτωση με ελαφρύ πότισμα.	<b>1</b>
<b>ΠΑΤΖΑΡΙΑ</b>	Ετήσια πλατύφυλλα & ορισμένα αγρωστώδη ζιζάνια.	160-200 σε ελαφρά εδάφη 240-280 σε μέτρια & βαριά εδάφη	20 - 40	α. <u>Πριν τη σπορά:</u> Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους & ενσωμάτωση σε βάθος 3-5 εκ. με ελαφρύ φρεζάρισμα ή τεχνητή βροχή. β. <u>Αμέσως μετά τη σπορά:</u> Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους & ενσωμάτωση με ελαφρύ πότισμα.	<b>1</b>
<b>ΣΠΑΝΑΚΙ</b>  <b>ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ</b> <b>ΤΕΥΤΛΑ</b>	Ετήσια πλατύφυλλα & ορισμένα αγρωστώδη ζιζάνια.	200-240 σε ελαφρά εδάφη 280-320 σε μέτρια & βαριά εδάφη	20 - 40	α. <u>Πριν τη σπορά:</u> Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους & ενσωμάτωση σε βάθος 3-5 εκ. με ελαφρύ φρεζάρισμα ή τεχνητή βροχή. β. <u>Αμέσως μετά τη σπορά:</u> Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους & ενσωμάτωση με ελαφρύ πότισμα.	<b>1</b>

**ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ:**

**Πλατύφυλλα (ετήσια):** *Anagallis arvensis* (αναγαλλίδα), *Anthemis* sp. (ανθεμίδα), *Bilderdykia convolvulus* (αναριχ. πολύγονο), *Capsella bursa-pastoris* (καψέλλα), *Chenopodium album* (λουβουδιά), *Chrysanthemum segetum* (αγριομαργαρίτα), *Fumaria officinalis* (καπνόχορτο), *Matricaria* sp. (χαμομήλι), *Papaver rhoeas* (κοινή παπαρούνα), *Poa annua* (κοινή πόα), *Polygonum aviculare* (πολυκόμπι), *Polygonum hydropiper* (νεροπιπεριά), *Polygonum lapathifolium* (λαπάτσα), *Polygonum persicaria* (αγριοπιπεριά), *Ranunculus arvensis* (ρανούγκουλος), *Raphanis raphanistrum* (ραπανίδα), *Rumex* spp. (λάπαθο), *Senecio vulgaris* (μαρτιάκος), *Silene vulgaris* (βοϊδοκράτης), *Sinapis arvensis* (άγριο σινάπι), *Sonchus oleraceus* (ζωχός), *Spergula arvensis* (σπεργούλα), *Stellaria media* (στελλάρια), *Thlaspi arvense* (θλάσπι), *Urtica urens* (μικρή τσουκνίδα).

**Αγροστώδη (ετήσια):** *Alopecurus myosuroides* (Αλεπονουρά), *Apera spicaventi* (ανεμόχορτο), *Digitaria sanguinalis* (αιματόχορτο), *Echinochloa crusgalli* (μουχρίτσα μόνο βλαστάνοντα ζιζάνια).

**ΜΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ:**

*Agropyron repens* (Αγρόπυρο), *Avena* sp (αγριόβρωμη), *Cirsium arvense* (κίρσιο), *Echium vulgare* (βοϊδόγλωσσα), *Euphorbia* sp. (γαλατσίδα), *Galium aparine* (μεγαλόκαρπη κολλητσίδα), *Lamium amplexicaule* (δωδεκάνθι), *Lamium purpureum* (πορφυρό λάμιο), *Reseda lutea* (κίτρινη ρεζεντά), *Solanum nigrum* (στύφνος), *Veronica hederifolia* (βερόνικα), *Viola arvenis* (αγριοπανσές).

**6.** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτούγειας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

**3. Ειδικές προφυλάξεις για ζιζανιοκτόνα**

- Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους
- Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.
- Μη σπέρνετε και μη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια, εκτός των συνιστώμενων, πριν περάσουν τέσσερις μήνες (4) από την εφαρμογή του και αφού γίνει άροση και καλλιέργεια του εδάφους σε βάθος τουλάχιστον 15 εκατ.
- Αποφεύγετε την χρήση του σε πολύ βαριά εδάφη , καθώς και σε πολύ ελαφρά (αμμουδερά ή χαλικώδη) με περιεκτικότητα μικρότερη του 1% σε οργανική ουσία
- Μην ρυπαίνεται αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες
- Μην ψεκάζετε όταν φυσάει
- Μην διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις.
- Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 3 atm.
- Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας
- Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται
- Μετά τον ψεκασμό πλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με απορρυπαντικό και ξεπλύνετε με πολύ νερό.

**Π.χ Διαχείριση ανθεκτικότητας, Οδηγίες για χρήση σε IPM προγράμματα κ.λ.π.**

Η συνεχής χρήση στον ίδιο αγρό ζιζανιοκτόνων που έχουν παρόμοιο τρόπο δράσης οδηγεί συχνά στην επιλογή ανθεκτικών βιότυπων ζιζανίων στα χρησιμοποιούμενα ζιζανιοκτόνα. Τέτοιοι βιότυποι αν δεν καταπολεμηθούν πολλαπλασιάζονται γρήγορα και επικρατούν έναντι των ευαίσθητων βιότυπων.

Ένας βιότυπος ενός ευαίσθητου ζιζανίου θεωρείται ανθεκτικός σε κάποιο ζιζανιοκτόνο όταν επιβιώνει μετά από ορθή εφαρμογή της συνιστώμενης δόσης του. Η ανάπτυξη ανθεκτικών βιότυπων ενός είδους ζιζανίου μπορεί να αποφευχθεί ή να επιβραδυνθεί με την εναλλαγή (ή ανάμιξη) αποτελεσματικών ζιζανιοκτόνων που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης.

**7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:  
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας  
- σποράς ή φύτευσης των

καλλιεργειών που ακολουθούν  
- της πρόσβασης του ανθρώπου  
ή των ζώων στην καλλιέργεια  
στην οποία έχει εφαρμοστεί το  
σκεύασμα

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις

**9** Σήμανση σκευάσματος:

**N - ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

**10** Φράσεις R

**R50/53** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

**11** Φράσεις S

**S1/2** Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά  
**S13** Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές  
**S20/21** Μην τρώτε πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε  
**S35/57** Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο. Να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο περιβλήμα για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.  
**S46** Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

**SP1 ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.**

*«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης»*

**12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

**Πρώτες βοήθειες – αντίδοτο:**

- Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα
- Σε περίπτωση κατάποσης να χορηγηθούν 1-2 ποτήρια νερό και προκαλέστε εμετό, εφόσον ο άρρωστος έχει τις αισθήσεις του.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Συνιστάται συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : (210) 7793777**

**13** Προστασία των καταναλωτών

**13.1** Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)

Προϊόντα	MRLs (mg/kg)
Έχουν καθοριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά MRLs στο Παράρτημα III του Κανονισμού 396/2005.	

**Lenacil**



**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια	PHI(ημέρες)
Ζαχαρότευτλα, Παντζάρια, Κτηνοτροφικά τεύτλα, Σπανάκι	Μη εφαρμόσιμο.

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Το σκεύασμα διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια, εφόσον αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, καλά αεριζόμενο και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.

### **15** Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων αυτή χορηγήθηκε.

Η έγκριση θα ανακληθεί στις 31-12-2010 εάν δεν υποβληθεί από τον κάτοχο της έγκρισης αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο με τα στοιχεία του Παραρτήματος III για αξιολόγηση σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο Παράρτημα VI του Π.Δ. 115/97.

### **B** Γενικές υποχρεώσεις

- 1.Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση του από τη χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί παράπτωμα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
- 2.Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
- 3.Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση.
- 4.Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

**Ε.Υ.**  
**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Κ. ΣΚΙΑΛΑΣ**

