

Ταχ.Δ/νση:Ιπποκράτους 3-5
Ταχ.Κώδικας:10164 Αθήνα
Πληροφορίες:Α.Φονταρά
Τηλέφωνο:212 44 98

ΠΡΟΣ: 1) Bayer CropScience ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
Σωρού 18-22
151 25 Μαρούσι
(Με απόδειξη)
2) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
α) Δ/νσεις Γεωργίας
Έδρες τους
β) Δ/νσεις Εμπορίου
Έδρες τους
3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου
Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά
4) Τμήματα Β', Γ' & Ε' της Δ/νσής μας
ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης
κυκλοφορίας στο
φυτοπροστατευτικό προϊόν
(μυκητοκτόνο)
BAYFIDAN 5 WG.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.721/77 «για τη έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ.2 και το άρθρο 5 παρ. 8.
2. Τη με αριθ.85418/24/8/88 (ΦΕΚ674/Β/13-9-88) απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» Κεφ Β.παρ.2.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων, καθώς και το με αριθ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) Π.Δ.
4. Τη με αριθ. 265/2002/ 3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19.9.2002) ΚΥΑ με θέμα την «ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων», καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β'/8-8-2003) απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
5. Τη με αριθ. 79219/12-6-92 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 6349 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο όμοιας σύνθεσης αλλά διαφορετικής μορφής από το αιτούμενο σκεύασμα, BAYFIDAN 050 EW (triadimenol 5% β/ο).
6. Τη με αριθ. 100994/30-4-04 (ΦΕΚ 709/Β/13-5-2004) απόφασή μας για την «τροποποίηση εγκρίσεων κυκλοφορίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν σαν δραστική ουσία triadimenol, ως προς το φάσμα δράσης».
7. Τη με αριθ. 230642/15-3-2004 (Β'525/23-3-2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελο Μπασιάκο και Αλέξανδρο Κοντό» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
8. Τις από 17-12-01 και 28-5-04 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 28-5-04 πρωτόκολλο εξέτασης του σχετικού φακέλου.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **6969** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** BAYFIDAN 5 WG
2. **Μορφή:** Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** triadimenol 5 % β/β
βοηθητικές ουσίες: 94,85 % β/β
4. **Καθαρότητα technical** από το οποίο παρασκευάζεται: 97 % min του οίκου Bayer AG, Γερμανίας.
5. **Παρασκευαστής:** Bayer CropScience AG, Γερμανία
6. **Αντιπρόσωπος :** Bayer CropScience Ελλάς ABEE, Σωρού 18-22, 151 25 Μαρούσι
7. **Τυποποιητής :** Ο παρασκευαστής
8. **Συσκευαστής:** Bayer CropScience Ελλάς ABEE, Ύπατο Θηβών
9. **Συσκευασία:** 9α. **Είδος - Μέγεθος:** Σακούλα σε κουτί 100 γρ., 500γρ. 1, 1.5 και 2 κιλών.
9β. **Υλικό:** Σακούλα PET/AL/ PE, κουτί χάρτινο.
10. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης:**
Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση.
11. **Τρόπος εφαρμογής :** Ψεκασμοί φυλλώματος
12. **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**
-Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση.
-Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

13. **Φάσμα δράσης:**

| ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ | ΔΟΣΕΙΣ γρ./100 λίτρα νερό | Όγκος Ψεκ. Υγρού λίτρα/στρέμμα | ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ |
|---------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|
| Μηλιά | Ωίδιο (Podosphaera leucotricha) | 50 | 100-200 | Εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας, εφαρμογές στα στάδια πράσινης, ρόδινης κορυφής και πτώσης πετάλων. |
| Αμπέλι | Ωίδιο (Uncinula necator) | 50-100 | 50-150 | Εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας, εφαρμογές: -όταν οι βλαστοί αποκτήσουν 2-3 φύλλα και -κατά την άνθηση. Οι εφαρμογές να συνεχιστούν ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες. |
| Τομάτα, Πιπεριά | Ωίδιο (Leveillula taurica, Oidium lycopersicum) | 150-200 | 50-100 | Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες. |
| Κολοκυνθοειδή Αγγούρι, | Ωίδιο (Erysiphe sp.) | 50-100 | 50-200 | Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|---------|--------|--|
| Αγγουράκι, Κολοκυθάκι, | (Sphaerotheca sp.) | | | και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες |
| Πεπόνι, Κολοκύθες, Καρπούζι | | | 50-100 | |
| Αγκινάρα | Ωίδιο (Leveillula taurica, Oidium cynarae) | 150-200 | 100 | Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες |
| Σιτάρι, Κριθάρι | Ωίδιο (Erysiphe graminis) | 250 | 60 | Περί το τέλος αδελφώματος-αρχή καλαμώματος, με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας. |
| | Σκωριάσεις (Puccinia spp.) | | | Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας. |

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:

Μηλιά 4, Αμπέλι 2, Τομάτα-Πιπεριά 3, Κολοκυνθοειδή 3, Αγκινάρα-Σιτάρι-Κριθάρι 1

Παρατηρήσεις:

-Συνιστάται για λόγους αποφυγής ανάπτυξης ανθεκτικότητας η εφαρμογή του να γίνεται σε μίγμα με μη διασυστηματικό, προστατευτικό μυκητοκτόνο (επαφής).

-Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής και το στάδιο ανάπτυξης του φυτού.

-Στις καλλιέργειες αμπέλι, μηλιά, και λαχανικά υπό κάλυψη να ακολουθούνται, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.

-Στο αμπέλι, η εφαρμογή του πρέπει απαραίτητα να εναλλάσσεται με μυκητοκτόνα επαφής και οι επεμβάσεις με το σκεύασμα να μη ξεπερνούν τις δύο (2) ανά καλλιεργητική περίοδο.

14. Φυτοτοξικότητα :

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις και κάτω από τις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

15. Συνδυαστικότητα :

Συνδυάζεται με τα σκευάσματα Αντρακόλ 65 WP, Αντρακόλ 70WP, Αλσυστίν 25 WP, Μπαϋθρόντ 5 EC, Μπαϋκόρ 25 WP, Γκουζαθείον Μ 20 EC, Γκουζαθείον Μ 25 WP, Μετασυστόξ R 50 EC, Μπαϋφολάν, Μπαϋφολάν Κ, Ταμαρόν 600 SL, Φολιμάτ 50 SL, Φολιντόλ Μ 40 EC, Κονφιντόρ 200 SL, Μπούλντοκ 025 SC, Τέλντορ 50 WG, Κάπταν 50 WP, Κουπραβίτ 50 WP.

16. Σημάνσεις: Χη, Επικίνδυνο

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

R20 Βλαβερό όταν εισπνέεται.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):

RO3 Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες.

R52/53 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

(S1/2) Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

(S13) Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

(S20/21) Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.

- (S26) Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή
- (S39) Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.
- (S46) Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτή τη συσκευασία ή την ετικέτα.
- (S61) Να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο περίβλημα για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.
- (SY8) Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκάσμό.

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο :

Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα που έχουν βραχεί με το προϊόν.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε αμέσως με αρκετό νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε συμβουλή οφθαλμιάτρου.

Σε περίπτωση κατάποσης καλέστε αμέσως γιατρό.

Πληροφορίες για το γιατρό: η δραστική ουσία του σκευάσματος ανήκει στη χημική ομάδα των τριαζολών (triazoles). Θεραπευτικά μέτρα: Αντίδοτο δεν υπάρχει ειδικό, πρώτες βοήθειες, απομόλυνση, συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) - 7793777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

(SO4) Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

(Π1) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Αμπέλι: 35 ημέρες

Σιτάρι, κριθάρι: 30 ημέρες

Μηλιά, τομάτα, πιπεριά, κολοκυνθοειδή, αγκινάρα: 15 ημέρες

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε ξηρό και δροσερό μέρος. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

II. Από την 1-8-2004 οι παράγραφοι 16, 17, 18 και 19 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

16. Σήμανση τοξικότητας :

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις) :

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R φράσεις) :-

R52/53 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S φράσεις) :

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.

S46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτή τη συσκευασία ή την ετικέτα.

S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

III. Ετικέτα:

- α)** Θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 22, παρ. 1, του Ν.721/77 και με την παρούσα Απόφαση.
- β)** Οι ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και διακινηθούν στην αγορά μέχρι τις 30-7-2004, επιτρέπεται να κυκλοφορήσουν μέχρι τη λήξη τους (2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής που αναγράφεται στην ετικέτα), με την ταξινόμηση, συσκευασία και σήμανση που ορίζεται με τις παραγράφους 16-19 του τμήματος Ι της παρούσας Απόφασης.
- γ)** Οι ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και διακινηθούν στην αγορά από την 1-8-2004, θα κυκλοφορούν με την ταξινόμηση, συσκευασία και σήμανση που ορίστηκε με τις παραγράφους 16-19 του τμήματος ΙΙ της παρούσας Απόφασης.
- δ)** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

IV. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2008.

- β.** Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν την λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται αίτηση ανανέωσης.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ