



ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 20 - 08 - 2009
Αριθ. πρωτ: 130449

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 72 11
e-mail: syg046@minagric.gr

Προς: IRVITA PLANT PROTECTION N.V
Ολλανδικές Αντίλλες
(διά της εταιρείας ΑΛΦΑ
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ,
Εθνικής Αντιστάσεως 73
152 31 – Χαλάνδρι)
(με απόδειξη)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ.
2050/24.2.88 απόφασης χορήγησης
έγκρισης στο φυτοπροστατευτικό
προϊόν (ακαρεοκτόνο) APOLLO 50
SC ως προς τις φράσεις κινδύνου
για το οικοσύστημα, τις
προφυλάξεις για το χρήστη και τη
δημόσια υγεία και την ημερομηνία
λήξης της έγκρισης »

Κοιν.: 1. Γραφείο Υφυπουργού
κ. Κ. Κιλτίδη
2. Γραφείο Γ.Γ. κ. Κ. Σκιαδά
3. Γραφ. Προϊστ. Γεν. Δ/σης Φυτ.
Παραγωγής κ. Δ. Μπαμπίλη
4. Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις
Δ/σεις Γεωργίας (με e-mail)
Έδρες τους
5. Μ.Φ.Ι.
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων (με e-mail)
6. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους (με e-mail)
7. Ε.ΣΥ.Φ.
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα
8. Εσωτερική διανομή:
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της
Δ/σής μας
-Γραμματεία της Δ/σής μας
9. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων
Λιδότου 26, Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/97 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) με τίτλο «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτής.
2. Την αριθ. 128485/29.4.2009 (ΦΕΚ 859/Β'7.5.2009) Κοινή Υπουργική Απόφαση για την «καταχώριση των δραστικών ουσιών clofentezine, dicamba, difenoconazole, diflubenzuron, imazaquin, lenacil, oxadiazon, picloram και pyriproxyfen στο παράρτημα Ι του Π.Δ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α' 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2008/69/ΕΚ της Επιτροπής της 1.7.2008.

3. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2008.
4. Το Π.Δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 232 Α’).
5. Τη με αριθ. 147/2009 ΚΥΑ “Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Κιλτίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο”.
6. Τη με αριθμό 280665/6.4.09 (ΦΕΚ 970/Β’/22.5.2009) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής διεύθυνσης Προϊσταμένους Διεύθυνσης και προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με “Έντολή Υφυπουργού”»
7. Τη με αριθ. πρωτ. 125459/15.12.2008 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε. για λογαριασμό της εταιρείας IRVITA PLANT PROTECTION N.V., Ολλανδικές Αντίλλες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. **2050/24.2.88** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ακαρεοκτόνο) **APOLLO 50 SC** που χορηγήθηκε με την αριθ. **66815/24.2.88** Απόφασή μας, διευρύνθηκε με τη με αριθ. 81814/22.6.93 Απόφασή μας, τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 97098/1.4.2003 Απόφασή μας, ανανεώθηκε με τη με αριθ. 116734/28.11.2003 Απόφασή μας (ΦΕΚ 1895/Β’/22.12.2003) και τροποποιήθηκε με τα με αριθ. 119124/20.7.2004 Απόφασή μας (ΦΕΚ 1171/Β’/2.8.2004), ως προς τις **φράσεις κινδύνου για το οικοσύστημα, τις προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία και την ημερομηνία λήξης** της έγκρισης και η οποία διαμορφώνεται ως ακολούθως:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

2050
24.02.88
31.12.2013

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα

APOLLO

- 1.2.β Μορφή:

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

1.3 Δραστική ουσία (ες)

- α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

CLOFENTEZINE (χημική ομάδα: τετραζίνες)

- β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

98 % (β/β) min

- γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

IRVITA PLANT PROTECTION N.V., Ολλανδικές Αντίλλες
--
- δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: SHIJIAZHANG LVFENG CHEMICAL CO LTD, Κίνα (η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).
--

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας clofentezine όπως έχουν κατατεθεί από την παρασκευάστρια εταιρεία IRVITA PLANT PROTECTION N.V. κατά την διαδικασία συμμόρφωσης με την οδηγία καταχώρησης με ημερομηνία 15-12-2008 (Α.Π. Υ.Α.Α.Τ. 125459) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

IRVITA PLANT PROTECTION N.V.,
Ολλανδικές Αντίλλες

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 152 31–Χαλάνδρι,
Τηλ.: 211 120 55 70, Fax: 211 120 55 72
E-mail: technical@alfagro.gr
Martha.paissiou@alfagro.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης):

Ο κάτοχος της έγκρισης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

IRVITA PLANT PROTECTION N.V.,
Ολλανδικές Αντίλλες

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: SAFAPAC LTD, Ηνωμένο Βασίλειο (η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ, Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτία 32 011 –Οινόφυτα ,Βοιωτία
Τηλ. 22620-30821-3
Φαξ. 22620-30820
e-mail: nikos.kosmidis@alfagro.gr

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

clofentezine: 50% β/ο
βοηθητικές ουσίες: 57,13 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στα εμπιστευτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν συνημμένα της αίτησης με ημερομηνία 15-12-2008 (Α.Π. Υ.Α.Α.Τ. 125459) και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

2 Συσκευασίες:

2.2 Συσκευασίες: (Σύνολο συσκευασιών: 5)

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	60, 100, 150, 300 και 450 κ.εκ..	Πλαστικό τύπου HDPE

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως με καλή διαβροχή των φυτών

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

- Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού.
- Ανακινείστε το σκεύασμα καλά και αναδεύοντας προσθέστε στο ψεκαστικό τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος.
- Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Συνδυαστικότητα Συνδυάζεται με ακμαιοκτόνα, ακαρεοκτόνα. Δεν συνδυάζεται με ακαρεοκτόνα που περιέχουν τη δραστική ουσία hexytiazox και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται την ίδια καλλιεργητική περίοδο στις καλλιέργειες που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί ακαρεοκτόνο με δραστική ουσία hexytiazox και αντίστροφα, όπου χρησιμοποιήθηκε το Apollo να μην χρησιμοποιείται και άλλο ακαρεοκτόνο με δραστική ουσία hexythiazox, προς αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Δεν συνδυάζεται με ισχυρά αλκαλικά προϊόντα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής , για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Ακαρεοκτόνο επαφής με δράση στα αυγά και τις νεαρές προνύμφες των *Panonychus ulmi*, *P.citri*, *Tetranychus spp.*

5

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ./100 λίτρα νερού)	Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.)	ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ./στρ.)	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Κλημεντίνες, Λεμονιά, Γκρέιπ-φρουτ, Φράπα)	Τετράνυχοι (<i>Panonychus citri</i> , <i>Tetranychus spp</i>)	30 + ακμαιοκτόνο ακαρεοκτόνο στα 2/3 της δόσης	200-400	60-120	Όταν εμφανιστούν οι κινητές μορφές (2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο)	1

Μηλοειδή, Μηλιά, Αχλαδιά	Χειμερινά αυγά του κόκκινου τετράνυχου πριν την εκκόλαψη τους (Panonychus ulmi) Κινητές μορφές κόκκινου τετράνυχου (Panonychus ulmi) και άλλων τετρανύχων (Tetranychus spp)	30 30 + ακμαιοκτόνο ακαρεοκτόνο στα 2/3 της δόσης	200-250	60-75 60-75 + ακμαιοκτόνο ακαρεοκτόνο στα 2/3 της δόσης	Εφαρμόζεται από ο φούσκωμα των οφθαλμών μέχρι το στάδιο της ρόδινης/λευκής κορυφής Όταν εμφανιστούν οι κινητές μορφές (2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο)	2
Πυρηνόκαρπα Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηινιά	Χειμερινά αυγά του κόκκινου τετράνυχου πριν την εκκόλαψη τους (Panonychus ulmi) Κινητές μορφές κόκκινου τετράνυχου (Panonychus ulmi) και άλλων τετρανύχων (Tetranychus spp)	30 30 + ακμαιοκτόνο ακαρεοκτόνο στα 2/3 της δόσης	200-250	60-75 60-75 + ακμαιοκτόνο ακαρεοκτόνο στα 2/3 της δόσης	Στο φούσκωμα των οφθαλμών Όταν εμφανιστούν οι κινητές μορφές (2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο)	2
Αγγούρι, κολοκύθι	Τετράνυχτοι (Tetranychus spp)	30 + ακμαιοκτόνο ακαρεοκτόνο στα 2/3 της δόσης	50-80	15-24	Όταν εμφανιστούν οι κινητές μορφές (2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο)	1
Βαμβάκι	Κηλιδωτός τετράνυχος (Tetranychus urticae)		50-80	40+ ακμαιοκτόνο ακαρεοκτόνο στα 2/3 της δόσης	Όταν εμφανιστούν οι κινητές μορφές (2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο)	1

6

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτουγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Στα Εσπεριδοειδή, στο Αγγούρι και στα Κολοκύθια, το APOLLO 50 SC χρησιμοποιείται μόνο μια φορά τον χρόνο στην ίδια καλλιέργεια. Αν ο ψεκάσμος γίνει νωρίς, στην περίοδο της νέας βλάστηση, απαλλάσσεται η καλλιέργεια από τις θερινές παρεμβάσεις και παράλληλα επιτρέπεται η αύξηση των πληθυσμών των ωφέλιμων ακάρεων και εντόμων.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
 - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής, στις Ελληνικές εδάφοκλιματικές συνθήκες.

- 9** Σήμανση σκευάσματος:

- 10** Φράσεις R

R52 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς.
RO3 Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί γύρω από τις μέλισσες με ελάχιστες ζημιές.

- 11** Φράσεις S

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
S13 Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.
S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου
S35 Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο
SP1 Μην ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του

« Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης »

- 12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Πρώτες βοήθειες – αντίδοτο:
Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε του την ετικέτα
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

13.1 Μέγιστα Όρια
Υπολειμμάτων
(MRLs)
clofentezine

Φυτικά Προϊόντα	MRLs (mg/kg)
Έχουν καθοριστεί οριστικά Ευρωπαϊκά MRLs στο Παράρτημα II του Κανονισμού 396/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008.	

13.2 Τελευταία επέμβαση
πριν τη συγκομιδή ή
πριν τη διάθεση στην
αγορά όταν πρόκειται
για μετασυλλεκτικές
χρήσεις

Καλλιέργεια	PHI (ημέρες)
Εσπεριδοειδή	30
Μηλιά, αχλαδιά, Βερικοκιά, ροδακινιά, δαμασκηνιά, βαμβάκι	45
Κολοκύθι, Αγγούρι	4

14 Συνθήκες
αποθήκευσης,
χρονική
σταθερότητα του
σκευάσματος

Διατηρείται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων αυτή χορηγήθηκε.

Η έγκριση θα ανακληθεί στις **31-12-2010** εάν δεν υποβληθεί από τον κάτοχο της έγκρισης αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο με τα στοιχεία του Παραρτήματος III για αξιολόγηση σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο Παράρτημα VI του Π.Δ. 115/97.

B**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση του από τη χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί παράπτωμα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

**Ε.Υ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ

Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ