



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 12.11.2012
Αριθ. πρωτ: 6592/68290

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Πιταροκοίλη
Τηλέφωνο: 210 928 7254
e-mail: syg081@minagric.gr

Προς: LAINCO S.A.
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
Τουτουτζιδάκη Αντώνιος & Σια Ε.Ε.
Τσιτούρη 22,
152 31, Χαλάνδρι
E-mail: aconsult@otenet.gr
(με απόδειξη)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 7805 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) FENFEN 24 EC (πρώην FLUOROX 24 EC) (δ.ο.: oxyfluorfen) ως προς το εμπορικό όνομα, την περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία, τον παρασκευαστή της δ.ο., τα εργοστάσια παρασκευής της δ.ο., τον κάτοχο της άδειας, τον υπεύθυνο επικοινωνίας, τον υπεύθυνο για την τελική διάθεση στην αγορά, τον παρασκευαστή του σκευάσματος, το εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, την εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, τον τρόπο εφαρμογής, το είδος/μέγεθος/υλικό συσκευασίας, τη σήμανση και την ημερομηνία λήξης της άδειας»

Κοιν.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 80 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.

3. Τη με **7805** οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **FLUOROX 24 EC**, η οποία χορηγήθηκε με την αριθμ. 123932/13.12.2006 Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4. Τη με αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/Β/22.05.2009) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για “Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με «Εντολή Υφυπουργού»».
5. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 798/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Αυγούστου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών oxyfluorfen.
6. Τις από 28.12.2011 και 15.06.2012 αιτήσεις της εταιρείας LAINCO S.A.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. **7805** οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) **FENFEN 24 EC** που χορηγήθηκε με την αριθ. **123932/13.12.2006** Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς το εμπορικό όνομα, την περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία, τον παρασκευαστή της δ.ο., τα εργοστάσια παρασκευής της δ.ο., τον κάτοχο της άδειας, τον υπεύθυνο επικοινωνίας, τον υπεύθυνο για την τελική διάθεση στην αγορά, τον παρασκευαστή του σκευάσματος, το εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, την εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, τον τρόπο εφαρμογής, το είδος/μέγεθος/υλικό συσκευασίας, τη σήμανση και την ημερομηνία λήξης της άδειας.

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

7805
13.12.2006
31.12.2015

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

FENFEN 24 EC

1.2.β Μορφή:

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

1.3 Δραστική ουσία

Δραστική ουσία	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	Oxyfluorfen
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	97,9% (β/β) min.
Χημική ομάδα	Διφαινυλαιθέρες
Παρασκευαστής	Oxyfluorfen Data Development Agreement (ODDA) με εκπρόσωπο την SAPEC AGRO S.A. Alameda dos Oceanos lote 1.06.1.1 – 3 ^o A Parque das Naçoes, Lisboa, Πορτογαλία

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: Nantong Jiahe Chemicals Co., Ltd Daqing Road, Chemical Industry Park, Qinglong Harbor, Haimen, Jiangsu, Postal code 226121, Κίνα Jiangsu Flag Chemical Industry Co., Ltd. Changfenghe Road, Nanjing Chemical Industrial Park, Luhe, Nanjing, Postal Code 210047, Κίνα
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας oxyfluorfen όπως προσδιορίζονται στο Annex II - Doc J της αίτησης με ημερομηνία 28.12.2011 (Αρ . Πρ. ΥπΑΑΤ 103783) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

LAINCO, S.A.

Avda. Bizet 8-12.

08191 Rubí (Barcelona) Spain

Τηλ: + 34 93 586 20 15

Fax: +34 93 586 20 16

Email: lainco@lainco.es

Mr Eduardo Viadiu

Υπεύθυνος επικοινωνίας

Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & Σια Ε.Ε.

Τσιτούρη 22, 152 31,

Χαλάνδρι

E-mail: aconconsult@otenet.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.

Φλέμινγκ 15

15123 – Μαρούσι, Αθήνα

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

LAINCO, S.A.

Avda. Bizet 8-12.

08191 Rubí (Barcelona) Spain

Τηλ.: + 34 93 586 20 15

Fax: +34 93 586 20 16

Email: lainco@lainco.es

Mr Eduardo Viadiu

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

LAINCO, S.A.
 Avda. Bizet 8-12.
 08191 Rubí (Barcelona) Spain
 Τηλ.: + 34 93 586 20 15
 Fax: +34 93 586 20 16
 Email: lainco@lainco.es
 Mr Eduardo Viadiu

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

LAINCO, S.A.
 Avda. Bizet 8-12.
 08191 Rubí (Barcelona) Spain
 Τηλ.: + 34 93 586 20 15
 Fax: +34 93 586 20 16
 Email: lainco@lainco.es
 Mr Eduardo Viadiu

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία Oxyfluorfen 24 % β/ο
 Βοηθητικές ουσίες 75,24 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στην αίτηση με ημερομηνία 28.12.2011 (Αρ . Πρ. ΥπΑΑΤ 103782) και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

2 Συσκευασία(ες)

2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	100, 250, 500 και 1000 κ.εκ.	Πλαστικό τύπου COEX με πώμα ασφαλείας
2	Κουτί με εσωτερική φιάλη	100, 250 και 500 κ.εκ.	Πλαστικό τύπου COEX με πώμα ασφαλείας, κουτί χάρτινο
3	Μπιτόνια	2, 3, (3,5), 5, 10, 20 και 25 λίτρων	Πλαστικό τύπου COEX με πώμα ασφαλείας

3 Οδηγίες χρήσης:**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες**

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός του εδάφους με μπεκ τύπου σκούπας και πίεση μικρότερη από δύο (2) atm. Ψεκασμός σε λωρίδες κοντά στο έδαφος από το φθινόπωρο έως τις αρχές της άνοιξης.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινείτε καλά τη φιάλη ή το δοχείο, πριν τα χρησιμοποιήσετε. Γεμίστε το ψεκαστικό μέσο μέχρι τη μέση με νερό και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. Ξεπλύνετε πολλές φορές τα κενά δοχεία και ρίξτε τα νερά στο ψεκαστικό. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση.

Συνδυαστικότητα: Να μη συνδυάζεται με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης εναποθέτονται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων και πολυετών πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων

5 5.1 Φάσμα δράσης

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ (κυβ. εκατ. /στρ.)	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρέμμα	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Αριθμός εφαρμογών
-Εσπεριδοειδή Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ φρούτ, Κίτρο	Ετήσια και πολυετή ζιζάνια (Πλατύφυλλα και αγρωστώδη) (1), (9)	500	30-60	Προφυτρωτικά (2), (3)	1
- Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά)	»	500	30-60	Προφυτρωτικά (2), (3)	1
Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Νεκταρινιά, Κορομηλιά, Κερασιά, Βυσσινιά)	»	500	30-60	Προφυτρωτικά (2), (3)	1
- Αμπέλια (Σταφίδες, Οινοποιήσιμα, Επιτραπέζια) (4)	»	500	30-60	Προφυτρωτικά (2), (3)	1
- Ελιές	»	500	30-60	Προφυτρωτικά (2), (3)	1
Κράμβες (Κουνουπίδι, Λάχανο) (5)	»	250-300	30-60	Πριν τη μεταφύτευση και ακολουθεί κατάκλιση.	1

Μελιτζάνα (5)	»	250-300	30-60	Πριν τη μεταφύτευση και ακολουθεί κατάκλιση.	1
Αγκινάρα	»	300	30-60	Προ της βλαστήσεως του ξηροφύτου.	1
Κρεμμύδι (6), (7)	»	150	30-60	α) Μεταφυτωτικά ως προς την καλλιέργεια, στο στάδιο των 3-4 φύλλων (στο κρεμμύδι από σπόρο) β) Εντός δύο (2) ημερών από την φύτευση (στο κρεμμύδι από κοκκάρι).	1
Ηλιάνθος	»	100	30-60	Μετά την σπορά και πριν το φύτευμα της καλλιέργειας.	1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα από το στάδιο του σπόρου μέχρι τα 2-4 φύλλα.
2. Να μη γίνεται δεύτερη εφαρμογή τον ίδιο χρόνο.
3. Η εφαρμογή να γίνεται σε ποτισμένο έδαφος.
4. Το αμπέλι πρέπει να είναι ηλικίας άνω των τριών (3) ετών και να είναι υποστυλωμένο ή αναρριχόμενο, γιατί αν είναι σε πολύ μικρή απόσταση από το έδαφος υπάρχει κίνδυνος φυτοτοξικότητας.
5. Για τις κράμβες και τη μελιτζάνα η μεγάλη δοσολογία εφαρμόζεται όταν ο πληθυσμός των ζιζανίων είναι μεγάλος και τα ζιζάνια βρίσκονται σε μεσαίο ή μέγιστο στάδιο ανάπτυξης.
6. Να χρησιμοποιείται μόνο στο κρεμμύδι που προορίζεται για παραγωγή ξηρών βολβών.
7. Στο κρεμμύδι να μην εφαρμόζεται με κρύο και υγρό καιρό.
8. Στον ηλιάνθο δόση μεγαλύτερη από 120 κ.εκ./στρ. δρα φυτοτοξικά.

9. Ζιζάνια:**α) Καταπολεμούμενα ζιζάνια**

Αγριοπαμπακιά (*Abutilon theophrasti*), Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis*), Αλεπονουρά (*Alopecurus myosuroides*), Αντράκλα (*Portulaca oleracea*), Βερόνικα (*Veronica spp.*), Δωδεκάνθι (*Lamium amplexicaule*), Ελευσίνη (*Eleusine indica*), Ζωχοί (*Sonchus spp.*), Ήρες (*Lolium spp.*), Λουβουδιά (*Chenopodium album*), Μαρτιάκος (*Senecio vulgaris*), Μεγάλο βλήτο (*Amaranthus retroflexus*), Μικρή τσουκνίδα (*Urtica urens*), Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*), Οξαλίδα (*Oxalis pes-carpae*), Περιπλοκάδα (*Convolvulus arvensis*), Ραπανίδα (*Raphanus raphanistrum*), Σετάριας (*Setaria spp.*), Στελλάρια (*Stellaria spp.*), Στύφνος (*Solanum nigrum*), Τάτουλας (*Datura stramonium*), Φυσαλίδα (*Physalis sp.*).

β) Ανθεκτικά ζιζάνια

Καλεντούλα (*Calendula arvensis*), Λάπαθα (*Rumex spp.*)

<p>6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτούγειας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί.</p>	<p>Αποφεύγετε τη χρήση του σε οργανικά εδάφη. Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. Αν ρυπανθούν τα νερά αρδύσεως, να μη χρησιμοποιηθούν για άμεση άρδευση. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών.</p>
--	---

<p>7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:</p> <ul style="list-style-type: none"> - σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα 	<p>Μη σπέρνετε και μη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια πριν περάσουν δέκα (10) μήνες από την εφαρμογή του.</p> <p>---</p> <p>---</p>
--	---

<p>8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.</p>	<p>Στις καλλιέργειες που δεν συνιστάται μπορεί να προκαλέσουν φυτοτοξικότητα ακόμη και σταγονίδια του ψεκαστικού υγρού. Στον ηλίανθο προκαλείται φυτοτοξικότητα όταν γίνεται υπέρβαση της δόσης. Στο κρεμμύδι συνήθως παρατηρείται και νέκρωση των άκρων των φύλλων, που όμως δεν έχει επιπτώσεις στην παραγωγή, γιατί είναι παροδική. Η φυτοτοξικότητα αυτή είναι πιο έντονη όταν ο καιρός είναι κρύος και υγρός.</p>
--	--

<p>9 Σήμανση σκευάσματος:</p>	<p>Xn - Επιβλαβές N - Επικίνδυνο για το περιβάλλον</p>
--------------------------------------	--

<p>10 Φράσεις R</p>	<p>R10: Εύφλεκτο. R20/21/22: Επιβλαβές όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως. R36/38: Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα. R50/53: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα και πουλιά. Μέτρια τοξικό για τις μέλισσες.</p>
----------------------------	--

11 Φράσεις S

- S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
S13 Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε.
S23 Μην αναπνέετε εκνεφώματα
S25 Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.
S36/37 Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια
S38 Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή
S43 Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιείτε διοξείδιο του άνθρακα, ξηρή χημική σκόνη ή αφρό.
S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεση τους επικίνδυνα απόβλητα.
S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
Sp1 Μη ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Μην ψεκάζετε όταν οι μέλισσες είναι παρούσες.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό).
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλείτε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.
Σε επαφή με το δέρμα: Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Απομακρύνετε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναφορέσετε.
Σε επαφή με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο τρεχούμενο νερό, κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. Εάν εμφανιστεί ερεθισμός ζητήστε την συμβουλή οφθαλμιάτρου.
 Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.
 Σε περίπτωση δηλητηρίασης ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.
 Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 - 7793777

13 Προστασία των καταναλωτών**13.1** Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)

Φυτικά προϊόντα	MRL's σε mg/kg
Έχουν καθοριστεί Ευρωπαϊκά MRLs στο Παράρτημα II του κανονισμού 396/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008.	

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Κρεμμύδι	60 ημέρες
Λοιπές καλλιέργειες	21 ημέρες

- 14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του, σε μέρος δροσερό και ξηρό, σε θερμοκρασίες άνω των 0°C, μακριά από άμεση έκθεσή του στο φως, παραμένει σταθερό για 2 (δύο) χρόνια.

15 **A. Ανάκληση της άδειας-παράταση της άδειας**

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της άδειας δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων αυτή χορηγήθηκε.

Η άδεια θα ανακληθεί στις **31.12.2013** εάν δεν υποβληθεί από τον κάτοχο της άδειας αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο που πληρεί τις απαιτήσεις του Παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 545/2011 για την αξιολόγηση των στοιχείων σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

B **Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενής επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η άδεια.
2. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της άδειας του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

M. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ