



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 14-2-2013
Αριθ. πρωτ: 1816/19628

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 72 11
e-mail: syg046@minagric.gr

Προς: SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ
Ήρας 3. Κορωπί
Τ.Κ. 19400

ΚΟΙΝ : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 14303 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) VIRGO, ως προς τον παρασκευαστή της δραστικής ουσίας και την ημερομηνία λήξης της έγκρισης»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 80 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η δραστική ουσία **Cydia pomonella granulovirus (CpGV)**.
4. Τη με αριθ. 128488/29.4.09 (ΦΕΚ 859/Β'/7.5.09) Κοινή Υπουργική Απόφαση για την "Καταχώριση ορισμένων μικροοργανισμών ως δραστικές ουσίες στο παράρτημα Ι του Προεδρικού διατάγματος αριθ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α' 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2008/113/ΕΚ της Επιτροπής της 8^{ης} Δεκεμβρίου 2008".
5. Τη με αριθ. 102696/23.7.2002 (ΦΕΚ 1047/Β'/9.8.2002) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας για «επανεγκριση των σκευασμάτων μετά την καταχώριση στο Παρ/μα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ της/των δραστικών ουσιών του σκευάσματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2008.
7. Τη με αριθ. 280665/6.4.2009 (ΦΕΚ 970/Β'/22.5.2009) Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για "Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με «Έντολή Υφυπουργού».
8. Την από 29-4-09 (α.π. 128618) αίτηση της εταιρείας SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Τροποποιούμε την με αριθ. **14303** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **VIRGO**, η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 123481/23.10.08 απόφασή μας, ως προς τον παρασκευαστή της δραστικής ουσίας και την ημερομηνία λήξης της έγκρισης. Η έγκριση διαμορφώνεται ως ακολούθως:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

14303**23-10-2008****30.04.2014****1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

VIRGO

1.2.β Μορφή:

Πυκνό αιώρημα (SC)

1.3 Δραστική ουσία (ες)

α) Κοινή ονομασία της/των δραστική/ζών ουσίας/ών κατά ISO

Cydia pomonella granulovirus (CpGV)

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

Baculovirus 2×10^{13}
granules CpGV/L

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

SIPCAM SpA, ITALY (Biotechnologie BT Srl, Italy)

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

BIOTECHNOLOGIE B.T. S.r.l., Parco Tecnologico Agro-Alimentare dell' Umbria, Frazione Pantalla di Todi I-06050 (Perugia), Italy, tel.: ++39 075 895 0959, fax: ++39 075 888 776, email: smorandi@biotecnologiebt.it

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

έχουν υποβληθεί από τον υποστηρικτή της δραστικής ουσίας και παραμένουν στα αρχεία της αρμόδιας αρχής

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

SIPCAM SpA, Via Sempione 195, Pero (MI) Ιταλία
T.K. 20016, Τηλ.: 00390235378400, Fax: 0039023390275,
E-mail sipcamexport@sipcam@otenet.gr

β) Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά σύμφωνα με το νόμο 4036/2012:

SIPCAM ΕΛΛΑΣ Mon. ΕΠΕ, Ήρας 3. Κορωπί
T.K. 19400, Τηλ.: 210 5223834
Fax: 210 5223139, E-mail: info@sipcam.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

SIPCAM SpA, Via Sempione 195, 20016, Pero, MI, Ιταλία.

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: SIPCAM SpA, Ιταλία.

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: SIPCAM SpA, Ιταλία.

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Cydia pomonella granulovirus (CpGV)
Baculovirus 2X10¹³ granules CpGV/L
Βοηθητικές ουσίες 96% β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση έχει υποβληθεί και παραμένει στα αρχεία της αρμόδιας αρχής.

2 Συσκευασία(ες)

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
	Φιάλες	175, 250, 350, 500κ.εκ & 1, 2, 5 & 10 λίτρα	PE (πολυαιθυλένιο), HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) COEX

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκάσμος πλήρους κάλυψης.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

-Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο με το μισό της ποσότητας του απαιτούμενου νερού (το pH του νερού πρέπει < 7.5, ή να έχει διορθωθεί στο άριστο pH 6-6.5 με κατάλληλο γι' αυτό τον σκοπό σκεύασμα).

-Αναδεύουμε καλά το σκεύασμα μέσα στην κλειστή συσκευασία του και ογκομετρούμε την ποσότητα που αναλογεί στην επιφάνεια που θέλουμε να ψεκάσουμε.

-Αραιώνουμε την ποσότητα αυτή σε μικρή ποσότητα νερού και ρίχνουμε το διάλυμα στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας.

-Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: ---

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης εναποθέτονται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση των προνυμφών της καρπόκαψας της μηλιάς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προγράμματα ολοκληρωμένης καταπολέμησης. Δρα μέσω της κατάποσης και οι προνύμφες θανατώνονται μετά από 3-5 ημέρες.

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις			Χρόνος εφαρμογής
		κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / στρέμμα)	κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα max	
Μηλοειδή Μηλιά, Αχλαδιά	Καρπόκαψα (<i>Cydia pomonella</i>)	30-50*	100-150	75**	Συνιστώνται 3 ψεκασμοί ανά γενεά του εντόμου (2-3 γενεές/ έτος). Έναρξη επεμβάσεων από την πρώτη γενεά της καρπόκαψας, αμέσως πριν ή κατά την εκκόλαψη των προνυμφών και ανάλογα με την πορεία του ενήλικου πληθυσμού.*** Οι υπόλοιπες με μεσοδιάστημα 7-10 ηλιόλουστες ημέρες, ανάλογα με τη δόση εφαρμογή. Δύο μερικώς ηλιόλουστες ημέρες αντιστοιχούν σε μία ηλιόλουστη.

* Το εύρος της δόσης εξαρτάται από την ένταση της προσβολής.

** Η ελάχιστη δόση ανά στρέμμα δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 35κ.εκ.

*** Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων των Περιφερειακών Κέντρων Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου, καθώς και τις συλλήψεις των ενηλίκων του εντόμου στις φερομονικές παγίδες.

Παρατηρήσεις:

1. Ετοιμάστε το ψεκαστικό υγρό αμέσως πριν τη χρήση του.

2. Η ειδική σύσταση του προϊόντος επιτρέπει την αποφυγή προσθήκης προστατευτικών κατά των ακτινών UV και /ή ελκυστικών τροφής.
3. Η εφαρμογές να γίνονται κατά προτίμηση τις βραδινές ώρες ή όταν είναι μειωμένη η ένταση του φωτός.
4. Κατά την εφαρμογή του σκευάσματος το φύλλωμα των δέντρων να μην είναι υγρό από βροχή ή δροσιά.

6	Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί	--
----------	---	----

7.	Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:	
	-σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:	---
	-σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:	---
	-της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:	SY 12: -Χρόνος επανεισόδου σε περιοχή που εφαρμόστηκε το σκεύασμα: 4 ώρες. -Σε περίπτωση εισόδου στον αγρό πριν τη διέλευση 4 ωρών από την εφαρμογή του σκευάσματος, να φοράτε ολόσωμη προστα-τευτική φόρμα, γυαλιά και γάντια.

8	Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.	Δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες που αναφέρονται στο φάσμα δράσης και τις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες.
9	Σήμανση σκευάσματος:	---

10	Φράσεις R	---
-----------	-----------	-----

11	Φράσεις S	S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. S20/21 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. “Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.”
-----------	-----------	---

12	Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο	S 45: Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε αυτή την ετικέτα όπου είναι δυνατό). S 63: Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω εισπνοής: απομακρύνετε το θύμα από το μολυσμένο χώρο και αφήστε το να ηρεμήσει. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.
-----------	----------------------------	--

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)	Φυτικά προϊόντα	Προσωρινά (σε mg/kg)
	Εξαιρείται υποχρέωσης καθορισμού MRLs	
13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις	Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
	Μηλιά, αχλαδιά	3

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του σε συνθήκες ψυγείου (4-5°C), παραμένει σταθερό για ένα χρόνο από την ημερομηνία παρασκευής του. Σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, σε ξηρό δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο, παραμένει σταθερό για 4 μήνες. Επιτρέπεται η διακίνηση και η εμπορία από καταστήματα που διαθέτουν κατάλληλα ψυγεία αποθήκευσης.

15. Εισαγωγή του σκευάσματος: Για κάθε παρτίδα του σκευάσματος που πρόκειται να εισαχθεί:

- α) θα γίνεται γνωστοποίηση της εισαγωγής στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
- β) θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από δήλωση της παρασκευάστριας εταιρείας, σχετικά με την ταυτότητα του στελέχους του ιού GrGV και από πιστοποιητικό ανάλυσης διαπιστευμένου εργαστηρίου, στο οποίο θα πιστοποιούνται τα ακόλουθα:
 - η εγγυημένη σύνθεση του (όπως αυτή αναφέρεται στην παράγραφο 3 της παρούσας απόφασης) και η μέθοδος ανάλυσης
 - ότι η παρτίδα παραγωγής είναι ελεύθερη ανθρώπινων παθογόνων
 - ότι οι βακτηριακές προσμίξεις δεν ξεπερνούν τη μία (1) βακτηριακή μονάδα (Colony Forming Unit, CFU) ανά 1000 ιούς CrGV
 - οι μικροβιακές και οργανικές προσμίξεις.

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων αυτή χορηγήθηκε.

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση του από τη χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί παράπτωμα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ