



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 30 5 - 2011
 Αριθ. πρωτ: 97152

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
 Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
 TELEFAX: 210 92 12 090
 Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου
 Τηλέφωνο: 210 92 87 161
 e-mail: syg036@minagric.gr

Προς: Greenfarm Χημικά Α.Ε.
 Παπαδά 2 και Μεσογείων,
 115 25, Αθήνα
 (με απόδειξη)

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση οριστικής έγκρισης
 διάθεσης στην αγορά στο
 φυτοπροστατευτικό προϊόν
 (ζιζανιοκτόνο)
 WEEDAZOL® TL ”

- Κοιν.: 1. Γραφείο Υπουργού
 κ. Κ. Σκανδαλίδη
 2. Γραφείο Υφυπουργού
 κ. Ι. Κουτσούκου
 3. Περιφερειακές Ενότητες
 Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας
 και Κτηνιατρικής (με e-mail)
Έδρες τους
 4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
 Ινστιτούτο
 Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
 Φαρμάκων
 Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά
 5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους
 6. ΕΣΥΦ
 Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα
 7. Εσωτερική διανομή:
 -Τμήματα Β', Γ' & Ε' της
 Δ/νσής μας
 -Γραμματεία της Δ/νσής μας
 8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων
 Διδότου 26, Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως έχει συμπληρωθεί και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. (1) και το άρθρο 10 αυτής .
2. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Απόφαση του Υπ. Γεωργίας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», όπως ισχύει σήμερα και τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.
3. Την Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθ. 119119/19-7-2004 (ΦΕΚ 1177/Β/2-8-2004) για την «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 115/1997, Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Α΄ 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2003/82/ΕΚ της Επιτροπής».
4. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου
5. Τη με αριθ. 92433/27-3-2002 (ΦΕΚ 416/Β/5-4-2002) Κοινή Απόφαση των Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας, με την οποία καταχωρήθηκε στο Παρ/μα Ι του ΠΔ 115/1997 η δραστική ουσία amitrole.
6. Την Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθ. 124830/12-12-2007 (ΦΕΚ 2478/Β/31-12-2007) για την «Αμοιβαία αναγνώριση εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων
7. Την με αριθ. 95187/6-4-201 (ΦΕΚ 570/Β/11-4-2011) Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όσον αφορά την Τροποποίηση των κοινών υπουργικών αποφάσεων με αριθ. 88301/29.1.2002, 89619/19.2.2002, 87348/22.2.2002, 92433/27.3.2002, 93586/2.5.2002, 102692/24.7.2002, 110095/29.10.2002, 97016/21.3.2003, 101381/27.5.2003, 101382/27.5.2003 και 87350/29.1.2002, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2010/77/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη λήξη της ημερομηνίας για τη καταχώριση ορισμένων δραστικών ουσιών στο παράρτημα Ι του Π.Δ. 115/97
8. Την έγκριση του από την Γαλλία.
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/7.9.2010 (ΦΕΚ 154/Α΄/7-9-2010) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Τη με αριθ. 271752/21.10.2010 (Β΄ 1673) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για “ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ελένη – Μαρία Αποστολάκη και Ιωάννη Κουτσούκο
11. Την από 6-5-2010 αίτηση της εταιρείας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το ΠΔ 115/97, άρθρο 4 παρ.(1), στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **WEEDAZOL® TL 22.9 SL** της εταιρείας **Greenfarm Χημικά Α.Ε.** με τα ακόλουθα στοιχεία :

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1	Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)	7963
1.1.α	Ημερομηνία χορήγησης	30-5-2011
1.1.β	Ημερομηνία λήξης	31-12-2015
1.2	Φυτοπροστατευτικό προϊόν	
1.2.α	Εμπορικό όνομα	WEEDAZOL® TL
1.2.β	Μορφή	ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ (SL)
1.3	Δραστική ουσία	
α)	Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	Amitrole (Ομάδα διφαινυλικών αιθέρων)
β)	Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:	92.5%
γ)	Παρασκευαστής της δ.ο.:	Nufarm S.A.S. 28, boulevard Camélinat F-92230 Gennevilliers Γαλλία
δ)	Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	ARKEMA Γαλλίας (Η διεύθυνση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας)
ε)	Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας amitrole προσδιορίζονται στο εμπιστευτικό τμήμα που συνοδεύει την αίτηση με αριθ.πρωτ.184308/6-5-2010 και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

- | | |
|--|---|
| α) Κάτοχος της έγκρισης | Greenfarm Χημικά Α.Ε.
Παπαδά 2 και Μεσογείων,
115 25, Αθήνα
Τηλ: 210 69 90 932
Fax: 210 69 90 862
e-mail: info@gr.nufarm.com |
| β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης) | Ο Κάτοχος της έγκρισης |
| γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: | Nufarm S.A.S.
28, boulevard Camélinat
F-92230 Gennevilliers
Γαλλία |
| δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος | Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
Nufarm S.A.S., Γαλλία
(Η διεύθυνση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο εμπιστευτικό τμήμα που συνοδεύει την παρούσα αίτηση και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής) |
| ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος | Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
1. Nufarm S.A.S.
2. Ελλαγρέτ ΑΒΕΕ
(Οι διευθύνσεις των εργοστασίων είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκονται στο εμπιστευτικό τμήμα που συνοδεύει την παρούσα αίτηση και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής) |
| στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: | Δραστική ουσία: Amitrole 22.90 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 77.85% β/β
(περιέχει Ammonium thiocyanate 21.50 % β/ο)
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στο Τμήμα ΙΙΙ που συνοδεύει την αίτηση με αριθ.πρωτ.184308/6-5-2010 και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.. |

2 Συσκευασία(ες)

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	1.5, 2, 2.5 5 Λίτρα	HDPE
2	Δοχείο	10, 20 Λίτρα	HDPE

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ομοιόμορφος καθολικός μεταφωτρωτικός ψεκασμός των ζιζανίων, ή εφαρμογή με κατευθυνόμενο ψεκασμό στη γραμμή σποράς, όταν αυτά στο σύνολό τους έχουν φυτρώσει, με 20 ως 60 λίτρα νερό ανά στρέμμα, με πίεση 2.5 ως 3 ατμόσφαιρες και μπεκ τύπου «σκούπας».

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και θέστε σε λειτουργία την ανάδευση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του Weedazol® TL 22.9 SL και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Η ανάδευση να συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της εφαρμογής.

Καθαρισμός ψεκαστήρα:

Αμέσως μετά τη χρήση του Weedazol® TL 22.9 SL αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε σχολαστικά τα μέρη του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό. Γεμίστε το δοχείο με καθαρό νερό και αφήστε το γεμάτο καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό μία ακόμη φορά.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Η απόσυρση ή καταστροφή του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό μεταφωτοτροφικό ζιζανιοκτόνο για την αντιμετώπιση ετησίων, διετών και πολυετών πλατυφύλλων και αγρωστοδών ζιζανίων και ορισμένων θάμνων. Καταστρέφει πλήρως το υπέργειο και υπόγειο μέρος των ευαίσθητων φυτών. Τα πρώτα συμπτώματα στα ζιζάνια εμφανίζονται 15 με 30 ημέρες μετά την εφαρμογή. Η ανάπτυξη των ζιζανίων σταματά και αυτά νεκρώνονται. Σε ορισμένα πολυετή ζιζάνια στα οποία η εφαρμογή πραγματοποιήθηκε σε ξυλοποιημένα ή ημιξυλοποιημένα μέρη το φθινόπωρο, τα συμπτώματα εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του χειμώνα και κατά την έναρξη της βλάστησης τον επόμενο άνοιξη. Απορροφάται γρήγορα από τα φύλλα και τα πράσινα μέρη των φυτών και τις ρίζες, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, Αποτέλεσμα της δράσης του είναι η εμφάνιση λευκών κηλίδων (λευκάνσεις) στα φύλλα των ευαίσθητων ζιζανίων λόγω έμμεσης καταστροφής της χλωροφύλλης, όμως ο ακριβής τρόπος δράσης δεν είναι γνωστός.

5 5.1 Φάσμα δράσης

Καλλιέργειες	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο
		Κ.εκ./ στρέμμα (Ελαχ-Μεγ)	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Ακρόδρυα Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Πυρηνόκαρπα Βερικοκιά, Ροδακινιά, Δαμασκηλιά, Κερασιά Μηλοειδή Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά	Ετήσια ζιζάνια Πολυετή ζιζάνια	1200	20-60	Κατευθυνόμενος ψεκασμός των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης, όταν τα πλατύφυλλα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης και τα αγρωστώδη πριν το αδέλφωμα Εφαρμογή το φθινόπωρο ή/και την Άνοιξη	2
		Φθινοπωρινή εφαρμογή Ή 1500 Ανοιξιάτικη εφαρμογή			2
Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα)					2
Αγροί μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας, για καταστροφή της καλαμιάς ή μεταξύ των καλλιεργειών, ακαλλιεργητες εκτάσεις	Ετήσια ζιζάνια καταστροφή της καλαμιάς και αναβλαστήσεις από προηγούμενες καλλιέργειες Πολυετή ζιζάνια	800 - 1200		Καθολικός ψεκασμός των ζιζανίων, της καλαμιάς και των αναβλαστήσεων. Εφαρμογή το φθινόπωρο. Εφαρμογή την άνοιξη.	2
		1200 - 1500 1500			2
Φυτόρια Καλλωπιστικών δέντρων και δεντρολίων	Ετήσια και Πολυετή ζιζάνια	1500		Κατευθυνόμενος ψεκασμός μεταξύ των γραμμών φύτευσης, όταν τα πλατύφυλλα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης και τα αγρωστώδη πριν το αδέλφωμα	2

Παρατηρήσεις:**Ετήσια ζιζάνια:**

Πολύ ευαίσθητα πλατύφυλλα ζιζάνια: Αγριόβικος (*Vicia* spp.), Αγριομάρουλο (*Lactuca serriola*), Αγριοτρίφυλλο (*Trifolium* spp.), Βερόνικα (*Veronica* spp.), Βρωμόλαχανο (*Cardaria draba*), *Diplotaxis* spp., Ζωχοί (*Sonchus* spp.), Καψέλα (*Capsella bursa-pastoris*), Καλέντουλα (*Calendula arvensis*), Κόνυζα (*Conyza Canadensis*), Μαρτιάκος (*Senecio vulgaris*), Πεντάνευρο (*Plantago lanceolata*), Χοιροβότανο (*Picris echinoides*), Παπαρούνα (*Papaver rhoeas*), Πικραλίδα (*Crepis* sp.), Στελλάρια (*Stellaria media*), Χαμομήλι (*Chamomilla recutita*).

Πολύ ευαίσθητα αγρωστώδη ζιζάνια: Πόα κοινή (*Poa annua*).

Ευαίσθητα πλατύφυλλα ζιζάνια: Αγριοκαρότο (*Daucus carota*), Αγριοτομάτα /στύφνος (*Solanum nigrum*), Βελονάκι /Πηρουνάκι (*Erodium* spp), Βλήτα (*Amaranthus* spp.), Γεράνια (*Geranium* spp.), Γλιστρίδα /Αντράκλα (*Portulaca oleracea*), Κολλητσίδα μεγαλόκαρπη (*Galium aparine*), Λάμια (*Lamium* spp.), Λουβουδιές (*Chenopodium* spp.), Μολόχα (*Malva* spp.), Σκαρολάχανο (*Mercurialis annua*), Τοριλίδα (*Torilis* spp.).

Πολυετή ζιζάνια και θάμνοι:

Ευαίσθητα πλατύφυλλα ζιζάνια και θάμνοι, Αγριοράδικο (*Taraxacum officinale*), Βάτα (*Rubus* spp), Γαϊδουράγκαθα (*Carduus* spp.), , Πολυκόμπι (*Equisetum arvense*).

Ευαίσθητα αγρωστώδη ζιζάνια: Αγρόπυρο (*Agropyron repens*)

1. Στις δενδρώδεις καλλιέργειες (ακρόδρυα, πυρηνόκαρπα και μηλοειδή) και στο αμπέλι, ο ψεκασμός γίνεται κατευθυνόμενος, με μεγάλη προσοχή ώστε να αποφεύγεται η επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού με το φύλλωμα, τρυφερούς βλαστούς, παραφυάδες και μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος τρυφερούς.
2. Στις καλλιέργειες Αμυγδαλιάς, Φουντουκιάς, Καρυδιάς, Αχλαδιάς, Βερικοκκιάς, Κερασιάς και Αμπελιού, η εφαρμογή επιτρέπεται μόνο σε εγκατεστημένες καλλιέργειες, ηλικίας μεγαλύτερης των 4 ετών. Σε καλλιέργειες μηλιάς, ροδακινιάς και δαμασκηνιάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε φυτώρια.
3. Το εύρος της δόσης εξαρτάται από την ευαισθησία των ζιζανίων, τις συνθήκες και το χρόνο εφαρμογής. Σε μικρούς πληθυσμούς ζιζανίων, για ζιζάνια που βρίσκονται σε νεαρό στάδιο και παρουσία υγρασίας, χρησιμοποιείται η χαμηλότερη δόση. Για λιγότερο ευαίσθητα ζιζάνια, ή την άνοιξη χρησιμοποιείται η μεγάλη δόση.
4. Σε περίπτωση εφαρμογών μικρής έκτασης, συνιστάται η εφαρμογή του με συγκέντρωση 3% σκευάσματος, (με βάση 50 λίτρα ψεκαστικού δ/ος στο στρέμμα)..
5. Σε κάθε περίπτωση εφαρμογής η μέγιστη συνιστώμενη δόση εφαρμογής ανά καλλιεργητική περίοδο είναι τα 1500 κ. εκ. / στρέμμα

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

1. Η διείσδυση του Weedazol[®] TL 22.9 SL στα φυτά ευνοείται από την υγρασία.
2. Η αποτελεσματικότητα δεν επηρεάζεται αν ακολουθήσει βροχή σε διάστημα 2 ωρών μετά την εφαρμογή.
3. Το Weedazol[®] TL 22.9 SL δεν πρέπει να εφαρμόζεται αν το φύλλωμα των ζιζανίων είναι υγρό.
4. Μην εφαρμόζετε το Weedazol[®] TL 22.9 SL σε γυμνό έδαφος, σε περιόδους ξηρασίας και όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες.
5. Βέλτιστη αποτελεσματικότητα του Weedazol[®] TL 22.9 SL επιτυγχάνεται όταν εφαρμόζεται με θερμό καιρό, παρουσία υγρασίας, σε ζιζάνια στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης
6. Για την αποφυγή της διασποράς των ψεκαστικών σταγονιδίων σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες, μη ψεκάζετε όταν φυσάει.
7. Να μη χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες αχλαδιάς, σε αμμώδη εδάφη όπου οι ρίζες της αχλαδιάς είναι ξεσκέπαστες

Διαχείριση της ανθεκτικότητας: Για αποφυγή της εμφάνισης φαινομένων ανθεκτικότητας προτείνεται η χρήση εναλλακτικών μέσων αντιμετώπισης των ζιζανίων (μηχανικές μέθοδοι, καλλιεργητικά μέτρα, κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και εναλλαγή ή συνδυασμός με ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό μηχανισμό δράσης.

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

Μη σπέρνετε ή μη φυτεύετε καλλιέργεια αγρωστωδών πριν περάσουν 3 εβδομάδες από την εφαρμογή του ή πλατύφυλλη καλλιέργεια πριν περάσουν 6 εβδομάδες από την εφαρμογή του.

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μην εισέρχετε στην ψεκασμένη περιοχή πριν περάσουν 6 ώρες από την εφαρμογή του

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται στις καλλιέργειες για τις οποίες είναι εγκεκριμένο, και σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του, για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

- 9** Σήμανση σκευάσματος:

Xn Επιβλαβές
N Επικίνδυνο για το περιβάλλον

- 10** Φράσεις R

R32 Σε επαφή με οξέα, ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια.
R48/22 Επιβλαβές: Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης.
R63 Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.
R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

- 11** Φράσεις S

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.
S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
S36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
S46 Σε περίπτωση κατάποσης, αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
S49 Διατηρήστε το μόνο στην αρχική του συσκευασία.
S60 Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα
S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε στις ειδικές οδηγίες – Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.
Sp1 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
Spe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια ανέκαστη ζώνη 5 μέτρων γύρω από τα επιφανειακά ύδατα.
Spe8 Για να προστατέψετε τις μέλισσες καθώς και τα ωφέλιμα έντομα που συμβάλλουν στην επικονίαση, να μη χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της άνθησης. Να μη χρησιμοποιείται όταν οι μέλισσες είναι παρούσες.
Να μην εφαρμόζεται κατά την περίοδο αναπαραγωγής των πτηνών και θηλαστικών

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε προληπτικά γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν μολυνθεί και πλύνετε τα πριν τα χρησιμοποιήσετε ξανά. Πλύνετε το δέρμα και τα σημεία που έχουν μολυνθεί με άφθονο νερό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για 15 λεπτά. Εφόσον ο ερεθισμός επιμένει, συμβουλευτείτε έναν οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε γιατρό. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό Αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1	Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)	Φυτικά Προϊόντα	Προσωρινά σε mg/kg
	Amitrole	Έχουν καθοριστεί κοινοτικά MRLs στον Κανονισμό 396/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 149/2008	
13.2	Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις	Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
		Αμπέλι	42
		Λοιπές καλλιέργειες	35

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Μην αφήσετε το προϊόν να παγώσει. Αποθηκευόμενο στην αρχική του σφραγισμένη συσκευασία, σε θερμοκρασία > 0°C, σε χώρο ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από οξέα, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

Β**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Ι. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε. ΧΑΤΖΗ

Α-7 (GAP)
ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Κοινή ονομασία ή κατά EEC, CIPAC and CCPR No (s): Amitrole
 Εμπορικό όνομα: WEEDAZOL® TL 22.9 SL
 Κύριες χρήσεις π.χ. εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο: Ζιζανιοκτόνο

Ημερομηνία: Απρίλιος 2010
 Σελίδα:
 Χώρα: Ελλάδα

1	2	3	4	5	6		7			8			9	10	
					Σκεύασμα		Εφαρμογή			Δοσολογία ανά επέμβαση					
Καλλιέργεια Και/ή Συνθήκες χρήσης	Κράτος Μέλος ή χώρα	Εμπορικό όνομα του σκευάσματος	(Α) (Θ) ή (Κ)	Εχθρός, ομάδα εχθρών ή ασθενειών ή ζιζανίων που ελέγχονται	Μορφή	Περιεκ σε δ.ο.	Μέθοδος / τρόπος	Στάδιο Ανάπτυξης και εποχή	Αριθμός Εφαρμογών ελάχ. - μεγ.	Χρονικό διάστημα μεταξύ των εφαρμογών (ελάχ.)	Χλ.γρ. δ.ο. / εκατόλιτρο	λίτρα ψεκαστ. υγρού / εκτάριο	Χλ.γρ δ.ο. /εκτάριο	Τελευταία Επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες)	Παρατηρήσεις
(α)			(β)	(γ)	(δ-στ)	(θ)	(στ-η)	(ι)	(κ)		ελάχ. - μεγ.	ελάχ. - μεγ.	ελάχ. - μεγ.	(λ)	(μ)
Ακρόδρυα Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Πυρηνόκαρπα Ροδακινιά, Δαμασκηλιά, Βερικοκιά, Κερασιά Μηλοειδή Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά	Ελλάδα	Weedazol® TL 22.9 SL	A	Ετήσια και πολυετή πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια.	SL	229 gr/L	Κατευθυνόμενος/ψ εκασμός των ζιζανίων. Να αποφεύγεται η επαφή με το φύλλωμα, τους τρυφερούς βλαστούς, τις παραφυάδες και τις μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος.	Εφαρμογή σε ζιζάνια που έχουν βλαστήσει. Εφαρμογές το φθινόπωρο, το χειμώνα και την άνοιξη: Εφαρμογή στα νεαρά δικοτυλίδωνα και στα αγρωστώδη πριν το αδελφωμα.	2			200 - 600	2.75 - 3.44	35	
								Εφαρμογή σε ανεπτυγμένα ζιζάνια το φθινόπωρο, το χειμώνα και την άνοιξη: Εφαρμογή στα νεαρά δικοτυλίδωνα και στα αγρωστώδη πριν το αδελφωμα.	2			200 - 600	2.75 - 3.44	42	
								Εφαρμογή σε ανεπτυγμένα ζιζάνια το φθινόπωρο, το χειμώνα και την άνοιξη: Εφαρμογή στα νεαρά δικοτυλίδωνα και στα αγρωστώδη πριν το αδελφωμα.	2			200 - 600	2.75 - 3.44	Μη εφαρμόσιμο	
Φυτόρια Καλλωπιστικ ών δέντρων και δεντρολίων							Κατευθυνόμενος ψεκασμός μεταξύ των γραμμών φύτευσης.	Όταν τα πλατύφυλλα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης και τα αγρωστώδη πριν το αδελφωμα	2			200-600	3.44	M.E.	

Παρατηρήσεις: (α) Για τις καλλιέργειες, η ταξινόμηση της ΕΕ και του Codex (και τα δύο) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Οπου βρίσκεται εφαρμογή, οι συνθήκες χρήσης θα πρέπει να περιγράφονται (π.χ. καπνισμός των κατασκευών)

(β) Ανοιχτού αγρού (Α), εφαρμογές σε θεμοκήπια (Θ) ή σε κλειστούς χώρους (Κ)

(γ) π.χ. μασητικά και μυζητικά έντομα, έντομα εδάφους, έντομα φυλλώματος, ζιζάνια

(δ) π.χ. βρέξιμη σκόνη (WP), γαλακτωματοποιήσιμο συμπύκνωμα (EC)

(η) Τρόπος, πχ σε όλη την επιφάνεια, από αέρος, στις γραμμές, ατομικά φυτά- ο τύπος του ψεκαστικού μηχανήματος θα πρέπει να προσδιορίζεται

(θ) g/kg ή g/l

(ι) Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία εφαρμογή (BBCH Monograph, Growth Stages of Plants, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), περιλαμβάνοντας όπου βρίσκεται εφαρμογή, πληροφορίες σχετικά με την εποχή κατά τον χρόνο εφαρμογής

Α-7 (GAP)
ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Κοινή ονομασία ή κατά EEC, CIPAC and CCPR No (s):

Amitrole

Ημερομ: Απρίλιος 2010

Εμπορικό όνομα:

WEEDAZOL® TL 22.9 SL

Σελίδα:

Κύριες χρήσεις π.χ. εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο:

Ζιζανιοκτόνο

Χώρα: Ελλάδα

1	2	3	4	5	6		7			8			9	10
Καλλιέργεια Και/ή Συνθήκες χρήσης (α)	Κράτος Μέλος ή χώρα	Εμπορικό όνομα του σκευάσματος	(A) (Θ) ή (K) (β)	Εχθρός, ομάδα εχθρών ή ασθενειών ή ζιζανίων που ελέγχονται (γ)	Σκεύασμα		Εφαρμογή			Δοσολογία ανά επέμβαση			Τελευταία Επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες) (λ)	Παρατηρήσεις (μ)
					Μορφή (δ-στ)	Περιεκ σε δ.ο. (θ)	Μέθοδος / τρόπος (στ-η)	Στάδιο Ανάπτυξης και εποχή (ι)	Αριθμός Εφαρμογών ελάχ. - μεγ. (κ)	Χρονικό διάστημα μεταξύ των εφαρμογών (ελάχ.)	Χλγρ. δ.ο. / εκατόλιτρο ελάχ. - μεγ.	λίτρα ψεκαστ. υγρού / εκτάριο ελάχ. - μεγ.		

(ε) GCPF Κώδικες- GIFAP Technical Monograph No 2, 1989

(κ) Ο ελάχιστος και ο μέγιστος δυνατός αριθμός εφαρμογών υπο πρακτικές συνθήκες

(στ) Όλες οι χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες θα πρέπει να εξηγούνται

(λ) Ελάχιστο χρονικό μεσοδιάστημα πριν την συγκομιδή (PHI)

(ζ) Μέθοδος π.χ. ψεκασμός υψηλού όγκου, χαμηλού όγκου, σκονισμός

(μ) Οι παρατηρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: οικονομική σημασία/ περιορισμούς στη χρήση