



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Αθήνα 29-2-2000

Αριθ. Πρωτ.: 90227

**Ταχ. Δ/ση : Ιπποκράτους 3-5
Ταχ. Κώδικας : 101 64 ΑΘΗΝΑ**

**ΠΡΟΣ: 1) Παπαιοκονόμου Αγροχημικά ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ.**

**Τ.Θ. 89, 57022 Σίνδος
(Με απόδειξη)**

2) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

**α) Δ/σεις Γεωργίας
Έδρες τους**

**β) Δ/σεις Εμπορίου
Έδρες τους**

**3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο**

Τμήμα Ελέγχου

Γεωργικών Φαρμάκων

Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά

TELEFAX: 3617103

Πληροφορίες: Α.Φονταρά

Τηλέφωνο: 5291411

Sulfo96

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης
κυκλοφορίας στο φυτοπρο-
στατευτικό προϊόν (μυκητοκτό-
νο) SULFOMAT 96 DP**

ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 για «την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το άρθρο 2, παρ. 2 και το άρθρο 5, παρ.8.
2. Τη με αριθ.85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το Κεφ. Β, παρ. 1.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», καθώς και το με αριθ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) Π.Δ.
4. Τη με αριθ. 77098/4-7-96 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 6646 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο όμοιο με το αιτούμενο σκεύασμα SULPHUR UZINA 96 DP.
5. Τη με αριθ. 3396/3-11-98 (ΦΕΚ 1165/Β/9-11-98) απόφαση του κ. Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για «ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας κ. κ. Κων/νο Βρεττό και Παρασκευά Φουντά».
6. Τις από 29-4-98 και 30-8-99 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 30-8-99 πρωτόκολλο εξέτασης του σχετικού φακέλου.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **6797** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** SULFOMAT 96 DP
2. **Μορφή:** Σκόνη επίπασης (DP)
3. **Εγγυημένη σύνθεση :** sulphur 96 % β/β
βοηθητικές ουσίες: 3,52 % β/β
4. **Καθαρότητα** Technical από το οποίο παρασκευάζεται: 99,5 % min.
5. **Παρασκευαστής:** Παπαιοκονόμου Αγροχημικά ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Θ., Σίνδος
6. **Αντιπρόσωπος :** -
7. **Τυποποιητής :** DEVIDAYAL AGRO CHEMICALS, Ινδία
8. **Συσκευαστής:** Παπαιοκονόμου Αγροχημικά ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος
9. **Συσκευασία :** **9α. Είδος-Μέγεθος:** **α1.** Σακούλες 1, 2, 3 και 6 κιλών
α2. Σάκοι 25 κιλών
9β. Υλικό: **β1.** Πολυαιθυλένιο (PE) +πολυεστέρας 125-130 μ.
β2. Τριπλόι χάρτινοι με εσωτερική σακούλα από πλαστικό PE
10. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης:**
Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.

11. **Τρόπος εφαρμογής :** Με επίπαση ως έχει.

12. **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** -----

13. **Φάσμα δράσης.**

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	ΔΟΣΕΙΣ Χλγ./στρ.	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αμπέλι	Ωίδιο (Uncinula necator)	2-3	α. Όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 10 εκ. β. κατά την άνθηση γ. μετά το δέσιμο των ραγών δ. κάθε 15-20 ημέρες μέχρι το στάδιο του γυαλίσματος των ραγών ανάλογα πάντοτε με την ένταση της προσβολής.
Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά	Ωίδιο (Leveillula taurica)	2-3	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής ανά 10-15 ημέρες.
Αγγούρι, Κολοκύθι, Καρπούζι Πεπόνι	Ωίδιο (Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum)	2-2,5	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής ανά 10-15 ημέρες.

Τριανταφυλλιά	Ωίδιο (Sphaerotheca pannosa)	2-2,5	Προληπτικά μόλις οι βλαστοί αποκτήσουν μήκος 10-15 εκ. και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της ασθένειας.
---------------	------------------------------------	-------	---

Παρατηρήσεις:

Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθeneιών.

Στις καλλιέργειες αμπέλι και λαχανικά υπό κάλυψη να ακολουθούνται, στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.

Το θειάφι έχει μέτρια δράση κατά των ακάρεων.

Το θειάφι δεν δρά σε θερμοκρασία μικρότερη των 18° C.

Δρά καλύτερα σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 20° C.

14. Φυτοτοξικότητα:

Μη χρησιμοποιείτε το SULFOMAT 96 μέσα σε 4 εβδομάδες από την εφαρμογή πολτού, γιατί προκαλεί φυτοτοξικότητα.

Σε υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 28° C) παρουσιάζονται εγκαύματα στα φυτά.

Το θειάφι μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα στα κολοκυνθοειδή.

15. Συνδυαστικότητα:

Δεν συνδυάζεται με άλλο γεωργικό φάρμακο. Εφαρμόζεται μόνο του.

16. Σημάνσεις Τοξικότητας: Xi, Ερεθιστικό.

Αναφλεξιμότητας:-----

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

R36/38 Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):

RO3 Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

S3/9 Διατηρήστε το μόνο στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος.

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S15 Μακριά από θερμότητα.

S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, ή καπνίζετε.

S24/25 Αποφεύγετε επαφή με τα μάτια και το δέρμα.

S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό για 15 λεπτά της ώρας.

S27 Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν λερωθεί. Αν πάρουν φωτιά τα ρούχα σας και είναι λερωμένα με θειάφι κινδυνεύετε να πάθετε πολύ σοβαρά εγκαύματα.

S28 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

S35 Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας.

S37/39 Φοράτε γάντια και γυαλιά με πλαστικό σκελετό.

- S41** Σε περίπτωση πυργκαγιάς μην αναπνέετε τους καπνούς.
SY8 Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.
SY10 Μην αυξάνετε τις δόσεις.
SY11 Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του.
Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα αντίθετα στον άνεμο.

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο :

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 77 93 777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 5 ημέρες

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Στην αρχική κλειστή συσκευασία του σε μέρος ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο και μακριά από εστίες φωτιάς μένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

II. Ετικέτα:

α. Θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 22 , παρ.1 του Ν.721/77 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2004.

β. Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν την λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται αίτηση ανανέωσης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ