



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα 3-2 -2010
Αριθ. πρωτ.:180925

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87 161
e-mail: syg036@minagric.gr

Προς 1 Σπύρος Νικολίτσας ΑΕ
:
Ψυγεία Συσκευστήρια
2ο χλμ. Αγίας Αγιόκαμπου
Αγία Λάρισας Τ.Κ. 40003

2 Αγροτικός Συνεταιρισμός
Τυρνάβου
TIRNAVOS FRUIT
1^ο χλμ. Τυρνάβου –Λάρισα
Πάροδος Περαχώρας
Τ.Κ. 40100 ΤΥΡΝΑΒΟΣ
ΛΑΡΙΣΑ
(με απόδειξη)

ΘΕΜΑ: “ Χορήγηση κατ’ εξαίρεση έγκρισης
διάθεσης στην αγορά για
120 ημέρες στο φυτοπροστατευτικό
προϊόν (μυκητοκτόνο)
XEDAZOLE 30 CREAM ”

Κοιν. 1. Γραφείο Υπουργού
:
2. Γραφείο Υφυπουργού
κ. Μ. Καρχιμάκη
3. Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις
Δ/σεις Γεωργίας (με e-mail)
Έδρες τους
4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά
5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους
6. ΕΣΥΦ
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα
7. Εσωτερική διανομή:
-Τμήματα Β΄, Γ΄ & Ε΄ της
Δ/σής μας
-Γραμματεία της Δ/σής μας
8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων
Διδότου 26, Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 8 παρ. 4 αυτής.
2. Την αιτιολόγηση του γεγονότος που επιβάλλει την κατ' εξαίρεση έγκριση διάθεσης στην αγορά του σκευάσματος (**μυκητοκτόνο**) **XEDAZOLE 30 CREAM** για χρήση του μετασυλλεκτικά για την πρόληψη της σήψης των μηλοειδών
3. Τη γνωμοδότηση για το **εκτός ημερησίας διατάξεως θέμα** «Χορήγηση κατ' εξαίρεση έγκρισης διάθεσης στην αγορά 120 ημερών στο μυκητοκτόνο **XEDAZONE 30 creme** (με δ.ο. thiabendazole)» της...14^{ης}/4-12-2009 Συνεδρίασης του **Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ.**
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 187/7.10.2009 (ΦΕΚ 214/Α'/7-10-09) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τη με αριθμό 316049/24.11.2009 (ΦΕΚ 2401/Β'/1.12.2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μιχαήλ Καρχιμάκη»
6. Την από 21-7-2009 αίτηση της εταιρείας Σπύρος Νικολίτσας ΑΕ ψυγεία –συσκευαστήρια και του Α.Σ. Tirnavos Fruit.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Σε εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 4 του Π.Δ. 115/97 χορηγούμε στην εταιρεία **Σπύρος Νικολίτσας ΑΕ ψυγεία –συσκευαστήρια και στον Α.Σ. Tirnivos Fruit**, κατ' εξαίρεση έγκριση διάθεσης στην αγορά για 120 ημέρες του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **XEDAZOLE 30 CREAM** (με δ.ο.Thiabendazole), της εταιρείας XEDA INTERNATIONAL SA Γαλλίας με τα παρακάτω στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

60.263

3-2-2010

3-6-2010

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

1.2.β Μορφή¹:

XEDAZOLE 30 CREAM

Πυκνό εναιώρημα (SC)

1.3 Δραστική ουσία

α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

THIABENDAZOLE
(ομάδα βενζιμιδαζολικά)

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

98,5% β/β min

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

SYGENTA SA

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της
επιχείρησης SYGENTA SA
:

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 148-79-8 όπως προσδιορίζονται στο Τμήμα 1 & 2 της αίτησης με ημερομηνία **27/08/2009** (Αρ. Πρ. ΥΓ **131859**) ή όπως αυτές έχουν μεταγενέστερα τροποποιηθεί μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρμόδιας Αρχής και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

¹ Κατά GIFAP π.χ. υδατοδιαλυτή σκόνη, (SP), υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC) κ.λ.π.

α) Κάτοχος της έγκρισης²:

XEDA INTERNATIONAL SA
ZONE ARTISALANE
ST.ANDIOL - FRANCE
T.K.: 13670
Τηλ.:(33) 4 90 90 23 23
Fax: (33) 4 90 90 23 20

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης)

XEDA INTERNATIONAL SA
ZONE ARTISALANE
ST.ANDIOL - FRANCE
T.K.: 13670
Τηλ.:(33) 4 90 90 23 23
Fax: (33) 4 90 90 23 20
E-mail

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

XEDA INTERNATIONAL SA
ZONE ARTISALANE
ST.ANDIOL - FRANCE
T.K.: 13670
Τηλ.:(33) 4 90 90 23 23
Fax: (33) 4 90 90 23 20

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
XEDA INTERNATIONAL SA
ZONE ARTISALANE
ST.ANDIOL – FRANCE

Δ) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
XEDA INTERNATIONAL SA
ZONE ARTISALANE
ST.ANDIOL – FRANCE

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία Thiabendazole 30% /β/β
Βοηθητικές ουσίες 70% β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στο έγγραφο με ημερομηνία 4/11/2009 (Αρ. Πρ. ΥΑΑκΤ 133811) και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

2

Συσκευασία(ες)

² Είναι ο αιτών και έχει έδρα σε κάποιο ΚΜ της ΕΕ.

2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Δοχείο / Φιάλη	1 λίτρου	XEDAZOLE 30 CREAM
2	Δοχείο / Φιάλη	5 λίτρων	XEDAZOLE 30 CREAM

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Καταιονισμός των φρούτων με κατάλληλο διάλυμα εντός παλετοδρομίου που διαθέτει σύστημα συλλογής και ανακυκλοφορίας του διαλύματος Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας το εναπομείναν διάλυμα θα συσσωρευτεί στο δοχείο του παλετοδρομίου.

Τρόπος παρασκευής υγρού «καταιονισμού»:

Διαλύστε το XEDAZOLE 30 CREAM μέσα στο νερό καταιονισμού. Ανακατέψτε το προϊόν με το νερό στη δεξαμενή ή στον κάδο.

Για να διασφαλίσετε την ομοιογένεια του διαλύματος ενεργοποιήστε τις αντλίες ανάδευσης πριν από την έναρξη της εφαρμογής. Το φρούτο πρέπει να έρχεται σε επαφή με το διάλυμα για 30 sec έως 1 min

Η δοσολογία εφαρμογής είναι 200g/100L νερού

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του, μαζί με άλλα μυκητοκτόνα της XEDA ή σε συνδυασμό με άλλα σκευάσματα κατά του «καφεδιάσματος» που έχουν σαν βάση την αιθοξυκίνη και τη διφονυλαμίνη. Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να εφαρμόζεται το συντομότερο μετά τη συγκομιδή.

- Μαζί με Προϊόντα κατά του «καφεδιάσματος»:

Ακολουθήστε τις οδηγίες των προϊόντων για την καταπολέμηση του «καφεδιάσματος».

Συνδυαστικότητα : Το προϊόν XEDAZOLE 30 CREAM συνδυάζεται με το XEDAQUINE

Καθαρισμός δεξαμενής Καθαρίστε τον κάδο ή τη δεξαμενή μετά την εμβάπτιση, για την εξάλειψη όλων των ιζημάτων.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το XEDAZOLE 30 CREAM με δραστική ουσία thiabendazole είναι μυκητοκτόνο που εφαρμόζεται μετασυλλεκτικά για την πρόληψη της σήψης των μηλοειδών κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης – συντήρησης, στοχεύοντας ιδιαίτερα σε αυτή που προκαλείται από τους μύκητες *Gloeosporium* spp και *Penicillium* spp, σε μήλα και αχλάδια Δρα ως αναστολέας της μίτωσης

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ/στρέμμα (max)	γρ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού / λίτρα / στρέμμα		
Αχλάδια	<i>Gloeosporium</i> spp <i>Penicillium</i> spp,		200 γρ / 100 λίτρα διαλύματος		Καταιονισμός των φρούτων μετά τη συγκομιδή	Μία (1)
Μήλα	<i>Gloeosporium</i> spp <i>Penicillium</i> spp,		200 γρ / 100 λίτρα διαλύματος		Καταιονισμός των φρούτων μετά τη συγκομιδή	Μία (1)

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτούγειας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το

Σκεύασμα

8	Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.	
9	Σήμανση σκευάσματος:	N – Επικίνδυνο για το περιβάλλον.
10	Φράσεις R	R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροπρόθεσμα αρνητικές επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
11	Φράσεις S	S 1/2 - Φυλάξτε το κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. S 13 - Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. S 20/21 - Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. S37 Να φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια S 60 – Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά την διάθεση τους ως επικίνδυνα απόβλητα. S 61 – Αποφύγετε τη ελευθέρωση του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας. SP1 – Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.
12	Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο	Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης: Δώστε 1 ή 2 ποτήρια νερό, προσθέτοντας ενδεχομένως ενεργό άνθρακα. Ζητήσετε ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα του σκευάσματος

13**Προστασία των καταναλωτών****13.1** Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)

Thiabendazole

Φυτικά προϊόντα	Προσωρινά σε mg/kg
Έχουν οριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά MRLs με τον κανονισμό 396/2005	

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αχλάδια	90
Μήλα	90

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος³.

Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 1 και 40°C. Η διάρκεια αποθήκευσης του προϊόντος σε σφραγισμένο δοχείο και εφόσον τηρούνται τα συνιστώμενα για τη φύλαξή του, μπορεί να είναι έως 5 χρόνια.

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

³ Η ημερομηνία λήξης θα αναγράφεται στην ετικέτα εάν είναι μικρότερη των δύο (2) ετών

B**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. **Η παρούσα χορηγείται μετά από αίτηση της εταιρείας Σπύρος Νικολίτσας ΑΕ ψυγεία –συσκευαστήρια και του Α.Σ. Tirnavos Fruit . με την προϋπόθεση ότι θα διασφαλιστεί η διεργασία με την ανάθεση διαχείρισης των αποβλήτων σε φορέα που έχει την κατά νόμο άδεια. Η συμφωνία αυτή θα κατατεθεί στη Δ/ση Γεωργίας Λάρισας και στο τέλος της περιόδου θα υποβληθούν τα παραστατικά διαχείρισης στη Δ/ση Γεωργίας Λάρισας, κοινοποιώντας και στο Υπουργείο στην Υπηρεσία μας την ολοκλήρωση του έργου.**
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ

M. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ

Δ - 7 (GAP)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Κοινή ονομασία ή κατά EEC, CIPAC : Thiabendazole,
 Εμπορικό (ά) όνομα (τα) : **XEDAZOLE 30 CREAM**
 Κύρια χρήση π.χ. εντομοκτόνο, : ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ
 μυκητοκτόνο

Σελίδες : 1
 Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ

1	2	3	4	5	6		7				8			9	10
Καλλιέργεια Και/ή Συνθήκες χρήσης	Κράτος Μέλος ή χώρα	Εμπορικό όνομα του σκευάσματος	(Α) (Θ) ή (Κ)	Εχθρός, ομάδα εχθρών ή ασθενειών ή ζιζανίων που ελέγχονται	Σκεύασμα		Εφαρμογή				Δοσολογία ανά επέμβαση			Τελευταία Επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες)	Παρατηρήσεις
(α)			(β)	(γ)	Μορφή (δ-στ)	Περιεκ σε δ.ο. (θ)	Μέθοδος/ τρόπος (στ-η)	Στάδιο Ανάπτυξης και εποχή (ι)	Αριθμός Εφαρμογών Ελάχ. Μεγ. (κ)	Χρονικό μεσοδιάστη μα μεταξύ των εφαρμογών (ελάχ.)	γρ δ.ο. / εκατόλιτρο ελάχ. μεγ.	λίτρα ψεκαστ. υγρού / εκτάριο ελάχ. μεγ.	Γρ. δ.ο. /εκτάριο ελάχ. μεγ.	(λ)	(μ)
Αχλάδια	ΓΑΛΛΙΑ	XEDAZOLE 30 CREAM	K	<i>Gloeosporium</i> spp <i>Penicillium</i> spp,	SC	300 γρ / L	Καταιονισμ ός καρπών	Μετασυλλε κτικά, πριν την αποθήκευση	1	-	60 γρ. δ.ο / 100 λίτρα νερού				Διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τη κατανάλωση: 90 ημέρες
Μήλα	ΓΑΛΛΙΑ	XEDAZOLE 30 CREAM	K	<i>Gloeosporium</i> spp <i>Penicillium</i> spp,	SC	300 γρ δ.ο./ L	Καταιονισμ ός καρπών	Μετασυλλε κτικά, πριν την αποθήκευση	1	-	60 γρ. δ.ο / 100 λίτρα νερού				Διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τη κατανάλωση: 90 ημέρες

Παρατηρήσεις: (α) Για τις καλλιέργειες, η ταξινόμηση της ΕΕ και του Codex (και τα δύο) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Οπου βρίσκεται εφαρμογή, οι συνθήκες χρήσης θα πρέπει να περιγράφονται (π.χ. καπνισμός των κατασκευών).
 (β) Ανοιχτού αγρού (Α), εφαρμογές σε θερμοκήπια (Θ), ή σε κλειστούς χώρους (Κ).
 (γ) π.χ. Μασητικά και μυζητικά έντομα, έντομα εδάφους, έντομα φυλλώματος, ζιζάνια

(η) Τρόπος. Πχ σ' όλη την επιφάνεια, από αέρος, στις γραμμές, ατομικά φυτά – ο τύπος του ψεκαστικού μηχανήματος θα πρέπει να προσδιορίζεται
 (θ) g/kg ή g/l
 (ι) Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία εφαρμογή (BBCH Monograph, Growth Stages of Plants, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), περιλαμβάνοντας όπου

- (δ) πχ. Βρέξιμη σκόνη (WP), γαλακτοποιήσιμο συμπύκνωμα (EC)
- (ε) GCPF Κώδικες – GIFAP Technical Monograph No 2, 1989.
- (στ) όλες οι χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες θα πρέπει να εξηγούνται
- (ζ) Μέθοδος πχ. Ψεκάσμος υψηλού όγκου, σκονισμός.

- βρίσκει εφαρμογή, πληροφορίες σχετικά με την εποχή κατά τον χρόνο εφαρμογής
- (κ) Ο ελάχιστος και ο μέγιστος δυνατός αριθμός εφαρμογών υπό πρακτικές συνθήκες
- (λ) Ελάχιστο χρονικό μεσοδιάστημα πριν τη συγκομιδή
- (μ) Οι παρατηρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: οικονομική σημασία / περιορισμούς στη χρήση