



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 4 - 1 - 2010  
Αριθ. πρωτ: 180257

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Γ. Τσιάμπα  
Τηλέφωνο: 210 928 7228  
e-mail: [svg064@minagric.gr](mailto:svg064@minagric.gr)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ.  
7795/18-10-2006 προσωρινής  
έγκρισης στο φυτοπροστατευτικό  
προϊόν BUTISAN 40/10 SC  
(ζιζανιοκτόνο) ως προς το φάσμα  
δράσης και την ημερομηνία λήξης  
της έγκρισης».

Προς: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.  
Λ. Μεσογείων 449  
153 43 Αγία Παρασκευή  
  
(με απόδειξη)  
Κοιν.: 1. Γραφείο Υπουργού κ. Αικ.  
Μπατζελή  
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Μ.  
Καρχιμάκη  
3. Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις  
Δ/νσεις Γεωργίας - Έδρες τους  
4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό  
Ινστιτούτο  
Τμήμα Ελέγχου Γ. Φαρμάκων  
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά  
5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. - Έδρες τους  
6. ΕΣΥΦ  
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα  
7. Εσωτερική διανομή:  
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της  
Δ/νσής μας  
-Γραμματεία της Δ/νσής μας  
8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων  
Λιδότου 26, Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/97 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) με τίτλο «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτής.
2. Τη με αριθ. 132427/16-9-2009 (ΦΕΚ2094/Β/29-9-2009) Κοινή Υπουργική Απόφαση για την «καταχώριση των δραστικών ουσιών acclonifen, imidacloprid και metazachlorστο παράρτημα Ι του Προεδρικού διατάγματος υπ' αριθ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α' 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2008/116/ΕΚ της Επιτροπής της 15<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2008».

3. Την Απόφαση της Επιτροπής της 5<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τη μη καταχώριση ορισμένων δραστικών ουσιών στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν αυτές τις ουσίες (οδηγία 2008/934/ΕΚ).
4. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2008.
5. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 214 Α’).
6. Τη με αριθ. 316049/24-11-2009 (ΦΕΚ 2401/Β’/1-12-2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μιχαήλ Καρχιμάκη».
7. Τη με αριθ. πρωτ. 131268/29-7-2009 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας **BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.**

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. **7795** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **BUTISAN 40/10 SC** που χορηγήθηκε με την αριθ. 122166/18-10-2006 και τροποποιήθηκε με την αριθ. 127353/24-3-2009 Απόφασή μας, ως προς το **φάσμα δράσης και την ημερομηνία λήξης της έγκρισης** και η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### **1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

<b>7795</b>
<b>18-10-2006</b>
<b>31-12-2010</b>

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα **BUTISAN 40/10 SC**
- 1.2.β Μορφή: Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

##### **1.3 Δραστική ουσία (ες)**

- α) Κοινή ονομασία της/των δραστική/ζών ουσία/ζών κατά ISO

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. metazachlor</li> <li>2. quinmerac</li> </ol> (Χημική ομάδα του metazachlor: χλωροακεταμίδιο quinmerac: κινολινικο-καρβοξυλικό οξύ)
--

- β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

<ol style="list-style-type: none"> <li>1.metazachlor: 94% β/β min</li> <li>2.quinmerac: 98% β/β min</li> </ol>
--

- γ) Παρασκευαστής της δ.ο.

Metazachlor: BASF SE, Γερμανία. Quinmerac: BASF SE, Γερμανία.
--

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Metazachlor: BASF SE, Γερμανία.  
Quinmerac: Ruetgers-Nease, Η.Π.Α

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως προσδιορίζονται στο Τμήμα J της αίτησης με ημερομηνία 29-7-2009 (Αρ. Πρ. Υ.Α.Α.Τ. 131268) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

**BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.**  
Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή  
Τηλ.: 210-6860100  
Fax: 210-6860200  
E-mail: maria.tsinou@basf.com

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης)

**BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.**  
Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή  
Τηλ.: 210-6860100  
Fax: 210-6860200  
E-mail: maria.tsinou@basf.com

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

BASF SE - Γερμανία

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

BASF Agri-Production S.A.S., - Γαλλία

Δ) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

BASF Agri-Production S.A.S., - Γαλλία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: matazachlor 40% % β/ο,  
quinmerac 10% β/ο  
Βοηθητικές ουσίες 54,3% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στην αίτηση με ημερομηνία 23-6-2006 (Αρ. Πρ. Υ.Α.Α.Τ. 119733) και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

## 2 Συσκευασία(ες)

### 2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
	φιάλες	500κ.εκ, 1, 5, 10 λίτρα	HDPE

### 3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

**Τρόπος εφαρμογής:** Το BUTISAN 40/10 SC είναι ζιζανιοκτόνο για χρήση μετασπαρτικά, προφυτρωτικά ή μεταφυτρωτικά της ελαιοκράμβης.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Ανακινείστε καλά το BUTISAN 40/10 SC πριν από την εφαρμογή. Προτού το χρησιμοποιήσετε, ρυθμίστε το ψεκαστικό ώστε να εφαρμόζει την απαιτούμενη ποσότητα ψεκαστικού υγρού και ενεργοποιήστε το σύστημα ανάδευσης. Γεμίστε τα  $\frac{3}{4}$  του δοχείου με νερό και αναδεύοντας διαρκώς προσθέστε τις αναγκαίες ποσότητες BUTISAN 40/10 SC. Αφήστε τον αναδευτήρα σε λειτουργία καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και ως το τέλος του ψεκασμού. Αποφύγετε τις διακοπές κατά τον ψεκασμό.

Στα πλαίσια της ορθής γεωργικής πρακτικής, ξεπλύνετε 3 φορές τις συσκευασίες και αδειάστε το νερό της απόπλυσης στο δοχείο.

#### **Συνδυαστικότητα:**

Στην προφυτρωτική εφαρμογή, μπορείτε να συνδυάσετε το BUTISAN<sup>®</sup> 40/10 SC ακριβώς πριν την εφαρμογή μαζί με υγρό λίπασμα. Σε περίπτωση όπου υπάρχει φόβος τροφопενίας βορίου, μπορείτε να προσθέσετε στο μίγμα ψεκασμού λίπασμα βορίου.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

### 4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο κατά των ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στην χειμερινή ελαιοκράμβη..

### 5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		Κ.εκ/ στρέμμα (max)	κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		

Ελαιοκράμβη	Πλατύφυλλα και Αγρωστώδη ζιζάνια	1) 200-250 (1)  2) 200-250  3) α)150 β) 100	1) 500-1250  2) 500 - 1250  3) α)375-750 β) 250-500	20-40 (2)	<p>Ανάλογα με τις κλιματικές και καλλιεργητικές συνθήκες που επικρατούν συνιστάται εφαρμογή:</p> <p>1) <b>Προφυτρωτικά</b> της Ελαιοκράμβης και εντός 3 ημερών από τη σπορά</p> <p>ή</p> <p>2) <b>Μεταφυτρωτικά</b> της Ελαιοκράμβης, και πριν από τη βλάστηση των ζιζανίων έως το στάδιο των 2 πραγματικών φύλλων των ζιζανίων</p> <p>ή</p> <p>3) Τμηματική εφαρμογή, <b>προφυτρωτικά και μεταφυτρωτικά</b> της καλλιέργειας.</p>	1-2 ανά τρία χρόνια στον ίδιο αγρό
-------------	----------------------------------	---	---	-----------	--	------------------------------------

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Οι δόσεις εφαρμογής καθορίζονται από τον πληθυσμό των ζιζανίων. Σε μεγάλο πληθυσμό ζιζανίων εφαρμόζεται η μεγάλη δόση.
2. Το εύρος αυτό συνιστάται στις περιπτώσεις ζιζανιοκτόνων με εφαρμογές εδάφους, προφυτρωτικές ή νωρίς μεταφυτρωτικές, για να καλύψει όλα τα είδη ψεκαστικών μηχανημάτων του παραγωγού και τα διάφορα ανάγλυφα του εδάφους.
3. Μην αρδεύετε τις επόμενες 3 εβδομάδες μετά την εφαρμογή.
4. Μην εφαρμόζετε το προϊόν όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές: άνεμος, βροχή, έντονη ζέστη άνω των 25°C υπό σκιά.
5. Εφαρμόστε το προϊόν όταν ο καιρός είναι ήπιος για να προστατέψετε τις γειτονικές καλλιέργειες.

## ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ

1) Πλατύφυλλα ζιζάνια: Ανθεμίδα (*Anthemis arvensis*), Καψέλλα (*Capsella bursa-pastoris*), Κολλητσίδα (*Galium aparine*), Ζωχός πολυετής (*Sonchus arvensis*), Ζωχός τραχύς (*sonchus asper*), Πορφυρό λάμιο (*Lamium purpureum*), Χαμομήλι (*Matricaria chamomilla*), Μυρώνι (*Scandix pecten-veneris*), Αγριοντοματιά (*Solanum nigrum*), Αναγαλίδα (*Anagalis arvensis*), Στελλάρια (*Stellaria media*), Βατράχιο (*Ranunculus arvensis*), Αγριοπιπεριά (*Polygonum aviculare*), Λάπαθο (*Rumex spp.*), Μαρτιάκος (*Senecio vulgaris*), Σπέργουλα (*Spergula arvensis*), Θλάσπι (*Thlaspi arvensis*), Βερόνικα (*Veronica spp.*).

Η αποτελεσματικότητα του BUTISAN 40/10 SC είναι ικανοποιητική στην Παπαρούνα (*Papaver rhoeas*), στο Καπνόχορτο (*Fumaria officinalis*), στη Λουβουδιά (*Chenopodium spp.*). Η δράση του στο *Geranium spp.*, στη *Viola spp.* και στο Άγριο σινάπι (*Sinapis arvensis*) μπορεί να είναι ακανόνιστη.

### 2) Αγρωστώδη ζιζάνια:

Άγρωστη (*Agrostis spica-venti*), Αιματόχορτο (*Digitaria spp.*), Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*), Πόα κοινή (*Poa annua*), Αλεπονουρά (*Alopecurus myosuroides*), Τραχεία λειβαδοπόα (*Poa trivialis*), Μικρή φάλαρη (*Phalaris minor*), Ήρα (*Lolium multiflorum*), Σετάρια (*Setaria spp.*).

Το BUTISAN 40/10 SC εφαρμοζόμενο προφυτρωτικά της ελαιοκράμβης είναι αποτελεσματικό κατά της Αγριοβρώμης, (*Avena fatua*) εκτός των περιπτώσεων πολύ υψηλών πληθυσμών του ζιζανίου που απαιτούν την εφαρμογή ειδικού αγρωστωδοκτόνου.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

### 1) Προφυτρωτική

Σε περιπτώσεις όπως:

- Σπορά που πραγματοποιήθηκε σε φυσιολογική εποχή για την περιοχή, σε κλιματικές συνθήκες που ευνοούν τη βλάστηση, την ανάπτυξη και το ριζικό σύστημα.
- Καλά προετοιμασμένο έδαφος, λεπτόκοκκο χωρίς σβόλους.
- Καλυμμένοι σπόροι σε βάθος 2-3 εκ.

Το BUTISAN 40/10 SC να χρησιμοποιείται με μια εφαρμογή, κατά προτίμηση ακριβώς μετά τη σπορά ή μέσα στις 3 επόμενες ημέρες. Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος εάν προβλέπονται έντονες βροχοπτώσεις αμέσως μετά τον ψεκάσμο.

### 2) Μεταφυτρωτική

Σε περιπτώσεις όπως:

- Πετρώδες ή πολύ σβολιασμένο έδαφος που δεν επιτρέπει την κατάλληλη κάλυψη των σπόρων.
- Υπερβολικά συμπαγές ή διηθημένο έδαφος.
- Υπερβολικά ξηρό έδαφος που προκαλεί προβλήματα στη βλάστηση.
- Καθυστερημένη σπορά της ελαιοκράμβης.

Το BUTISAN 40/10 SC πρέπει να χρησιμοποιηθεί το συντομότερο δυνατό μετά τη βλάστηση της ελαιοκράμβης, δηλαδή με το άνοιγμα των κοτυληδόνων έως το 1<sup>ο</sup> μυτερό φύλλο της ελαιοκράμβης, στην πρώιμη βλάστηση. Προσοχή: Το οριακό διάστημα εφαρμογής εξαρτάται μόνο από το στάδιο των ζιζανίων. Το BUTISAN 40/10 SC είναι αποτελεσματικό πριν από τη βλάστησή τους ή όταν αυτά είναι όσο το δυνατόν πιο νεαρά. Σε κάθε περίπτωση, μην εφαρμόζετε το προϊόν μετά το στάδιο των 2 πραγματικών φύλλων των ζιζανίων. Στην πρώιμη αυτή εφαρμογή τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα, διότι το έδαφος θα είναι αρκετά υγρό για να ευνοήσει την κατανομή των δραστικών ουσιών στην επιφανειακή στρώση του εδάφους, επιτρέποντας μεγαλύτερη ικανότητα απορρόφησης από τις ρίζες των ζιζανίων.

### 3) Τμηματική Εφαρμογή, συνδυασμός προφυτρωτικής +μεταφυτρωτικής

Σε δύσκολες συνθήκες σποράς, συνιστάται επίσης η τμηματική εφαρμογή σε δύο δόσεις. Η πρώτη εφαρμογή στο προφυτρωτικό στάδιο εξασφαλίζει από νωρίς την απαλλαγή του εδάφους από τα ζιζάνια, ενώ η δεύτερη εφαρμογή στο μεταφυτρωτικό στάδιο εξασφαλίζει καλύτερα αποτελέσματα και εμποδίζει την επανεμφάνιση των ζιζανίων την άνοιξη.

Συνιστάται λοιπόν η 1<sup>η</sup> εφαρμογή αμέσως μετά τη σπορά και προφυτρωτικά με δόσεις 150 κ.εκ. ανά στρέμμα και, στη συνέχεια, μια 2<sup>η</sup> εφαρμογή μεταφυτρωτικά, ανάλογα με τον πληθυσμό των ζιζανίων, από το στάδιο των 2 πραγματικών φύλλων της ελαιοκράμβης με δόση 100 κ.εκ BUTISAN 40/10 SC. ανά στρέμμα.

**6**

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

### **ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ**

**SZ1** Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.

**SZ2** Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.

**SZ3** Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα μπορεί να επανασπαρεί ελαιοκράμβη, εάν η προετοιμασία έχει ήδη γίνει το φθινόπωρο, μετά από επιφανειακό σκάλισμα του εδάφους.

	<p>Σε περίπτωση παρατεταμένης ξηρασίας το φθινόπωρο και το χειμώνα συνιστάται η επανασπορά:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Το χειμώνα με μαλακό σίτο, σκληρό σίτο και κριθάρι, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει γίνει καλή προετοιμασία του εδάφους και ότι η σπορά θα είναι πυκνότερη από ότι συνήθως.</li> <li>2. Την άνοιξη με α) μαλακό σίτο, κριθάρι και τριφύλλι, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει γίνει καλή προετοιμασία του εδάφους και ότι η σπορά θα είναι πυκνότερη από ότι συνήθως, β) τεύτλα, αραβόσιτο, πατάτα, μπιζέλι, σόργο, εαρινή ελαιοκράμβη, λινάρι, ηλιάνθο και σόγια, χωρίς περιορισμούς (ανεξάρτητα από την εργασία που έχει προηγηθεί στο έδαφος), γ) φασόλι, λάχανο, βίκο, μηδική, υπό την προϋπόθεση ότι θα προηγηθεί άρωση βάθους 15 εκ.</li> <li>3. Το επόμενο φθινόπωρο: όλες οι καλλιέργειες.</li> </ol> <p><b>SZ7</b> Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.  <b>SZ8</b> Μην διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις.  <b>SZ11</b> Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται.  <b>SZ12</b> Μετά τον ψεκασμό ξεπλύντε καλά τα ψεκαστικά μηχανήματα με νερό και απορρυπαντικό.</p>
--	---

<p><b>7.</b> Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας</li> <li>- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν</li> <li>- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα</li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 10px;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 10px;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>
--	--

<p><b>8</b> Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.</p>	<p>Δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον τηρούνται οι συνιστώμενες οδηγίες της ετικέτας.</p>
--	--

<p><b>9</b> Σήμανση σκευάσματος:</p>	<p><b>Xi</b> – Ερεθιστικό  <b>N</b> – Επικίνδυνο για το περιβάλλον.</p>
--------------------------------------	---

<p><b>10</b> Φράσεις R</p>	<p><b>R43</b> – Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.  <b>R50/53</b> – Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.          Ζώνη στην οποία το προϊόν δεν πρέπει να εφαρμόζεται όσον αφορά την απόσταση από προσωρινούς ή μόνιμους όγκους νερού: 20 μέτρα.</p>
----------------------------	--



**11** Φράσεις S

- S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  
**S13** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.  
**S20/21** Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.  
**S24** Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα.  
**S35** Το προϊόν και ο περιέκτης του πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.  
**S37** Φοράτε κατάλληλα γάντια.  
**S46** Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.  
**S57** Να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο περίβλημα για να αποφευχθεί ρύπανση του περιβάλλοντος.

*«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης»*

**12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ**

**Γενικές οδηγίες:** Αποφύγετε επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα. Απομακρύνετε τα μολυσμένα ρούχα. Εάν προκληθούν προβλήματα, ζητείστε ιατρική συμβουλή και δείξτε την συσκευασία, την ετικέτα και/ή το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στον γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε επιμελώς με νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση εισπνοής: Διατηρήστε τον πάσχοντα ήρεμο, μεταφέρατέ τον στον καθαρό αέρα, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύντε τα αμέσως με τρεχούμενο νερό, κρατώντας ανοιχτά τα βλέφαρα. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύντε αμέσως το στόμα και πιείτε αρκετό νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο, συστήνεται συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777

**13 Προστασία των καταναλωτών****13.1** Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)<sup>1</sup>

metazachlor

quinmerac

Φυτικά προϊόντα	Προσωρινά σε mg/kg
<b>Σπόρος ελαιοκράμβης, metazachlor</b>	<b>0.05 ppm</b>
<b>Σπόρος ελαιοκράμβης, quinmerac</b>	<b>0.05 ppm</b>

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	PHI (ημέρες)

<sup>1</sup> Ορίζονται μόνο στις περιπτώσεις που δεν υφίστανται εθνικά ή κοινοτικά MRLs ή τα υφιστάμενα δεν ικανοποιούν την εγκρινόμενη Ορθή Γεωργική Πρακτική. Στις περιπτώσεις που έχουν οριστεί κοινοτικά MRLs αναγράφεται η φράση: «Έχουν οριστεί κοινοτικά MRLs».

	--
--	----

<b>14</b> Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.	Παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, αποθηκευόμενο στην αρχική του κλειστή συσκευασία, μακριά από το ηλιακό φως και την υγρασία και σε θερμοκρασία από $-5^{\circ}\text{C}$ έως $40^{\circ}\text{C}$ .
--	---

**15** Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων αυτή χορηγήθηκε.

**B** Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση του από τη χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί παράπτωμα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ**

**M. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ