



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 4 – 8 - 2004

Αριθ. Πρωτ.: 119527

Ταχ. Δ/ση : Ιπποκράτους 3-5
Ταχ. Κώδ. : 101 64
FAX : 36 17 103
Πληροφορίες : Γ. Τσιάμπα
Τηλέφωνο : 212 44 94

ΠΡΟΣ: 1) ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε.
28^ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας
190 014 - ΑΦΙΔΝΑΙ
(Με απόδειξη)
2) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
α) Δ/νσεις Γεωργίας
Έδρες τους
β) Δ/ νσεις Εμπορίου
Έδρες τους
3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά
4) Τμήματα Β', Γ', και Ε'.
ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.

ΘΕΜΑ : Χορήγηση οριστικής έγκρισης
κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό
προϊόν (φυτορρυθμιστική ουσία)
VIO-GIBB 10 SP.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 721 /1977 “Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων “ και ειδικότερα το άρθρο 2, παρ. 2 και το άρθρο 5, παρ. 2 και 8”.
2. Τη με αριθμ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ 674 / Β/ 13-9-88) απόφασή μας “για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων“, Κεφ. Β, παρ. 1.
3. Τη με αριθμ. 83345/28-7-1988 (ΦΕΚ. 599 /24-8-88) απόφαση μας όσον αφορά “ τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων “ καθώς και το Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ. 104/Α/30-5-97).
4. Τη με αριθ. 265/2002/3.9.2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19.9.2002) ΚΥΑ με θέμα την “ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων”, καθώς και τη με αριθ. 108114/30.7.2003 (ΦΕΚ 1121/Β'/8.8.2003) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα»
5. Τη με αριθμό 70526/30-3-1995 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 8098 έγκριση κυκλοφορίας στο όμοιας μορφής και περιεκτικότητας φυτοπροστατευτικό προϊόν FALGRO 10 SP.
6. Τη με αριθμ. 230642/15-3-2004 (ΦΕΚ 525/Β/23-3-2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για “ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελο Μπασιάκο και Αλέξανδρο Κοντό”, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε”.

7. Τις από 26-7-2001 και 28-6-2004 αιτήσεις με το πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου της ενδιαφερόμενης εταιρείας ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **8145** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορρυθμιστική ουσία) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** VIO-GIBB 10 SP.

2. **Μορφή:** Υδατοδιαλυτή σκόνη (SP).

3. **Εγγυημένη σύνθεση:** gibberrellic acid 10 % β/β
βοηθητικές ουσίες: 88,9 % β/β

4. **Καθαρότητα technical**, από το οποίο παρασκευάζεται, του Οίκου JIANGSU SHEYANG GENERAL CHEMICAL - Κίνας: 90 % min.

5. **Παρασκευαστής** : ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε. 28^ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, ΑΦΙΔΝΑΙ.

6. **Αντιπρόσωπος** : -

7. **Τυποποιητής** : Ο Παρασκευαστής.

8. **Συσκευαστής** : Ο Παρασκευαστής.

9. **Συσκευασία** : 9α. Είδος- Μέγεθος: Δοχεία των πενήντα (50), εκατό (100), διακοσίων (200) και πεντακοσίων (500) γραμμαρίων.

9β. Υλικό: Πλαστικό ΡΕ.

10. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης:**

Αύξηση της καρπόδεσης, βελτίωσης της ποιότητας, πρωιμότητα της παραγωγής στις καλλιέργειες: Αμπέλι (Σουλτανίνα και Μαύρη Κορινθιακή Σταφίδα), Αγκινάρα και Σέλινο. Διεγείρει τη διαίρεση και την επιμήκυνση των κυττάρων. Δεν επιδρά στις ρίζες.

11. **Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμός καλύψεως.

12. **Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:**

Βάζουμε στο ψεκαστικό τη μισή ποσότητα νερού. Την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος. Τη διαλύουμε σε μικρή ποσότητα νερού, σε χωριστό δοχείο και το διάλυμα το ρίχνουμε στο ψεκαστικό. Ξεπλένουμε το δοχείο και ρίχνουμε τα νερά στο ψεκαστικό. Συμπληρώνουμε στο ψεκαστικό το υπόλοιπο νερό.

Για να αποφεύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ γραμμ./100λ νερό	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΜΠΕΛΙ:			
Σουλτανίνα για επιτραπέζια	Αύξηση καρπόδεσης , πρωίμιση παραγωγής	20 - 40	α. Στην πλήρη άνθηση (1) β. Μετά 5 - 12 ημέρες
Σουλτανίνα για σταφίδα	Αύξηση του μεγέθους των ραγών	2 - 6	Όταν οι ράγες γίνουν 3 mm.
Κορινθιακή σταφίδα .	Μείωση ανθόρροιας & καρπόπτωση (υποκα- τάσταση χαρακώματος)	1 - 5 (2)	Στην πλήρη άνθηση

ΑΓΚΙΝΑΡΑ	Πρωίμιση & αύξηση παραγωγής	16 - 35	Όταν τα φυτά έχουν 6 - 8 φύλλα ή 10 - 12 στα φυτά ηλικίας 1 έτους . (3)
ΣΕΛΙΝΟ	Πρωίμιση & αύξηση παραγωγής & μήκους στελέχους	50 - 70	4 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή (4)

Παρατηρήσεις:

1. Ο πρώτος ψεκασμός να γίνεται όταν έχει πέσει το 70 % των πηλιδίων. Να γίνεται καλή διαβροχή των τσαμπιών.
2. Προσθήκη 1,5 - 2 g/100 λίτρα νερού PCPA (Δ.Σ) βελτιώνει το αποτέλεσμα. PCPA να μην εφαρμόζεται σε πρέμνα ηλικίας κάτω των τριών ετών.
Όταν χρησιμοποιείται PCPA να μην γίνονται θειαφίσματα 7 ημέρες πριν και 4 μετά τον ψεκασμό.
3. Γίνονται 3 ψεκασμοί, με διάστημα 15 - 20 ημέρες μεταξύ τους. Να αυξάνεται η αζωτούχος λίπανση και το πότισμα
4. Ο ψεκασμός να προγραμματίζεται στον αγρό κατά τμήματα ανάλογα με το χρόνο συγκομιδής.
5. Οι ψεκασμοί να γίνονται τις ψυχρές ώρες της ημέρας.
6. Στο ψεκαστικό να προστίθεται προσκολλητικό.

14 .Φυτοτοξικότητα:

Όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του, δεν παρουσιάζει κίνδυνο για τα φυτά.

15. Συνδυαστικότητα:

Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά διαλύματα. Όταν χρησιμοποιείται σαν υποκατάστατο της χαραγής στη Σουλτανίνα και την Κορινθιακή σταφίδα μπορεί να συνδυαστεί με σκευάσματα του PCPA για βελτίωση της αποτελεσματικότητας.

16. Σημάνσεις: Xi – Ερεθιστικό.

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

R36 Ερεθίζει τα μάτια.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):

RO3 Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες.

19. Προφυλάξεις για τον χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

- S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
- S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- S15 Φυλάξτε το μακριά από θερμότητα.
- S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.
- S22 Μην αναπνέετε τη σκόνη.
- S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- SY8 Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε , πείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.
- SY11 Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το φάρμακο ή με τα κενά συσκευασίας του.

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση ατυχήματος ακολουθείται συμπληρωματική θεραπεία .

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων : (210) 77 93 777 .

21. **Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (S0 φράσεις):** -
22. **Απαγορεύσεις (A φράσεις):** -
23. **Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):**
Π1: Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Σέλινο: 7 ημέρες
24. **Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:**
Στην αρχική και κλειστή συσκευασία του σε ξηρό μέρος και σε θερμοκρασία πάνω από 0⁰C και κάτω από 32⁰C παραμένει σταθερό μέχρι και 2 χρόνια.

II. Κείμενο ετικέτας:

- α .Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 721 /77 και με την παρούσα απόφαση.
- β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2008.

- β. Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, να υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ