



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Αθήνα, 7/4/2000

Αριθ. Πρωτ.: 92296

**Ταχ. Δ/ση : Ιπποκράτους 3-5
Ταχ. Κώδικας : 101 64 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α. Φονταρά
Τηλέφωνο: 52 91 411
TELEFAX: 3617103**

Domark10

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης
κυκλοφορίας στο φυτοπροστα-
τευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο)
DOMARK 10 EC**

**ΠΡΟΣ: 1. ISAGRO HELLAS ΕΠΕ
Πίνδου 51
18344 Μοσχάτο
(Με απόδειξη)
2 Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
α) Δ/νσεις Γεωργίας
Έδρες τους
β Δ/νσεις Εμπορίου
Έδρες τους
3 Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου
Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά
4. Περιφερειακά Κέντρα
Προστασίας Φυτών και
Ποιοτικού Ελέγχου
Έδρες τους
ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 για «την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το άρθρο 2, παρ. 2 και το άρθρο 5, παρ.8.
2. Τη με αριθ.85418/24-8-88(ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας,«για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το Κεφ. Β, παρ. 6.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-1988 (ΦΕΚ 599/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων» καθώς και το με αριθ.115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) ΠΔ.
4. Τη γνωμοδότηση για το 5^ο θέμα της 1^{ης}/18-1-2000 Συνεδρίασης του ΑΣΥΓΕΦ.
5. Τη με αριθ. 3396/3-11-98 (Β'1165/9-11-98) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Κων/νο Βρεττό και Παρασκευά Φουντά».
6. Τις από 2-8-94 και 16-7-96 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

Αποφασίζουμε

- I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό 6804 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:
1. **Εμπορικό όνομα:** DOMARK 10 EC
 2. **Μορφή:** Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)
 3. **Εγγυημένη σύνθεση:** tetraconazole 10 % β/ο
βοηθητικές ουσίες: 88,68 % β/β
 4. **Καθαρότητα TECHNICAL** από το οποίο παρασκευάζεται: 94 % min.
 5. **Παρασκευαστής:** ISAGRO SPA Ιταλίας
 6. **Αντιπρόσωπος:** ISAGRO HELLAS ΕΠΕ
 7. **Τυποποιητής :** SIPCAM SpA, Μιλάνο Ιταλία
 8. **Συσκευαστής:** ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος
 9. **Συσκευασία :** 9α. **Είδος - Μέγεθος:** Φιάλες 50, 100, 250 και 500 κ. εκ., 1 και 5 λίτρων.
9β. **Υλικό:** -Αλουμίνιο
-Σίδηρος με εποχφαινολική ρητίνη εσωτερικά.
-Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), επιφανειακά επεξεργασμένο με φθόριο.
10. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης:**
Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs (υποομάδα τριαζολών), με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων (Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες, Δευτερομύκητες). Σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση της εργοστερόλης.
11. **Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί καλύψεως μέχρις απορροής.
Να μην εφαρμόζεται με επινώτιο ψεκαστήρα.
12. **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας καλά και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
13. **Φάσμα δράσης:**

Καλλιέργεια	Ασθένεια (Παθογόνο)	Δόση κ.εκ./100 λίτρα νερό	Όγκος ψεκαστικού Υγρού λίτρα/στρ.	Μεσο-διάστημα επεμβάσεων (ημέρες)	Χρόνος Εφαρμογής
Αμπέλι	Ωίδιο (Uncinula necator)	25	80-100	12-14	Δύο (2) προληπτικές εφαρμογές πριν την άνθηση (όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 5-10 εκ.) και μέχρι της αλλαγής του χρώματος των ραγών.

Νεκταρινιά	Ωίδιο (Sphaerotheca pannosa)	40	100-150	10-14	Μέχρι τρεις (3) προληπτικές επεμβάσεις από το στάδιο της πτώσης των πετάλων μέχρι τη σκλήρυνση του πυρήνα του καρπού.
Αγγούρι	Ωίδιο (Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum)	50	80-100	10-14	Δύο έως τρεις (2-3) προληπτικές μη διαδοχικές επεμβάσεις ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Παρατηρήσεις:

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

-Χρήση του DOMARK 10 EC μόνο προληπτικά και σε συνδυασμό ή εναλλαγή με μυκητοκτόνα κατά προτίμηση επαφής ή μυκητοκτόνα που δεν εμφανίζουν διασταρωτή ανθεκτικότητα με εκείνα της ομάδας των DMIs, στην οποία ανήκει και το tetraconazole.

-Χρήση μόνο της εγκεκριμένης δοσολογίας.

14. Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις για τις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

15. Συνδυαστικότητα:--

16. **Σημάνσεις Τοξικότητας:** Xn-Επιβλαβές, Xi-Ερεθιστικό

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

R22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

R36/38 Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.

R62 Πιθανός κίνδυνος για εξασθένηση γονιμότητας.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R φράσεις):

R51 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

R53 Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες επιδράσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε.

S24/25 Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια.

S36/37 Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και τον ψεκασμό και ολόσωμη φόρμα κατά τον ψεκασμό.

S39 Φοράτε συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

Να μην εφαρμόζεται με επινώτιο ψεκαστήρα.

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο :

Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Κάντε τεχνητή αναπνοή αν είναι απαραίτητο.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα απομακρύνετε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε την περιοχή του δέρματος με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύντε τα με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης ξεπλύντε το στόμα. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Ποτέ μη δίνετε οτιδήποτε από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.

Αντίδοτο: Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 77 93 777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

SO3 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Αποφεύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

(Π1) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Αμπέλι: 14 ημέρες

Νεκταρινιά: 14 ημέρες

Αγγουριά: 7 ημέρες

Προσοχή: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε καλά αεριζόμενο, δροσερό και χωρίς υγρασία χώρο, μακριά από πηγή θερμότητας, σπίθα ή φλόγα.

Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα μένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 22, παρ. 1, του Ν.721/77 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31.12. 2004.

β. Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται αίτηση ανανέωσης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ