



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 8 - 4 - 2013
Αριθ. πρωτ: 3928/43278

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε. Ανδρέου
Τηλέφωνο: 210 928 7237
e-mail: sygu034@minagric.gr

Προς: Syngenta Hellas ΑΕΒΕ
Λ. Ανθούσας
15 349 Ανθούσα
voula.kalliakaki@syngenta.com

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο
φυτοπροστατευτικό προϊόν AMISTAR
25SC (μυκητοκτόνο, δ.ο. azoxystrobin)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (τ. Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τη με αριθ. 93583/10-4-2002 Απόφαση του Υπ. Γεωργίας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό **6857** έγκριση στο πανομοιότυπο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) **ORTIVA 25 SC**, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
4. Τη με αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/Β/22.05.2009) Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για "Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με «Εντολή Υφυπουργού»».
5. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 703/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ης Ιουλίου 2011 για την έγκριση της δραστικής ουσίας azoxystrobin, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής
6. Την από 16.03.2012, αίτηση της εταιρείας **Syngenta Hellas ΑΕΒΕ**.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **AMISTAR 25 SC** της εταιρείας Syngenta Hellas AEBE, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

60.359

08-04-13

31-12-15

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν1.2.α Εμπορικό
όνομα

Amistar 25 SC

1.2.β Μορφή:

(SC) Πυκνό εναιώρημα

1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες)

Δραστική ουσία 1	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO	Azoxystrobin
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	96.5% min
Χημική ομάδα	
Παρασκευαστής	Syngenta Supply AG Switzerland
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): -Syngenta Grangemouth Works Earls Road Grangemouth Stirlingshire FK3 8XG Scotland & -Saltigo GmbH, Leverkusen, 51369 Germany
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας azoxystrobin όπως προσδιορίζονται στον συνημμένο Document J

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:	Syngenta Hellas AEBE Λ. Ανθούσης-Ανθούσα Αττικής ΑΜΕ : Τ.Κ.15349 Τηλ.:210-6666612-13 Fax:210 6665777 E-mail: youla.kalliakaki@syngenta.com
α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:	Ο κάτοχος της έγκρισης
β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)	Ο κάτοχος της έγκρισης
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:	Syngenta Supply AG Switzerland
δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): Syngenta Grangemouth Manufacturing center UK
ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος	Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 1) Syngenta Hellas AEBE Δ/ση εργοστασίου: Οινόφυτα Βοιωτίας 2ο χιλιόμετρο Κοινοτικής οδού Οινοφύτων-Αγ.Θωμά Οινόφυτα-Βοιωτίας Τηλ:22620-51600 FAX:22620-31583 2) Syngenta Grangemouth Manufacturing Center UK 3) Syngenta South Africa (Pty) Limited Brits Production 4) Krokodildrift Road Brits 0250 South Africa
στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:	azoxystrobin 25% β/ο Βοηθητικές ουσίες 76.2% β/β Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος έχει κατατεθεί στο φάκελο της έγκρισης του προϊόντος

2 Συσκευασία(ες)

2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	10-20-50-60-80-100- 160-200-320-400-800 κ.εκ., 1 λίτρο & 5 λίτρα	HDPE ή PET
2	Φακελάκι που περιβάλλεται από χάρτινο «μανίκι» (10 ανά χαρτοκυτίο)	10 κ.εκ.-20 κ.εκ.	Τριστρωματικό φύλλο από PET/Alu/PE που περιβάλλεται από χάρτινο «μανίκι».
3	Μπουκαλάκι	10 κ.εκ.-20 κ.εκ.- 25 κ.εκ- 50 κ.εκ	HDPE/PA

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμοί καλύψεως. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινήστε το σκεύασμα καλά, προσθέστε τη συνιστώμενη δόση στο νερό αναδεύοντας και συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Τα κενά συσκευασίας ξεπλύντε τα πολλές φορές ρίχνοντας το νερό στο ψεκαστικό.

Οδηγίες χρήσης**Δόση εφαρμογής**

Εφαρμόζετε τις χαμηλότερες δόσεις όταν η πίεση του μολύσματος είναι ακόμη χαμηλή (προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων) και τις υψηλότερες όταν η πίεση του μολύσματος είναι μεγάλη (συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας).

Ποσότητα ψεκαστικού υγρού/στρέμμα

Ψεκάστε με τον απαραίτητο όγκο νερού ώστε να επιτευχθεί καλή κάλυψη και διεύθυνση της φυλλικής επιφάνειας από το ψεκαστικό υγρό.

Χρόνος εφαρμογής

Εφαρμόστε το προϊόν προληπτικά πριν ή αμέσως μόλις εμφανισθούν τα πρώτα συμπτώματα. Για βέλτιστα αποτελέσματα προτείνεται η εφαρμογή να γίνεται πριν την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της προσβολής.

Να μην αναμιγνύεται με προσκολλητικά καθώς και με σκευάσματα με ισχυρή προσκολλητική ή διαλυτική δράση. Να αποφεύγεται η ανάμιξη με υγρά γαλακτωματοποιήσιμα σκευάσματα (EC).

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το Amistar 25SC, είναι μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση. Περιέχει το δρών συστατικό azoxystrobin.

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος εφαρμογής- χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών /καλλιεργητική περίοδο Μεσοδιαστήματα
		κ.εκ./ στρέμμα (max)	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ	Κερκόσπορα (<i>cercospora beticola</i>) Ωίδιο (<i>erysiphe communis</i>)	40-80	100-200	40	Ψεκασμοί φυλλώματος Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων	2 μεσοδιάστημα 21 ημέρες
ΡΥΖΙ	<i>pyricularia oryzae</i>	100	-	20-40	Ψεκασμός φυλλώματος Η εφαρμογή να πραγματοποιείται από το στάδιο του φουσκώματος του κολεού – μέχρι του τέλους του ξεσταχυάσματος	1 εφαρμογή
ΣΙΤΑΡΙ	<i>Septoria tritici</i> <i>Puccinia recondita</i>	60-100	-	20-30	Ψεκασμός φυλλώματος Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων BBCH 39-BBCH 69	Μέχρι 2 εφαρμογές κάθε 14 ημέρες
ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ	<i>Alternaria brassicae</i> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	80-100	-	20-30	Ψεκασμός φυλλώματος Προληπτικά ή με την	Μέχρι 2 εφαρμογές κάθε 21 ημέρες

					εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων κάθε 21 ημέρες	
--	--	--	--	--	--	--

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

-Στο ρύζι η εφαρμογή να πραγματοποιείται από το στάδιο του φουσκώματος του κολεού –BBCH 41 (Booting stage) μέχρι του τέλους του ξεσταχυάσματος- BBCH 59(end of heading).

Όγκος ψεκαστικού υγρού 200-400 l/ha. Η εφαρμογή να πραγματοποιείται σε χωράφια που δεν είναι πλημμυρισμένα. (το έδαφος πρέπει να είναι κορεσμένο αλλά όχι πλημμυρισμένο, και το φύλλωμα της καλλιέργειας συγκρατεί το προϊόν για να μη φτάσει στο έδαφος)

Οι χειρισμοί του νερού της καλλιέργειας αναπροσαρμόζονται μετά την εφαρμογή.

- Στο σιτάρι η πρώτη εφαρμογή να πραγματοποιείται στο στάδιο BBCH 39 και η δεύτερη εφόσον απαιτείται όχι μετά το στάδιο BBCH 69.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Διαχείριση ανθεκτικότητας

- Μέγιστος αριθμός εφαρμογών 1-2 ανά καλλιεργητική περίοδο ανάλογα με τις καλλιέργειες
- Αποφεύγετε τις συνεχόμενες εφαρμογές με Amistar 25 SC

Μετά τον ψεκασμό με Amistar, να ακολουθούν επεμβάσεις με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης. Για παράδειγμα εναλλαγή του Amistar με τα μυκητοκτόνα που έχουν σαν δραστική ουσία τα Kresoxim methyl, famoxadone, fenamidone, picoxystrobin, pyraclostrobin, trifloxystrobin, fluoxastrobin, metominostrobin, orysastrobin, dimoxystrobin & enestroburin δεν επιτρέπεται.

Οι εναλλαγές συνεχίζονται με την ίδια σειρά και στις ακολουθούσες καλλιέργειες.

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προσ-

τατευόμενης καλλιέργειας

- σποράς ή φύτευσης των

καλλιεργειών

που

ακολουθούν

- της πρόσβασης του

ανθρώπου
ή των ζώων στην καλλιέργεια
στην οποία έχει εφαρμοστεί
το
σκεύασμα

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Το Amistar, είναι φυτοτοξικό στις μηλιές. Μην χρησιμοποιείτε το Amistar, για εφαρμογές στις μηλιές ή όταν υπάρχει πιθανότητα το ψεκαστικό νέφος να φθάσει σε γειτονική καλλιέργεια μηλιάς.
Ψεκαστικά μέσα που είχαν χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές με το Amistar 25SC, να ξεπλένονται με ιδιαίτερη προσοχή πριν χρησιμοποιηθούν σε καλλιέργεια μηλιάς.

9 Σήμανση σκευάσματος:

N-Επικίνδυνο για το περιβάλλον

10 Φράσεις R

R50/53: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

11 Φράσεις S

S1/2: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
S7: Διατηρείστε την αρχική συσκευασία ερμητικά κλεισμένη.
S13: Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές.
S20/21: Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε μην πίνετε ή καπνίζετε.
S23: Μην αναπνέετε το ψεκαστικό νέφος.
S24/25: Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια. Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη /φόρτωση και τον ψεκασμό.
S61: Αποφεύγετε την απελευθέρωσή του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
S60: Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά την διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.
S61: Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσεως»

12 Πρώτες βοήθειες
- Αντίδοτο**Πρώτες-βοήθειες-αντίδοτο**

Από αναπνοή: Απομακρύνετε τον ασθενή από το χώρο που εκτέθηκε και κρατείστε τον να αναπαυθεί σε ζεστό χώρο. Ενημερώστε το γιατρό προληπτικά.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα που έχουν μολυνθεί και ξεπλύνετε τα μέρη του σώματος που έχουν έρθει σε επαφή με το σκεύασμα, συμπεριλαμβάνοντας τα μαλλιά και τα νύχια, με νερό και σαπούνι. Αυτά τα μέτρα είναι απαραίτητα για να ελαχιστοποιήσετε την έκθεση του δέρματος. Τα λερωμένα ρούχα θα πρέπει να πλυθούν πριν ξαναφορεθούν.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό ή ειδικό διάλυμα για τα μάτια, κρατώντας ανοικτά τα βλέφαρα τουλάχιστον για 5 λεπτά, και ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Κατάποση: Ζητήστε αμέσως συμβουλή γιατρού και δείξτε του το δοχείο ή την ετικέτα. Εάν ο ασθενής διατηρεί τις αισθήσεις του ξεπλύνετε του το στόμα με νερό. Μην του προκαλέσετε εμετό.

Περαιτέρω θεραπευτική αγωγή-Αντίδοτο: Συμπτωματική και υποστηρικτική αγωγή όπως ενδείκνυται.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7739777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Έχουν καθορισθεί Ευρωπαϊκά MRLs στο Παράρτημα III του Κανονισμού 396/2005 (όπως αυτός διαμορφώθηκε με το κανονισμό 149/2008).

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
ζαχαρότευτλα	30
ρύζι	28 ημέρες
σιτάρι	35 ημέρες
ελαιοκράμβη	21 ημέρες

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Δύο (2) χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία χωρίς να ανοιχθεί, σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος.
Προφυλάξτε το σκεύασμα από τον παγετό.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

Η έγκριση θα ανακληθεί στις 31.12.2013 εάν δεν υποβληθεί από τον κάτοχο της έγκρισης αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο που πληρεί τις απαιτήσεις του Παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 545/2011 για την αξιολόγηση των στοιχείων σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

16 Κατάλογος προστατευόμενων μελετών

Στο **Παράρτημα III** της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

-

B**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

M. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ

Δ – 7 (GAP)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Υπεύθυνο όργανο για την υποβολή των στοιχείων : Syngenta Hellas AEBE
 (όνομα, διεύθυνση) : Λ. Ανθούσας 153 44- Ανθούσα Αττικής
 EEC, CIPAC και CCPR No (s) :
 Δραστικό συστατικό (κοινό όνομα) : Azoxystrobin
 Εμπορικό όνομα : **Amistar 25SC**
 Κύριες χρήσεις π.χ. εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο : Μυκητοκτόνο

Ημερομηνία : 19/3/13

Σελίδα :
 Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιέργεια και / ή συνθήκες χρήσης (α)	Κράτος μέλος ή Χώρα	Εμπορικό όνομα του σκευάσματος	(Α) (Θ) ή (Κ)	Εχθρός, ομάδα εχθρών ή ασθενειών ή ζιζανίων που ελέγχονται (γ)	Σκεύασμα		Εφαρμογή				Δοσολογία ανά επέμβαση			Τελευτ. επέμβ.πριν τη συγκομιδή (λ)	Παρατηρήσεις: (μ)
					Μορφή ή (δ-στ)	Περιεκτ. σε δ.ο. (θ)	Μέθοδος / τρόπος (στ-η)	Στάδιο ανάπτυξης και εποχή (ι)	Αριθμός εφαρμ. ελαχ.μεγ. (κ)	Μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών (ημέρες)	γρ δ.ο./ 100lt ψεκ υγρό ελαχ.μεγ.	λίτρα νερού ανά εκτάριο ελαχ.μεγ.	γρ δ.ο./ εκτάριο ελαχ.μεγ.		
Ζαχαρότευτλα	Ελλάδα	Ortiva 25SC	A	<i>Cercospora beticola</i>	SC	250 γρ/lt	Ψεκασμοί καλύψεως		1-2	21 ημέρες		400	0,1-0,20	30	
			A	<i>Erysiphe communis</i>	SC	250 γρ/lt	Ψεκασμοί καλύψεως		1-2	21 ημέρες		400	0,1-0,20	30	
Ρύζι	Ελλάδα	Ortiva 25SC	A	<i>pyrricularia oryzae</i>	SC	250	Ψεκασμός φυλλωματος	BBCH 41- BBCH 59	1	--	---	200-400	0.25	28	

Καλλιέργεια και / ή συνθήκες χρήσης (α)	Κράτος μέλος ή Χώρα	Εμπορικό όνομα του σκευάσματος	(Α) (Θ) ή (Κ)	Εχθρός, ομάδα εχθρών ή ασθενειών ή ζιζανίων που ελέγχονται (γ)	Σκεύασμα		Εφαρμογή				Δοσολογία ανά επέμβαση			Τελευτ. επέμβ.πριν τη συγκομιδή (λ)	Παρατηρήσεις: (μ)
					Μορφή (δ-στ)	Περιεκτ. σε δ.ο. (θ)	Μέθοδος / τρόπος (στ-η)	Στάδιο ανάπτυξης και εποχή (ι)	Αριθμός εφαρμ. ελαχ.μεγ. (κ)	Μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών (ημέρες)	γρ δ.ο./ 100lt υγρό ελαχ.μεγ.	λίτρα νερού ανά εκτάριο ελαχ.μεγ.	γρ δ.ο./ εκτάριο ελαχ.μεγ.		
Σιτάρι	Ελλάδα	Ortiva 25SC	A	<i>Septoria tritici</i> <i>Puccinia recondita</i>	SC	250	Ψεκασμός φυλλωματος	BBCH 39- BBCH 69	2	14	--	200-300	0.15-0.25	35	
Ελαιοκράμβη	Ελλάδα	Ortiva 25SC	A	<i>Alternaria brassicae</i> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	SC	250	Ψεκασμός φυλλωματος	BBCH 59-79	2	21	--	200-300	0.2-0.25	21	