



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 1 - 11 - 2011  
Αριθ. πρωτ: 101977

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Α. Σωτηροπούλου  
Τηλέφωνο: 210 92 87 244  
e-mail: [syg035@minagric.gr](mailto:syg035@minagric.gr)

Προς: Syngenta Hellas ΑΕΒΕ  
Λ.Ανθούσας  
15349 – Ανθούσα, Αττική  
(με απόδειξη)

- Κοιν.: 1. Γραφείο Υπουργού  
κ. Κ. Σκανδαλίδη  
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού  
κ. Ι. Δριβελέγκα  
3. Περιφερειακές Ενότητες  
Δ/σεις Αγροτικής Οικονομίας  
κ' Κτηνιατρικής (με e-mail)  
Έδρες τους  
4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό  
Ινστιτούτο  
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών  
Φαρμάκων  
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά  
5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.  
Έδρες τους  
6. ΕΣΥΦ  
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα  
7. Εσωτερική διανομή:  
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της  
Δ/σής μας  
-Γραμματεία της Δ/σής μας  
8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων  
Διδότου 26, Αθήνα

**ΘΕΜΑ:** "Τροποποίηση της με αριθμό 60.262 οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **ORTIVA TOP 20/12,5 SC** ως προς το φάσμα δράσης"

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο**  
**ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερο το άρθρο 80 αυτού.
2. Την με αριθ. **180276/4-1-2010** Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. **60.262** οριστική έγκριση διάθεση στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **ORTIVA TOP 20/12,5 SC**.
3. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 508/2011/ΕΕ της Επιτροπής της 24<sup>ης</sup> Μαΐου 2011.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/7.9.2010 (ΦΕΚ 154/Α'7-9-2010) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τη με αριθ. 155540/30-6-2011 (ΦΕΚ 1588/Β'1-7-2011) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για “ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Δριβελέγκα”.
6. Την με αριθ. 97534/3-6-2011 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. **60.262** οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **ORTIVA TOP 20/12,5 SC**, που χορηγήθηκε με την αριθ. **180276/4-1-2010** Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς το **φάσμα δράσης**.

**Συγκεκριμένα το σημείο 5.1 (Φάσμα δράσης)** διαμορφώνεται ως εξής:

<b>5</b>		5.1 Φάσμα δράσης				
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ. σκ./στρ.	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρέμμα		
Ζαχαρότευτλα	<b>Κερκοσπορίωση</b> ( <i>Cercospora Beticola</i> )	50-80	-	30-50	Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων (Σύμφωνα και με τις οδηγίες της EBZ)	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 21 ημέρες εφόσον απαιτείται.
	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Erysiphe betae</i> )	80-100				
-Τομάτα (Υπαίθρου και Βιομηχανική)	<b>Αλτερναρίωση</b> ( <i>Alternaria solani</i> )	80-100	-	50-100	Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 8 ημέρες εφόσον απαιτείται.
	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Leveillula taurica</i> )					
	<b>Περονόσπορος</b> ( <i>Phytophthora infestans</i> )					
-Μελιτζάνα (Υπαίθρου)	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Leveillula taurica</i> )	80-100	-	50-100	Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 8 ημέρες εφόσον απαιτείται.
Καρότο (Υπαίθρου)	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Erysiphe heraclei</i> )  <b>Αλτερναρίωση</b> ( <i>Alternaria sp.</i> )	80-100	-	30-50	Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται.

**Παρατηρήσεις:**

- Εφαρμόζετε τις χαμηλότερες δόσεις όταν η πίεση του μολύσματος είναι ακόμη χαμηλή.(προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων) και τις υψηλότερες όταν η πίεση του μολύσματος είναι μεγάλη(συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας).
- **Εφαρμόστε το ORTIVA TOP 20/12,5 SC προληπτικά στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης των ασθενειών και αποφύγετε τις θεραπευτικές εφαρμογές.**

**Π.** Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό με αριθ. **180276/4-1-2010** Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. **60.262** οριστική έγκριση διάθεση στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) **ORTIVA TOP 20/12,5 SC**.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

**Ι. ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

  
ΣΤ. ΣΕΝΗ

ΏΔΑ: 45B2B-H17

**Δ - 7 (GAP)**

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ**

Γεωργικό (ά) Φάρμακο (ά) (κοινή ονομασία)

: (Azoxystrobin 20% + Difenoconazole 12,5%)

Σελίδες :

EEC No (α)

:

Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ

Εμπορικό (ά) όνομα (τα)

ORTIVA TOP 20/12,5 SC

Κύρια χρήση π.χ. εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο

μυκητοκτόνο

1	2	3	4	5	6	7				8			9	10	
Καλλιέργεια και/ή συνθήκες χρήσης  (α)	Κράτος Μέλος ή Χώρα	Εμπορικό Όνομα του σκευάσματος	(Α) (Θ) ή (Κ)	Εχθρός, ομάδα εχθρών ή ασθενειών ή ζιζανίων που ελέγχονται  (γ)	Σκεύασμα		Εφαρμογή				Δοσολογία ανά επέμβαση			Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες)	Παρατηρήσεις
			(Β)		Μορφή  (δ-στ)	Περιεκτικότητα σε δ.ο  (θ)	Μέθοδος/ Τρόπος  (ζ-η)	Στάδιο ανάπτυξης και εποχή  (ι)	Αριθμός εφαρμογών ν ελαχ. μεγ.  (κ)	Χρονικό μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών (ελαχ)	Κγρ. δ.ο/ εκατόλιτρο ελαχ. μεγ.	Λίτρα ψεκαστ. Υγρού/ εκτάριο ελαχ.μεγ.	Γρ.δ.ο /εκτάριο ελαχ.μεγ		
-Ζαχαρότευτλα	ΕΛΛΑΔΑ	ORTIVA TOP 20/12,5 SC	A	<i>Cercospora beticola</i>  <i>Erysiphe betae</i>	SC	Azoxystrobin 200 g/lit + Difenoconazole 125 g/lit	Ψεκασμοί φυλλώματος	Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων (Σύμφωνα και με τις οδηγίες της EBZ).	2	21	-	300-500	(100+62,5) έως (160+100)  (160+100) έως (200+125)	21	-
-Τομάτα (Υπαίθρου και Βιομηχανική)	ΕΛΛΑΔΑ	ORTIVA TOP 20/12,5 SC	A	- <i>Alternaria solani</i>  - <i>Leveillula taurica</i>  - <i>Phytophthora infestans</i>	SC	Azoxystrobin 200 g/lit + Difenoconazole 125 g/lit	Ψεκασμοί φυλλώματος	Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων	3	8	-	500-1000	(160+100) έως (200+125)	7	-
-Μελιτζάνα	ΕΛΛΑΔΑ	ORTIVA TOP 20/12,5 SC	A	- <i>Leveillula taurica</i>	SC	Azoxystrobin 200 g/lit + Difenoconazole 125 g/lit	Ψεκασμοί φυλλώματος	Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων	3	8	-	500-1000	(160+100) έως (200+125)	7	-

ΦΑΔΑ: 45B2B-H17

-Καρότο		ORTIVA TOP 20/12,5 SC	A	- <i>Eisyphe heraclei</i> - <i>Alternaria</i> sp.	SC	Azoxystrobin 200 g/lit + Difenoconazole 125 g/lit	Ψεκασμοί φυλλώματος	Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων	2	14	-	300-500	(160+100) έως (200+125)	14	-
---------	--	-----------------------------	---	--	----	---	------------------------	---	---	----	---	---------	-------------------------------	----	---

- Παρατηρήσεις:
- (α) Για τις καλλιέργειες, η ταξινόμηση της ΕΕ και του Codex (και τα δύο) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Όπου βρίσκει εφαρμογή, οι συνθήκες χρήσης θα πρέπει να περιγράφονται (π.χ. καπνισμός των κατασκευών).
  - (β) Ανοιχτού αγρού (Α), εφαρμογές σε θερμοκήπια (Θ), ή σε κλειστούς χώρους (Κ).
  - (γ) πχ. Μασητικά και μυζητικά έντομα, έντομα εδάφους, έντομα φυλλώματος, ζιζάνια
  - (δ) πχ. Βρέξιμη σκόνη (WP), γαλακτοποιήσιμο συμπύκνωμα (EC)
  - (ε) GCPF Κώδικες – GIFAP Technical Monograph No 2, 1989.
  - (στ) όλες οι χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες θα πρέπει να εξηγούνται
  - (ζ) Μέθοδος πχ. Ψεκασμός υψηλού όγκου, σκονισμός.
  - (η) Τρόπος. Πχ σ' όλη την επιφάνεια, από αέρος, στις γραμμές, ατομικά φυτά – ο τύπος του ψεκαστικού μηχανήματος θα πρέπει να προσδιορίζεται
  - (θ) g/kg ή g/lit
  - (ι) Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία εφαρμογή (BBCH Monograph, Growth Stages of Plants, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), περιλαμβάνοντας όπου βρίσκει εφαρμογή, πληροφορίες σχετικά με την εποχή κατά τον χρόνο εφαρμογής
  - (κ) Ο ελάχιστος και ο μέγιστος δυνατός αριθμός εφαρμογών υπό πρακτικές συνθήκες
  - (λ) Ελάχιστο χρονικό μεσοδιάστημα πριν τη συγκομιδή
  - (μ) Οι παρατηρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: οικονομική σημασία / περιορισμούς