



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 13 - 4 - 2011
Αριθ. πρωτ: 95708

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Α. Σωτηροπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87 244
e-mail: syg035@minagric.gr

Προς: ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ ΑΒΕΕ
Τ.Θ. 51558
564 03 – Ν. Σάντα - Κιλκίς
(με απόδειξη)

Κοιν.: 1. Γραφείο Υπουργού
κ. Κ. Σκανδαλίδη
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
κ. Ι. Κουτσούκου
3. Περιφερειακές Ενότητες
Δ/σεις Αγροτικής Οικονομίας
κ' Κτηνιατρικής (με e-mail)
Έδρες τους
4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά
5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους
6. ΕΣΥΦ
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα
Εσωτερική διανομή:
7. -Τμήματα Β', Γ' & Ε' της
Δ/σής μας
-Γραμματεία της Δ/σής μας
8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων
Διδότου 26, Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 14040 οριστικής έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) PHOSMET ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ 50 WP ως προς το φάσμα δράσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/97 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) με τίτλο «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτής.
2. Τη με αριθ. **125758/17-2-2009** Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία τροποποιήθηκε η με αριθ. **14040/2-3-2004** οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **PHOSMET ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ 50 WP**.
3. Τα από 9-3-2009 και 11-2-2011 Υπηρεσιακά σημειώματα της ομάδας αξιολόγησης υπολειμμάτων της Υπηρεσίας μας.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/7.9.2010 (ΦΕΚ 154/Α'/7-9-2010) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τη με αριθ. 271752/21.10.2010 (Β' 1673) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για “ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ελένη – Μαρία Αποστολάκη και Ιωάννη Κουτσούκο”.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. **14040** οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **PHOSMET ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ 50 WP** που τροποποιήθηκε με την αριθ. **125758/17-2-2009** Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς το **φάσμα δράσης**.

Συγκεκριμένα το σημείο **5 φάσμα δράσης** διαμορφώνεται ως εξής:

5		Φάσμα δράσης			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος				
		γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	γρ./ στρέμμα	όγκος ψεκ. υγρού, λίτρα / στρέμμα		
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: - Γκρέϊπ-φρουτ, - Πορτοκαλιά	-Μύγγα Μεσογείου (<i>Ceratitis capitata</i>) -Κόκκινη Ψώρα (<i>Aonidiella aurantii</i>) -Ψευδόκοκκος (<i>Pseudococcus citri</i>)	50	100	200	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη εφ' όσον καθίσταται αναγκαίο μετά από 30 ημέρες.	1
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: - Μηλιά, - Αχλαδιά	-Καρπόκαψα (<i>Cydia pomonella</i>) -Ανάρσια (<i>Anarsia lineatella</i>) -Οπλοκάμπη (<i>Homlocampa brevis</i>) -Φυλλοδέτες (<i>Adoxophyes orana</i>) -Φυλλορύκτες (<i>Phyllonorycter blancardella</i> , <i>P. corylifoliella</i>) -Ψύλλα (<i>Psylla pyri</i>) -Βαμβακάδα (<i>Diaspis pentagona</i>) -Αιματόψειρα (<i>Eriosoma lanigerum</i>)	120-140	120-140	100	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών.	2

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: - Κερασιά	-Ανάρσια (<i>Anarsia lineatella</i>) -Καρπόκαψα (<i>Cydia molesta</i>) -Ανθονόμους (<i>Anthonomus ornatus</i>) -Ρυγχίτης (<i>Rhynchites bacchus</i>)	120	180-300	150-250	Εφ' όσον δεν εφαρμόζεται πρόγραμμα γεωργικών προειδοποιήσεων, με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη εφ' όσον καθίσταται αναγκαίο μετά από 30 ημέρες.	2
	-Βαμβακάδα (<i>Diaspis spp.</i>)	140	210-350			
Αραβόσιτος	-Σεζάμια (<i>Sesamia nonagrioides</i>), -Πυραλίδα (<i>Ostrinia nubilalis</i>)	120	60-120	50-100	Εφ' όσον δεν εφαρμόζεται πρόγραμμα γεωργικών προειδοποιήσεων, με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη εφ' όσον καθίσταται αναγκαίο μετά από 30 ημέρες.	2
Τριφύλλι	Κάμπιες τριφυλλίου	120	36-60	30-50	Εφ' όσον δεν εφαρμόζεται πρόγραμμα γεωργικών προειδοποιήσεων, με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη εφ' όσον καθίσταται αναγκαίο μετά από 30 ημέρες.	2

Παρατηρήσεις:

1. Για την καταπολέμηση των κοκκοειδών μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με θερινό πολτό.
2. Να μην επαναχρησιμοποιείται πριν περάσουν 30 ημέρες από την προηγούμενη εφαρμογή.
3. Στα κοκκοειδή εφαρμόζεται όταν έχουμε το μέγιστο των κινητών προνυμφών, που συμπίπτει με το 60-65% της εκκόλαψης των αυγών.

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. **125758/17-2-2009** Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία τροποποιήθηκε η με αριθ. **14040/2-3-2004** οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **PHOSMET ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ 50 WP.**

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

I. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ