



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150

Τ.Κ.: 17671-ΑΘΗΝΑ

Πληρ  
Τηλέφωνο:  
FAX  
E-mail:

Αθήνα 27/7/2010  
Αριθ. πρωτ. 187442

ΠΡΟΣ:

- 1 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ  
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  
ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α΄  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
57300 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
(με απόδειξη)

Κοιν.:

1. Γραφείο Υπουργού  
κας. Α. Μπατζελή
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού  
κ. Μ. Καρχιμάκη
3. Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις  
Δ/νσεις Γεωργίας (με e-  
mail)  
Έδρες τους
4. Μπενάκειο  
Φυτοπαθολογικό  
Ινστιτούτο  
Τμήμα Ελέγχου  
Γεωργικών  
Φαρμάκων  
*Εκάλης 2, 14561  
Κηφισιά*
5. *Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.*  
Έδρες τους
6. ΕΣΥΦ  
Πατησίων 53, 104 33 -  
Αθήνα
7. Εσωτερική διανομή:  
-Τμήματα Β΄, Γ΄ & Ε΄ της  
Δ/νσής μας  
-Γραμματεία της Δ/νσής  
μας
8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων  
Διδότου 26, Αθήνα

**ΘΕΜΑ:** « Χορήγηση κατ' εξαίρεση έγκρισης διάθεσης στην αγορά για 120 ημέρες στο φυτοπροστατευτικό προϊόν BEAM 75 WP (μυκητοκτόνο) »

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Η**  
**ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 8 παρ. 4 αυτής.
2. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου
3. Τον Κανονισμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου του 2009 (παρ. 32).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 187/7.10.2009 (ΦΕΚ 214/Α'/7-10-09) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τη με αριθμό 316049/24.11.2009 (ΦΕΚ 2401/Β'/1.12.2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μιχαήλ Καρχιμάκη».
6. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη καταπολέμησης της ασθένειας πυρικούλαριας (*Pyricularia oryzae*), στην καλλιέργεια του ρυζιού
7. Την έλλειψη οποιουδήποτε εναλλακτικού σκευάσματος με οριστική έγκριση κυκλοφορίας, στην Ελλάδα, για τη συγκεκριμένη ασθένεια στην καλλιέργεια του ρυζιού.
8. Την υπ. αριθμ. 0012566-Ρ-26/04/2010 απόφαση του Τμήματος Δημόσιας Υγείας, Κτηνιατρικής, Διατροφής και Ασφάλειας των Τροφίμων του Υπουργείου Υγείας της Ιταλίας, περί χορήγησης άδειας κυκλοφορίας του φυτοφαρμακευτικού προϊόντος BEAM DAS βάσει της δραστικής ουσίας tricyclazole, με το οποίο δόθηκε η δυνατότητα στους Ιταλούς παραγωγούς ρυζιού να χρησιμοποιήσουν και το εν λόγω προϊόν για την καταπολέμηση της ασθένειας στις καλλιέργειές τους
9. Τις σχετικές αιτήσεις των Αγροτικών Συνεταιρισμών Χαλάστρας Α', Κυμίνων, Χαλάστρας Β', Αδένδρου, Μονοκλησσίας Σερρών, Άνω Καμήλας Σερρών, Προβατά Σερρών, Ορυζοκαλλιεργητών Σερρών και Καβάλας
10. Τις σχετικές αιτήσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Θεσσαλονίκης, Σερρών και Καβάλας

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

**Ι.** Χορηγείται έγκριση για **120 ημέρες** διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν BEAM 75 WP (μυκητοκτόνο). Η παρούσα έγκριση χορηγείται μετά από αίτησή τους, στους κάτωθι Αγροτικούς Συνεταιρισμούς :

1. Α.Σ. ΚΥΜΙΝΩΝ
2. Α.Σ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Β
3. Α.Σ. ΑΔΕΝΔΡΟΥ
4. Α.Σ. ΜΟΝΟΚΛΗΣΣΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
5. Α.Σ. ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
6. Α.Σ. ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
7. Α.Σ. ΟΡΥΖΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
8. Ε.Α.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ

## 9. Α.Σ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α

αποκλειστικά και μόνο για την αντιμετώπιση της άμεσης ανάγκης ψεκασμού των καλλιεργειών για το προαναφερόμενο διάστημα των 120 ημερών. Ορίζεται ρητώς, ότι η παρούσα έγκριση χορηγείται μόνο για μία φορά, και για τον ειδικότερο λόγο ότι δεν υφίσταται οποιοδήποτε άλλο σκεύασμα με οριστική έγκριση κυκλοφορίας ικανό να καταπολεμήσει την συγκεκριμένη ασθένεια

### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

#### **1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

6957

27-7-2010

27-11-2010

#### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

BEAM 75 WP

1.2.β Μορφή

WP ( βρέξιμη σκόνη)

#### **1.3 Δραστική ουσία**

α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Tricyclazole

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

95 % min

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

Dow AgroSciences Export SAS, Γαλλία  
Marco Polo, Batiment B, Zac du Font de l' Orme 1,  
790, avenue du Docteur Donat, 06254 Mougins  
Cedex-France

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
  
Ihara Chemical Shizuaka, Japan  
  
(οι Δ/νσεις των εργοστασίων είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκονται στο Παράρτημα I της παρούσας)

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας έχουν υποβληθεί από την Παρασκευάστρια Εταιρεία και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

#### **1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

<p>α) Κάτοχος της έγκρισης<sup>1</sup>:</p>	<p><b>Dow AgroSciences Export SAS, Γαλλία</b>  Marco Polo, Batiment B, Zac du Font de l' Orme 1, 790, avenue du Docteur Donat, 06254 Mougins Cedex-France  E-mail: <a href="mailto:cmavrotas@dow.com">cmavrotas@dow.com</a></p> <p>Υπεύθυνος επικοινωνίας :  Γεώργιος Βασιλείου  Δντης Τεχνικού Τμήματος  ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ  Λ. Μεσογείων 335  TK 15231 Χαλάνδρι  Τηλ 210 6726381  Fax 210 6749514-5  e-mail : <a href="mailto:gvassiliou@elanco.gr">gvassiliou@elanco.gr</a></p>
<p>β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης)</p>	<p>Ο κάτοχος της έγκρισης</p>
<p>γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:</p>	<p>Ο κάτοχος της έγκρισης</p>
<p>δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος</p>	<p>Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης  <b>Dow AgroSciences Italia, Mozzanica ITALIA.</b>  οι Δ/νσεις των εργοστασίων είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας)</p>
<p>ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος</p>	<p>1. <b>Dow AgroSciences Italia, Mozzanica</b>  2. <b>K&amp;N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ</b>  ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος</p>
<p>στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:</p>	<p>Tricyclazole: 75 % β/β  Βοηθητικές ουσίες: 24,24 % β/β  Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στην αίτηση για χορήγηση προσωρινής και παραμένει και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής</p>

<sup>1</sup> Είναι ο αιτών και έχει έδρα σε κάποιο ΚΜ της ΕΕ.

## 2 Συσκευασία(ες)

### 2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος (γραμμάρια)	Υλικό
1	2 Σακούλες μέσα σε κουτί	250, 500, 1000, 2000, 5000	Σακούλα PE, κουτί χάρτινο
2	Σακούλα τυπωμένη	250, 500, 1000, 2000, 5000	Σακούλα αλουμινίου με εσωτερική επιστρωση πολυαιθυλενίου (AL/PE)

### 3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί καλύψεως, με συσκευές μεσαίου όγκου.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Με το σύστημα ανάδευσης σε λειτουργία, προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος και συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**Καθαρισμός ψεκαστήρα:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής ανάκτηση ενέργειας. Τα κενά συσκευασίας, δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε καμία περίπτωση για άλλη χρήση

### 4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Η προληπτική του δράση διαρκεί περίπου 3 εβδομάδες. Θεραπευτική δράση έχει όταν η εφαρμογή του γίνεται μέσα σε 24 ώρες από τη μόλυνση.

### 5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ/ στρέμμα (max)	γρ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		

Ρύζι	<i>Pyricularia oryzae</i>	30	Προσβολή φυλλώματος	40-60	Στο σχηματισμό πρώτου φυλλώματος - αρχή εκβλάστησης. Επανάληψη με την ίδια δόση μετά από 15-20 ημέρες, οπωσδήποτε πριν την εμφάνιση του στάχως.	2
		60	Προσβολή στελέχους/στάχως		Αμέσως μετά το σχηματισμό των κόκκων του ρυζιού (φαινολογικό στάδιο ) ή στην πρώτη εμφάνιση των συμπτωμάτων της ασθένειας (μέσα σε 24 ώρες από τη μόλυνση).	
Πριν να πραγματοποιήσετε τους ψεκασμούς, περιορίστε τη στάθμη του νερού στον ορυζώνα σε λίγα εκατοστά ύψος.						

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

**Μην ψεκάζετε αντίθετα από την φορά του αέρα.**

**7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της  
προσ-  
τατευόμενης καλλιέργειας  
- σποράς ή φύτευσης των  
καλλιεργειών που  
ακολουθούν  
- της πρόσβασης του  
ανθρώπου  
ή των ζώων στην καλλιέργεια  
στην οποία έχει εφαρμοστεί  
το  
σκεύασμα

--

--

Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε κατοικημένες περιοχές ή σε απόσταση 50 μέτρων από αυτές.

Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για 15 ημέρες.

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες δόσεις για τις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

**9** Σήμανση σκευάσματος:

T Τοξικό  
N-Επικίνδυνο για το περιβάλλον

**10** Φράσεις R

R22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.  
R 23 Τοξικό όταν εισπνέεται  
R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

## 11 Φράσεις S

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά  
S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.  
S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, ή καπνίζετε.  
S24/25 Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια.  
S28 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε με άφθο σαπούνι  
S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε με άφθο ζητήστε ιατρική συμβουλή  
S28 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.  
S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας προσώπου.

S46 Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτή τη συσκευασία ή την ετικέτα.  
S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα.  
S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον.  
Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

SP1 – Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.

## 12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

- Σε περίπτωση ατυχήματος ή αδιαθεσίας απομακρύνετε τον ασθενή από την ψεκασμένη περιοχή.  
-Βγάλτε αμέσως τα λεκιασμένα ρούχα.  
-Να ελέγχεται η αναπνοή και αν είναι δυνατό να γίνεται τεχνητή αναπνοή.  
-Να μεταφέρετε τον ασθενή σε νοσοκομειακό κέντρο.  
-ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ.  
-Σε περίπτωση δηλητηρίασης θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό για τα μίγματα που είχαν παρασκευαστεί.  
-Μη δίνετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του.

**Συμπτώματα δηλητηρίασης:**  
Ερεθιστικό για το δέρμα και τους βλεννογόνους, προκαλεί ναυτία, εμετό και διάρροια, μπορεί να εκδηλωθούν αναπνευστικές αλλοιώσεις.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο-Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77 93 777**



### 13 Προστασία των καταναλωτών

#### 13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)

Tricyclazole

Φυτικά προϊόντα	Προσωρινά σε mg/kg
Έχουν οριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά MRLs με τον κανονισμό 396/2005	1

#### 13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Ρύζι	54

#### 14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Να αποθηκεύεται στην αρχική (κλειστή) συσκευασία του, σε χώρο καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

#### Ημερομηνία χορήγησης: Ημερομηνία λήξης:

**II.** Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί προς τους οποίους χορηγείται η παρούσα έγκριση, θα είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση των χρηστών μελών τους για την αυστηρή τήρηση από αυτούς των οδηγιών χρήσης που αναγράφονται στο σκεύασμα, προς εξασφάλιση της υγείας των ιδίων και για την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Επιπλέον υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση πριν από κάθε εφαρμογή του σκευάσματος.

**III.** Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί από τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, οι οποίοι οφείλουν να λάβουν τα αυστηρότερα μέτρα προστασίας των χρηστών κατά τη χρήση του προϊόντος χρησιμοποιώντας τον απαραίτητο εξοπλισμό (προστατευτική ενδυμασία, μάσκα, γάντια κλπ.). Επίσης οι αγροτικοί συνεταιρισμοί είναι υποχρεωμένοι να συλλέξουν τα κενά συσκευασίας από τους χρήστες του προϊόντος και να τα παραδώσουν στην εταιρεία η οποία με δική της ευθύνη θα αναλάβει να τα καταστρέψει.

**IV.** Ο κάτοχος της έγκρισης και οι ιδιώτες που θα εφαρμόσουν το σκεύασμα σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν την Αρμόδια Αρχή για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον, που θα

περιέλθουν σε γνώση τους, από την εν λόγω χρήση. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε. ΧΑΤΖΗ