



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 29 7 - 2010
Αριθ. πρωτ: 187503

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87 161
e-mail: syg036@minagric.gr

Προς: Gowan Comercio Internacional
e Servicos Limitada,
Avendida do Infante 50-9004-
521 Funchal- Madeira-Portugal
Δια μέσου της
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
Λ. Μεσογείων 335
ΤΚ 15231 Χαλάνδρι
(με απόδειξη)

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση οριστικής έγκρισης
διάθεσης στην αγορά στο
φυτοπροστατευτικό προϊόν
(μυκητοκτόνο) ELECTIS 750 WG ”

- Κοιν.:
1. Γραφείο Υπουργού
κας Α. Μπατζελή
 2. Γραφείο Υφυπουργού
κ. Μ. Καρχιμάκη
 3. Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις
Δ/σεις Γεωργίας (με e-mail)
Έδρες τους
 4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
 5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους
 6. ΕΣΥΦ
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα
 7. Εσωτερική διανομή:
-Τμήματα Β΄, Γ΄ & Ε΄ της
Δ/σής μας
-Γραμματεία της Δ/σής μας
 8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων
Λιδότου 26, Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως έχει συμπληρωθεί και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. (1).
2. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Απόφαση του Υπ. Γεωργίας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», όπως ισχύει σήμερα και τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.
3. Την Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθ. 119119/19-7-2004 (ΦΕΚ 1177/Β/2-8-2004) για την «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 115/1997, Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Α΄ 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2003/82/ΕΚ της Επιτροπής».
4. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου , όπως τροποποιήθηκε με το SANCO doc.357 /rev.3/ 2008
5. Τη με αριθ. 104115/11-6-2004 (ΦΕΚ 912/Β/18-6-2004) Κοινή Απόφαση των Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία καταχωρήθηκε στο Παρ/μα Ι του ΠΔ 115/1997 η δραστική ουσία zoxamide
6. Τη με αριθ. 116180/21-2-2006 (ΦΕΚ 303/Β/14-3-2006) Κοινή Απόφαση των Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία καταχωρήθηκε στο Παρ/μα Ι του ΠΔ 115/1997 η δραστική ουσία mancozeb.
7. Τη γνωμοδότηση του **Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ** για το 4^ο θέμα της 3^{ης}/5-7-2010 Συνεδρίασής του.
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 187/7.10.2009 (ΦΕΚ 214/Α΄/7-10-09) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Τη με αριθμό 316049/24.11.2009 (ΦΕΚ 2401/Β΄/1.12.2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μιχαήλ Καρχιμάκη»
10. Τις από 01/12/2004 και 14/11/2005 αιτήσεις της εταιρείας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το ΠΔ 115/97, άρθρο 4 παρ.(1), στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **ELECTIS 750 WG** της εταιρείας **Gowan Comercio Internacional e Servicos Limitada Πορτογαλίας** με υπεύθυνο επικοινωνίας στη χώρα μας την εταιρεία. **ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ.**, με τα ακόλουθα στοιχεία :

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

60.284

29-7-2010

30-6-2016

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

1.2.β Μορφή:

ELECTIS 750 WG

Εναιωρηματοποιησιμοι κόκοι (WG)

1.3 Δραστική ουσία (ες)

α) Κοινή ονομασία των δραστικών ουσιών κατά ISO

zoxamide

ομάδα: βενζαμίδια

mancozeb

ομάδα: διθειοκαρβαμιδικά

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

➤ **zoxamide** 95 % (β/β) min

➤ **mancozeb** 80% (β/β) min

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

1. Zoxamide : Gowan Comercio Internacional e Servicos Limitada, Avendida do Infante 50-9004-521 Funchal- Madeira- Portugal

2. Mancozeb : Dow AgroSciences, Ηνωμένο Βασίλειο

δ) Εργοστάσια παρασκευής των δ.ο.

Η δ.ο. **zoxamide** παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

DALIAN CHEMPHY CHEMICAL CO. LTD, Κίνα

Η δ.ο. **mancozeb** παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1) Dow AgroSciences SAS, Γαλλία

2) Dow AgroSciences de Colombia SA, Κολομβία

3) Dow AgroSciences, Βραζιλία

4) DAS Agricultural Investment Holding Co, Ltd, Κίνα

1. .

(οι διευθύνσεις των εργοστασίων είναι εμπιστευτική πληροφορία και ευρίσκεται στο παράρτημα Ι της παρούσας)

ε) Τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών ουσιών:

Οι τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών Ουσιών περιγράφονται στο Doc J της αίτησης με ημερομηνία 11-2-2009. αίτηση της εταιρείας (Αρ. Πρ. ΥΑΑκΤ 125977) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

Gowan Comercio Internacional e Servicos Limitada,
Avenida do Infante 50-9004-521 Funchal- Madeira-Portugal
Email : JSelmeczi@GOWANCO.com
Mr. Dr. Jozsef Selmeczi

Υπεύθυνος επικοινωνίας :

Γεώργιος Βασιλείου
Δ/ντης Τεχνικού Τμήματος
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
Λ. Μεσογείων 335
ΤΚ 15231 Χαλάνδρι
Τηλ 210 6726381
Fax 210 6749514-5
e-mail : gvassiliou@elanco.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης)

Ο κάτοχος της έγκρισης

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Gowan Comercio Internacional e Servicos Limitada,
Avenida do Infante 50-9004-521 Funchal- Madeira-Portugal

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. **Bayer CropScience, France**
2. **Taminco N.V., Taminco Belgium.**

(οι διευθύνσεις των εργοστασίων είναι εμπιστευτική πληροφορία και ευρίσκεται στο παράρτημα Ι της παρούσας)

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Bayer CropScience, France
2. Taminco N.V., Belgium.
3. K&N EYTHIMIADIS, ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης - Σίνδος
4. ALAPIS CropScience A.E., Ύπατο Θηβών

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Zoxamide: 8,3 % (β/β)
 Mancozeb: 66,7 % (β/β)
 Βοηθητικές ουσίες 16.4% β/β
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στην από 11-2-2009. αίτηση της εταιρείας (Αρ. Πρ. ΥΑΑκΤ 125977) και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής στο part C της έκθεσης αξιολόγησης (registration report).

2

Συσκευασία(ες)

2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος (γραμμάρια)	Υλικό
1	Σάκκοι & Σακκουλες	100-250-300-350-500-750-900-1000-1500-1800-2000-2700-3000-5000-10000	Σάκκοι πολύφυλλοι, PE/EVOH/PE επένδυση μέσα σε χαρτί/χαρτί/PE/χαρτί.
2	Σάκκοι & Σακκουλες	100-250-300-350-500-750-900-1000-1500-1800-2000-2700-3000-5000-10000	Σάκκοι πολύφυλλοι, microperforated PE επένδυση μέσα σε χαρτί/χαρτί/ LDPE/ χαρτί
3	Σάκκοι & Σακκουλες	100-250-300-350-500-750-900-1000-1500-1800-2000-2700-3000-5000-10000	Σάκκοι πολύφυλλοι, PE/EVOH/PE επένδυση μέσα σε χαρτί/ χαρτί/ PE/ χαρτί
4	Σάκκοι & Σακκουλες	100-250-300-350-500-750-900-1000-1500-1800-2000-2700-3000-5000-10000) Σάκκοι πολύφυλλοι, PE/EVOH/PE επένδυση μέσα σε χαρτί.

3 Οδηγίες
χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμογές με ψεκασμούς φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το δοχείο του ψεκαστικού. Ξεπλύνετε τα μηχανήματα εξωτερικά με νερό. Ξεπλύνετε το εσωτερικό του δοχείου του ψεκαστικού με καθαρό νερό συμπεριλαμβανομένων των σωληνώσεων χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό το ένα τρίτο του όγκου του ψεκαστικού δοχείου. Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο με καθαρό νερό κατά το ήμισυ αναδεύστε και αδειάστε τελείως. Επαναλάβετε την διαδικασία. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού κατά το ήμισυ με νερό, προσθέστε καθαριστικό με βάση την αμμωνία (συγκέντρωση 0,03 %) αναδεύστε για 2 λεπτά και γεμίστε το ψεκαστικό με καθαρό νερό. Αφήστε το για 15 λεπτά χωρίς ανάδευση και κατόπιν αδειάστε το δοχείο με πίεση μέσα από σωληνώσεις και βραχίονες. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό δοχείο. Φίλτρα και μπεκ αφαιρούνται και καθαρίζονται ξεχωριστά με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Καύση σε εγκεκριμένες για το σκοπό αυτό εγκαταστάσεις, βάση της κείμενης νομοθεσίας.

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το ELECTIS 750WG είναι μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση. Η δ.ο. zoaxamide δρα εξειδικευμένα εναντίον των οωμυκήτων εμποδίζοντας την κυτταρική διαίρεση. Το Mancozeb δρα εμποδίζοντας τον κυτταρικό μεταβολισμό των μυκήτων σε πολλαπλά σημεία

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ/στρέμμα (max)	γρ/100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Πατάτα Τομάτα (υπαίθρου)	<i>Phytophthora infestans</i>	180		20 -100	Προληπτικές εφαρμογές από το στάδιο που τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ.. Τα μεσοδιαστήματα των εφαρμογών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 10 ημέρες αλλά θα πρέπει να περιοριστούν στις 7 ημέρες όταν η πίεση της ασθένειας είναι υψηλή. Αφήστε το φύλλωμα να στεγνώσει πριν τη εφαρμογή του σκευάσματος μετά από βροχή ή πότισμα. Μην εφαρμόζετε εάν αναμένεται βροχή στις επόμενες 4 ώρες.	3
Αμπέλι	<i>Plasmopara viticola</i>	180	180	50-100	Εφαρμογές με ελάχιστο μεσοδιάστημα 10 ημερών. Αφήστε το φύλλωμα να στεγνώσει πριν τη εφαρμογή του σκευάσματος μετά από βροχή ή πότισμα. Μην εφαρμόζετε εάν αναμένεται βροχή στις επόμενες 4 ώρες.	4

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Προληπτικές εφαρμογές στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών και εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξή τους.
- Να ακολουθούνται, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

- **Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Για την αποφυγή ανάπτυξης φαινομένων ανθεκτικότητας χρησιμοποιείστε το προϊόν σύμφωνα με πρόγραμμα επεμβάσεων συμφωνά με το οποίο το ELECTIS θα εναλλάσσεται με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.
- Το προϊόν είναι συμβατό για χρήση σε προγράμματα IPM.
- **Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή και κατανάλωση αμπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση με το φυτοπροστατευτικό προϊόν.**

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προσ-

τατευόμενης καλλιέργειας

--

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

--

- της πρόσβασης του ανθρώπου

ή των ζώων στην καλλιέργεια

στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

9 Σήμανση σκευάσματος:

Xn – Επιβλαβές
N - Επικίνδυνο για το περιβάλλον

10 Φράσεις R

R37 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα.
R42: Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται.
R43: Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
R50/53: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
R63: Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

11 Φράσεις S

S1/2: Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.
S13: Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S22: Μην αναπνέεται τη σκόνη
S36/37: Να φοράτε κατάλληλα γάντια.
S60: Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.
S61: Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον.

SP1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν η τη συσκευασία του. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη μόλυνση του αγροτικού περιβάλλοντος και των δρόμων.

SPe3: Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών, να αφήνεται ανέκαστη ζώνη προστασίας **20 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα.

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης».

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Μην χορηγείτε υγρά και μην προκαλείτε εμετό εάν ο πάσχων δεν διατηρεί τις αισθήσεις του ή παρουσιάζει σπασμούς.
Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε βοήθεια γιατρού ο οποίος θα αποφασίσει το αν θα προκληθεί εμετός ή όχι.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε τα πολύ καλά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής μετά από 1-2 λεπτά και συνεχίστε το ξέπλυμα για αρκετά λεπτά ακόμη. Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα συμβουλευτείτε γιατρό, κατά προτίμηση οφθαλμίατρο.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλυθείτε πολύ καλά κάτω από τρεχούμενο νερό και χρησιμοποιείτε σαπούνι. Πλύνετε τα λερωμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.
Σε περίπτωση εισπνοής μετακινηθείτε στον καθαρό αέρα, συμβουλευτείτε γιατρό.
 Για το γιατρό: Φροντίδα υποστηρικτική. Ταυτόχρονη έκθεση στο οινόπνευμα θα πρέπει να αποφεύγεται γιατί το mancozeb έχει δράση δισουλφιράμης.
 Θεραπεία συμπτωματική.
Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210 - 7793777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)	Φυτικά προϊόντα	Προσωρινά σε mg/kg
mancozeb & zoxamide	Έχουν καθοριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά MRLs στον Κανονισμό 396/2005	

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις	Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
	Πατάτες, Τομάτες	7
	Σταφύλια (Επιτραπέζια & Οινοποιήσιμα)	28

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο ξηρό χώρο προστατευόμενο από ακραίες θερμοκρασίες και το άμεσο ηλιακό φως.

15

Προστατευόμενα στοιχεία και μελέτες

Στο Παράρτημα I (Annex I) του registration report καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα έγκριση κυκλοφορίας. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

16

Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση χορηγείται με την προϋπόθεση ότι η ενδιαφερόμενη εταιρεία θα προσκομίσει στην Αρμόδια Αρχή μέχρι 30 Μαρτίου 2013 την μελέτη σταθερότητας κατά την αποθήκευση για 2 έτη του σκευάσματος GF-1045 στην εμπορική συσκευασία του.

Η Αρμόδια Αρχή θα αξιολογήσει τα στοιχεία αυτά και θα αποφανθεί εντός έξι (6) μηνών από την υποβολή τους γνωστοποιώντας το αποτέλεσμα στο ΑΣΥΓΕΦ.

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

B**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή για οποιαδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ

M. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ

**Περίληψη Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για τη χρήση γεωργικών φαρμάκων
(Εφαρμογή σε όλες τις καλλιέργειες)**

Υπεύθυνος φορέας (όνομα, διεύθυνση) :

Γεωργικό (ά) Φάρμακο (α) (κοινή ονομασία) : zoxamide 8,3 % β/β + mancozeb 66,7% β/β
 ΕΕ, CIPAC και CCPR No. (Α) :
 Εμπορικό (ά) όνομα (τα) : ELECTIS 750 WG
 Κύρια χρήση π.χ. εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο : Μυκητοκτόνο

Ημερομηνία :
 Σελίδα : 1
 Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ

1 Πεδίο εφαρμογής	2 Υ ή Θ	3 Εχθρός, ομάδα εχθρών ή ασθενειών ή ζιζανίων που ελέγχονται	4		6			7			8 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες)	9 Παρατηρήσεις (κ)
			Μορφή (δ-στ)	Περιεκτικότητα σε δ.ο. (θ)	Μέθοδος/ τρόπος (στ-η)	Στάδιο ανάπτυξης (ι)	Αριθμός (από-έως)	Κιλά δ.ο./ εκατόλιτρο	λίτρα ψεκαστικού/ υγρού/ εκτάριο	Κιλά δ.ο./ εκτάριο		
(α)	(β)	(γ)										
Αμπέλι (επιτραπέζιο & οινοποιησιμο)	Υ	Περονόσπορος <i>Plasmopara viticola</i>	WG	83 γρ/ κιλό + 667 γρ/ κιλό	Ψεκασμός μεγάλου όγκου (φυλλώματος)	BBCH 15-85	μεγ. 3	0.015 + 0.12	200-1000	0.15 + 1.2	28	10 ημέρες ανάμεσα στους ψεκασμούς
Πατάτα	Υ	Περονόσπορος <i>Phytophthora Infestans</i>	WG	83 γρ/ κιλό + 667 γρ/ κιλό	Ψεκασμός μεγάλου όγκου (φυλλώματος)	BBCH 15-90	μεγ. 4		150-1000	0.15 + 1.2	7	7-10 ημέρες ανάμεσα στους ψεκασμούς
Τομάτα	Υ	Περονόσπορος <i>Phytophthora Infestans</i>	WG	83 γρ/ κιλό + 667 γρ/ κιλό	Ψεκασμός μεγάλου όγκου (φυλλώματος)	BBCH 15-90	μεγ. 4		150-1000	0.15 + 1.2	7	7-10 ημέρες ανάμεσα στους ψεκασμούς

Παρατηρήσεις:

- Σε περίπτωση ομάδας καλλιεργειών πρέπει να δίνεται ο κωδικός κατάταξης
- Υπαίθρια (Υ) ή θερμοκηπιακή (Θ) εφαρμογή
- μασητικά ή μυζητικά έντομα, έντομα εδάφους, μύκητες φυλλώματος
- βρέξιμη σκόνη (WP), γαλακτωποιήσιμο συμπύκνωμα (EC), κοκκώδη (GR)
- Χρησιμοποιείστε του κωδικούς CIPAC/FAO όπου απαιτείται

- f) Όλες οι χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες πρέπει να επεξηγούνται
- g) Μέθοδος π.χ. ψεκασμοί μεγάλου όγκου, μικρού όγκου, διασπορά, επίπαση, εφαρμογή μέσω άρδευσης
- h) Τρόπος π.χ. γενικός ψεκασμός, ευρείας κλίμακας, αεροψεκασμός, επί των σειρών, ανά φωτό, μεταξύ των φυτών
- i) g/kg ή g/l
- j) Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία επέμβαση
- k) Οι παρατηρήσεις μπορούν να περιέχουν: Επέκταση της χρήσης / οικονομική σημασία / περιορισμούς (π.χ. στη ζωοτροφή βόσκηση) / ελάχιστα μεσοδιαστήματα μεταξύ των εφαρμογών