



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 21 - 12 - 2010
Αριθ. πρωτ: 192291

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 72 11
e-mail: svg046@minagric.gr

Προς: BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
Σωρού 18 - 20
Τ.Κ. 15125 - Μαρούσι
(με απόδειξη)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 1616
έγκρισης του φυτοπροστατευτικού
προϊόντος (εντομοκτόνο)
CONFIDOR 200 SL, ως προς τον
τρόπο και χρόνο εφαρμογής, τις
παρατηρήσεις του φάσματος
δράσης, τις φράσεις κινδύνου (R)
και τις φράσεις προφύλαξης (S)»

Κοιν.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γραφ. Προϊστ. Γεν. Δ/σης Φυτ.
Παραγωγής κ. Δ. Μπαμπίλη
5. Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις
Δ/σεις Γεωργίας (με e-mail)
Έδρες τους
6. Μ.Φ.Ι.
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων (με e-mail)
7. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους (με e-mail)
8. Ε.ΣΥ.Φ.
Πατησίων 53, 104 33 – Αθήνα
9. Εσωτερική διανομή:
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της
Δ/σής μας
-Γραμματεία της Δ/σής μας
10 Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων
Λιδότου 26, Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/97 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) με τίτλο «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 4 (παρ. 6) αυτού.
2. Τις διατάξεις της με αριθ. 190688/10.11.2010 ΚΥΑ με θέμα την «Τροποποίηση του παραρτήματος Ι του Π.Δ. 115/1997 (Α' 104) όσον αφορά τους ιδιαίτερους όρους για τις ουσίες clothianidin, thiamethoxam, fipronil και imidacloprid, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2010/21/ΕΕ της Επιτροπής της 12^{ης} Μαρτίου 2010».

3. Το από 21/9/2010 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Ομάδας Οικοτοξικολογικού Ελέγχου φυτοπροστατευτικών προϊόντων της υπηρεσίας μας.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/7.9.2010 (ΦΕΚ 154/Α'7-9-2010) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τη με αριθ. 271752/21.10.2010 (Β' 1673) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για "ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ελένη – Μαρία Αποστολάκη και Ιωάννη Κουτσούκο".
6. Τη σχετική αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας (Α.Π. 187301/20.7.2010).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε την με αριθ. **1616/16.3.1993** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **CONFIDOR 200 SL**, η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 68321/16.3.1993 Απόφασή μας και τροποποιήθηκε-αναμορφώθηκε μετά την καταχώριση της δραστικής ουσίας imidacloprid στο παράρτημα I του Π.Δ. 115/97 με τη με αριθ. 183711/21.4.2010 Απόφασή μας, ως προς τον τρόπο και χρόνο εφαρμογής, τις παρατηρήσεις του φάσματος δράσης, τις φράσεις κινδύνου (R) και τις φράσεις προφύλαξης (S). Συγκεκριμένα, τα σημεία 5, 10 και 11 της με αριθ. 183711/21.4.2010 Απόφασής μας, διαμορφώνονται ως ακολούθως:

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκαστικού υγρού/ στρέμμα	κ.εκ./ στρέμμα		
Εσπεριδοειδή: Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ-φρούτ	-Εριώδης αλευρώδης (<i>Aleurothrixus floccosus</i>)	75	200-400	150-300	Ψεκασμός φυλλώματος. Με την εμφάνιση των νυμφών του εντόμου (στάδια L1 και L2).	2 εφαρμογές ανά 20-30 ημέρες
	-Φυλλοκνίστης (<i>Phyllocnistis citrella</i>)	50-75*	200-400	100-300	Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής.	
Αχλαδιά	Ψύλλα αχλαδιάς (<i>Cacopsylla pyri</i>)	60	150	90	Με την έναρξη της προσβολής Μπορεί να εφαρμοστεί στις εξής περιόδους: Προανθικά μέχρι το στάδιο έναρξης της λευκής κορυφής (BBCH: 54) και μετά την καρπόδεση έως την έναρξη αλλαγής χρώματος (BBCH 71-79)	1

Ροδακινιά	-Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> , <i>M. nicotianae</i>)	25-30*	150-250	37,5-75	Με την έναρξη της προσβολής. Μπορεί να εφαρμοστεί στις εξής περιόδους: Προανθικά μέχρι το στάδιο έναρξης της ρόδινης κορυφής (BBCH: 54) και μετά την καρπώδεση έως την έναρξη αλλαγής χρώματος (BBCH 71-79)	2 εφαρμογές ανά 28 ημέρες
Τομάτα υπαίθρου	-Αφίδες (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>) -Αλευρώδης (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	50	50-100	25-50	Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής.	2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες
Τομάτα θερμοκηπίου	-Αλευρώδης (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	---	---	75-125 (5)	Ριζοπότισμα με το νερό της άρδευσης.	2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες
Αγγούρι (θερμοκηπίου και υπαίθρου)	Αλευρώδης (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	---	---	75-125 (5)	Ριζοπότισμα - προληπτική εφαρμογή	2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες
Βαμβάκι	Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i>)	---	50-80	50	Με την έναρξη της προσβολής	2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες
Πατάτα	-Αφίδες (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>) -Δορυφόρος (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	---	50-100	50	Με την έναρξη της προσβολής και μέχρι 4 αφίδες ανά φύλλο. Να μην εφαρμόζεται όταν υπάρχει μελίτωμα.	2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες
Καπνός	-Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> , <i>M. nicotianae</i>)	25-60	50-100	25-30	<u>Ψεκασμός φυλλώματος</u> με την εμφάνιση της προσβολής. Ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται με την επανεμφάνιση της προσβολής	2 εφαρμογές ανά 20-30 ημέρες
		---	---	50-100 (5)	<u>Ριζοπότισμα</u> με νερό της μεταφύτευσης	1

*: το εύρος της δόσης εξαρτάται από την ένταση της προσβολής

Παρατηρήσεις:

- (1): Στα εσπεριδοειδή σε προγράμματα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης συνιστάται να εφαρμόζεται όταν υπάρχει μικρός πληθυσμός ακμαίων του παρασίτου *Cales noacki* ωρίμων για ωτοκία.
- (2): Στα εσπεριδοειδή σε περίπτωση προχωρημένης προσβολής (μικτός πληθυσμός) ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται 20-30 ημέρες από τον προηγούμενο.
- (3): Στα εσπεριδοειδή για την καταπολέμηση του Φυλλοκνίστη (*Phyllocnistis citrella*) η μικρή δόση συνιστάται για μικρή πίεση προσβολής ενώ η μεγάλη δόση για μεγάλη πίεση προσβολής.
- (4): Στα εσπεριδοειδή σε περίπτωση προχωρημένης προσβολής εριώδη αλευρώδη (μικτός πληθυσμός) συνιστάται η προσθήκη (TANK-MIX) θερινού λαδιού σε δόση 1 λίτρου.
- (5): Στις περιπτώσεις εφαρμογής με ριζοπότισμα, το εύρος των δόσεων εξαρτάται από την πυκνότητα των φυτών
- (6) **Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα όταν οι μέλισσες είναι σε φάση έντονης κινητικότητας.**
- (7) **Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα κατά την περίοδο της άνθισης.**

(8) Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα σε περίπτωση που εμφανίζεται μελίτωμα (π.χ. περισσότερο από 4 αφίδες ανά φύλλο).

10 Φράσεις R

Spε8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν Απομακρύνετε ή και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους.

Βλαβερό για τα πουλιά.

11 Φράσεις S

S1/2 Να φυλάσσεται κλειδωμένο μακριά από παιδιά.
S13 Μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές.
S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα που έχουν λερωθεί με το σκεύασμα. Πλύνετε τα πριν τα ξαναφορέσετε.
S24/25 Αποφεύγετε επαφή με τα μάτια και το δέρμα.
S36/37 Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή.

<< Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε χρήσεις οδηγίες χρήσης.>>

II. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 183711/21.4.2010 Απόφασή μας, όπως ισχύει.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**



I. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ