



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Αθήνα, 12 - 5 - 2014  
Αριθ. πρωτ: 3245/36958**

**Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Κ. Μαρκάκης  
Τηλέφωνο: 210 928 7226  
e-mail: [syg061@minagric.gr](mailto:syg061@minagric.gr)**

**Προς: BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ  
Σωρού 18-20, Μαρούσι, Αθήνα  
TK 15125**

**Κοιν.: Εσωτερική διανομή:  
Τμήμα Δ της Δ/νσής μας  
(Υπόψη κου Κ. Μαρκάκη)**

**ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ.  
60.321/31-5-2012 οριστικής  
έγκρισης του  
φυτοπροστατευτικού  
προϊόντος (μυκητοκτόνο)  
Volare 687,5 SC (δ.ο.  
fluoricolide 6,25 %) ως προς  
το φάσμα δράσης, την  
ταξινόμηση και σήμανση του  
σκευάσματος»**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Ο**

**ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερο το άρθρο 45 αυτού.
2. Τον Ν. 4036 (ΦΕΚ 8/Α/27-1-2012) σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, την ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Την με αρ. πρωτ. 6121/63465/31-5-2012 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60.321/31-5-2012 **οριστική** έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) Volare 687,5 SC (δ.ο. fluoricolide 6,25 %) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τη με αριθ. 462/106101 (ΦΕΚ 2240/Β/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς,

Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράψουν «“με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”»

5. Τη με αριθ. Πρωτ. 3345/36958/18-3-2014 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.
6. Τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. 60.321/31-5-2012 οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) Volare 687,5 SC (δ.ο. fluopicolide 6,25 %), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 6121/63465/31-5-2012 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως προς το φάσμα δράσης, την ταξινόμηση και σήμανση του σκευάσματος προκειμένου αυτή να εναρμονιστεί με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 .

**Συγκεκριμένα τα σημεία 5, 9, 10 και 11 διαμορφώνονται ως εξής:**


#### 5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιαστήματα επεμβάσεων
		Κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα	κ.εκ/ στρέμμα		
Πατάτα <sup>1</sup>	Περονόσπορος ( <i>Phytophthora infestans</i> )	120-160	100	120-160	Προληπτικές εφαρμογές. Η μικρή δόση να χρησιμοποιείται σε συνθήκες χαμηλής πίεσης προσβολής. BBCH: 21 - 81	4 / 7-12
Αγγούρι, κολοκύθι, κολοκύθα (υπαίθρου)	Περονόσπορος ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	120-160	100	120-160	Η μικρή δόση να χρησιμοποιείται σε συνθήκες χαμηλής πίεσης προσβολής. BBCH: 21 - 83	2 / 7-12
Αγγούρι <sup>2</sup> , κολοκύθι (θερμοκηπίου)	Περονόσπορος ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	120-128	100-125	120-160	Η μικρή δόση να χρησιμοποιείται σε συνθήκες χαμηλής πίεσης προσβολής. BBCH: 21 - 83	3 / 7-12
Πεπόνι, Καρπούζι (υπαίθρου)	Περονόσπορος ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	140-160	100	140-160	BBCH: 21 - 86	2 / 7-12
Πεπόνι, Καρπούζι (Θ)	Περονόσπορος ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	140-160	100	140-160	BBCH: 21 - 86	3 / 7-12
Μαρούλι (Υ) (ποικιλίες στρογγυλού μαρουλιού)	Περονόσπορος ( <i>Bremia lactucae</i> )	140-160	100	140-160	Εφαρμογή μετά το τρίτο πραγματικό φύλλο (BBCH 13)	1 / --
Μαρούλι (Θ) (ποικιλίες στρογγυλού μαρουλιού)	Περονόσπορος ( <i>Bremia lactucae</i> )	140-160	100	140-160	BBCH: 13 - 49	<b>1-2</b> / 7-12

Λάχανο λευκό, Λάχανο κόκκινο, (υπαίθρου)	Περονόσπορος ( <i>Peronospora</i> spp.)	160	100	160	BBCH: 13 - 49	3 / 7-12
Κουνουπίδι Μπρόκολο	Περονόσπορος ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	160	100	160	BBCH: 13 - 49	1-3 / 7-12

## Παρατηρήσεις:

1. Η δόση των 120 κ.εκ/ στρ. θα πρέπει να εφαρμόζεται προληπτικά ενώ η δόση των 160 κ.εκ/ στρ. θα πρέπει να εφαρμόζεται προληπτικά σε περίπτωση που ο κίνδυνος εμφάνισης της προσβολής είναι υψηλός ή θεραπευτικά στα αρχικά στάδια έναρξης της προσβολής.
2. Για όγκους νερού μεγαλύτερους των 100 λίτρα / στρ, η μέγιστη δόση δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 160 κ.εκ/ στρ.

**9** ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
**ΠΡΟΣΟΧΗ**
**10** ΔΗΛΩΣΕΙΣ  
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

- H317** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- EUH 401** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**11** ΔΗΛΩΣΕΙΣ  
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

**P102** Μακριά από παιδιά.

**P201** Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

**P220** Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

**P262** Να μην έρθει σε επαφή με το δέρμα.

**P270** Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P273** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

**P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

**P333 + P313** Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

**P405** Φυλάσσεται κλειδωμένο.

**SP 1** Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του [Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.]

«Συστήνεται ο χρήστης να φοράει αδιαπέραστη προστατευτική ενδυμασία κατά την εφαρμογή»

«Να μην εισέρχεστε στους ψεκασμένους αγρούς πριν τα φύλλα να έχουν πλήρως στεγνώσει. Σε περίπτωση που οι εργάτες χρειαστεί να εισέλθουν στους ψεκασμένους αγρούς αμέσως μετά τον ψεκασμό αυτοί θα πρέπει να φοράνε προστατευτική ενδυμασία»

Η ανωτέρω ταξινόμηση και σήμανση είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1272/2008 και είναι υποχρεωτική από 1-6-2015.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 6121/63465/31-5-2012 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) Volare 687,5 SC (δ.ο. fluoricolide 6,25 %) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ**

**α.α.**

**Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ**