



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 11 - 12 - 2012
 Αριθ. πρωτ: 12282/121378

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
 Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
 TELEFAX: 210 92 12 090
 Πληροφορίες: Π. Θεοδωρής
 Τηλέφωνο: 210 928 7225
 e-mail: syg036@minagric.gr

Προς: United Phosphorus Ltd – UK
 Hall Lane
 Rookery Bridge
 Sandbach
 Cheshire CW11 3QQ, United
 Kingdom
 Ms Barnali Goswami
bgoswami@uniphos.co.uk
 Δια της:
 ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ
 ΑΕΒΕ
 Εθνικής Αντιστάσεως 73
 Τ.Κ.: 152 31- Χαλάνδρι
technical@alfagro.gr

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης
 διάθεσης στην αγορά στο
 φυτοπροστατευτικό προϊόν
 (ζιζανιοκτόνο) Beetup Compact SC

Κοιν.: ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερο το άρθρο 80.5 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις
3. Τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα

5. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών.
6. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου , όπως τροποποιήθηκε με το SANCO doc.357 /rev.3/ 2008
7. Τις αξιολογήσεις από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο για το φυτοπροστατευτικό προϊόν **BEET UP COMPACT SC** και το προϊόν **RECORD 8/8 EC** στο οποίο χορηγήθηκε, με την ΥΑ με αρ. πρωτ. 93775/1.3.2011, οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά με ΑΕΚ 7952.
8. Τη με αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/Β/22-5-2009) Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για “Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με «Εντολή Υφυπουργού».
9. Τις 127731/07-04-09 και 12282/121378/30-11-12 αιτήσεις της **United Phosphorus Ltd – UK**.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 80.5, του Κανονισμού 1107/2009 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **Beetup Compact SC** της εταιρείας **United Phosphorus Ltd – UK** με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

70006
11/12/2012
11/12/2022

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα

Beetup Compact SC

- 1.2.β Μορφή:

ΠΥΚΝΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ (SC)

1.3 Δραστικές ουσίες

Δραστική ουσία 1	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	Phenmedipham
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	970 g/Kg min
Χημική ομάδα	Φαινυλοκαρβαμικά
Παρασκευαστής	United Phosphorus Ltd – UK Hall Lane Rookery Bridge Sandbach Cheshire CW11 3QQ, United Kingdom Ms Barnali Goswami Τηλ.: +44- (0) 1925 859006 Fax: +44- (0) 1925 817425 E-mail: bgoswami@uniphos.co.uk
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): Phenmedipham United Phosphorus Ltd 3-11 GIDC Vapi 396195 Gujarat, India
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως αυτές κατατέθηκαν με το με αριθ. πρωτ. 116559/29-2-2008 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ

Δραστική ουσία 2	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	Desmedipham
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	970 g/Kg min
Χημική ομάδα	Φαινυλοκαρβαμικά
Παρασκευαστής	United Phosphorus Ltd – UK Hall Lane Rookery Bridge Sandbach Cheshire CW11 3QQ, United Kingdom Ms Barnali Goswami Τηλ.: +44- (0) 1925 859006 Fax: +44- (0) 1925 817425 E-mail: bgoswami@uniphos.co.uk
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): Desmedipham United Phosphorus Ltd Plot 3405/06 GIDC Ankleshwar 393002 Gujarat, India
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως αυτές κατατέθηκαν με το με αριθ. πρωτ. 116559/29-2-2008 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

United Phosphorus Ltd – UK
 Hall Lane
 Rookery Bridge
 Sandbach
 Cheshire CW11 3QQ, United Kingdom
 Ms Barnali Goswami
 Τηλ.: +44- (0) 1925 859006
 Fax: +44- (0) 1925 817425
 E-mail: bgoswami@uniphos.co.uk

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
 ΑΜΕ :
 Εθνικής Αντιστάσεως 73
 Τ.Κ.: 152 31- Χαλάνδρι
 Τηλ.: 211 120 5570
 Fax: 211 120 5572
 E-mail: technical@alfagro.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
 ΑΜΕ :
 Εθνικής Αντιστάσεως 73
 Τ.Κ.: 152 31- Χαλάνδρι
 Τηλ.: 211 120 5570
 Fax: 211 120 5572
 E-mail: technical@alfagro.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

United Phosphorus Ltd – UK
 Hall Lane
 Rookery Bridge
 Sandbach
 Cheshire CW11 3QQ
 United Kingdom
 Ms Barnali Goswami
 Τηλ.: +44- (0) 1925 859006
 Fax: +44- (0) 1925 817425
 E-mail: bgoswami@uniphos.co.uk

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση):
United Phosphorus Ltd – UK
 Hall Lane
 Rookery Bridge
 Sandbach
 Cheshire CW11 3QQ
 United Kingdom

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτίας
 Ταχ. Δ/ση: 32 011 - Οινόφυτα, Βοιωτίας
 Τηλ.: 2262 – 30821-3
 FAX: 2262 – 30820
 E-mail: nikos.kosmidis@alfagro.gr

United Phosphorus Ltd – UK

Hall Lane
 Rookery Bridge
 Sandbach
 Cheshire CW11 3QQ
 United Kingdom

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσίες
 Phenmedipham 8% β/ο
 Desmedipham 8% β/ο
 Βοηθητικές ουσίες 83,7 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το με αριθ. πρωτ. 127731/ 07.04.09 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ

2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλες	500 κ.εκ. & 1 λίτρο	Πλαστικό τύπου HDPE με κατάλληλα πώματα ασφαλείας .
2.	Δοχεία	5 & 10 λίτρα	Πλαστικό τύπου HDPE με κατάλληλα πώματα ασφαλείας .

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός σε όλη την επιφάνεια του εδάφους με 20 - 30 λίτρα νερό / στρ. Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 3 atm (45 psi). Χρησιμοποιείτε μπέκ τύπου σκούπας. Να αποφεύγετε η υπερβολική διαβροχή.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι την μέση. Προσθέστε την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος, αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείται απόλυτα καθαρός ψεκαστήρας, το δε ψεκαστικό υγρό να χρησιμοποιείται εντός (4) τεσσάρων ωρών από την παρασκευή του.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Μετά τον ψεκασμό ξεπλύντε δυο φορές τα ψεκαστικά μέσα με νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Συνδυάζεται με τα σκευάσματα ETHOFUMESATE ΑΛΦΑ 500 SC και GOLTIX 700 SC (metamitron).

Προφυλάξεις για τους χειριστές: --

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων ζιζανίων στα τεύτλα. Δρα με απορρόφηση από το φύλλωμα των ζιζανίων, όταν βρίσκονται στο στάδιο των κοτυληδόνων μέχρι το στάδιο των 4 φύλλων. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζεται η λειτουργία του φωτοσυστήματος II της φωτοσύνθεσης.

5 5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο	
		κ.εκ. σκ./στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα/στρ.			
-Ζαχαρότευτλα -Κτηνοτροφικά τεύτλα	Ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια*	600	20-30	Μεταφυτρωτικά από το στάδιο των δύο (2) φύλλων των τεύτλων και μέχρι το στάδιο των (4) φύλλων των ζιζανίων.	1	
		ή				
		200	20-30	3 εφαρμογές. Η πρώτη εφαρμογή μπορεί να γίνει όταν τα μικρότερα ζαχαρότευτλα/κτηνοτροφικά τεύτλα βρίσκονται στο στάδιο των κοτυληδόνων. Η 2η και 3η εφαρμογή μπορούν να γίνουν όταν τα νέα ζιζάνια φτάσουν στο στάδιο των κοτυληδόνων (γενικά 5-14 ημέρες μετά τη προηγούμενη εφαρμογή).	3	
<p>* - Ευαίσθητα ζιζάνια: α) Μέχρι το στάδιο των κοτυληδόνων. <i>Chamomilla recutita</i> (χαμομήλι). β) Μέχρι το στάδιο των 2 φύλλων. <i>Atriplex</i> spp. (ατρίπλεξ ή στριγγλόχορτο), <i>Capsella bursa-pastoris</i> (καψέλλα), <i>Datura stramonium</i> (τάτουλας), <i>Paraver rhoeas</i> (παπαρούνα κοινή), <i>Bilderdykia convolvulus</i> (αναρριχώμενο πολύγωνο), <i>Solanum nigrum</i> (αγριοντοματιά ή στύφνος), <i>Fumaria officinalis</i> (καπνόχορτο). γ) Μέχρι το στάδιο των 4 φύλλων. <i>Amaranthus</i> spp.(βλήτα), <i>Chenopodium album</i> (λουβουδιά), <i>Sinapis arvensis</i> (άγριο σινάπι), <i>Stellaria media</i> (στελλάρια), <i>Veronica</i> spp. (βερόνικα).</p> <p>* - Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: <i>Polygonum aviculare</i> (πολυκόμπι) (μέχρι το στάδιο των κοτυληδόνων).</p> <p>* - Ανθεκτικά ζιζάνια: <i>Euphorbia</i> spp. (γαλατσίδα), <i>Sonchus</i> spp. (ζωχός), <i>Chrysanthemum segetum</i> (αγριομαργαρίτα) και όλα τα αγρωστώδη ζιζάνια.</p>						

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί
- Ο ψεκάσμος πρέπει να αποφεύγεται:**
- Όταν η καλλιέργεια πρόκειται να αρδευτεί ή υπάρχει πιθανότητα βροχής μέχρι και 6 ώρες μετά τον ψεκάσμό.
 - Σε καλλιέργειες εξασθενημένες από χαλάζι, έντομα, ή επηρεασμένες από προφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα.
 - Όταν η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από 25 °C, όταν υπάρχει έντονη ηλιοφάνεια, όταν παρατηρούνται νυχτερινοί παγετοί σε καλλιέργειες που δεν έχουν σκληραγωγηθεί και όταν έχουμε περιόδους χαμηλών θερμοκρασιών που ακολουθούνται από ξαφνική αύξηση θερμοκρασίας. Κατά τη διάρκεια θερμών ημερών ο ψεκάσμος πρέπει να γίνεται αργά το απόγευμα.
 - Όταν φυσάει αέρας.
- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
 - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα
- Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, μπορούν να σπαρθούν εκ νέου ζαχαρότευτλα οποτεδήποτε μετά την εφαρμογή του **Beetup Compact SC**.
- Άλλες καλλιέργειες μπορούν να σπαρθούν 3 μήνες μετά την εφαρμογή του αφού προηγηθεί βαθιά άροση (15-20 εκ).
-
- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.
- Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του. Σε περίπτωση εφαρμογής όταν επικρατεί υψηλή θερμοκρασία πιθανόν να προκαλέσει περιφερειακό κάψιμο ή χλώρωση των φυτών που όμως θα εξαφανιστούν σε 10 περίπου ημέρες. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος σε εξασθενημένες καλλιέργειες και όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
- 9** Σήμανση σκευάσματος:
- Xi** – Ερεθιστικό
N – Επικίνδυνο για το περιβάλλον
- 10** Φράσεις R
- R36/38** Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα
R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα
R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

11 Φράσεις S

S1/2 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά
S13 Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.
S24/25 Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια
S37 Να φοράτε κατάλληλα γάντια
 «Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία, γάντια και κατάλληλες μπότες εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκάσμό».
S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα
S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
Sp1 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του
SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.
SPe3 Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από την μη γεωργική γη.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

S46 Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλείτε εμετό
 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή
 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή.
 Αντίδοτο: Δεν υπάρχει αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 2107793777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Πεδίο Εφαρμογής	Ημέρες
Τεύτλα	90

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο **Παράρτημα III** της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού 1107/2009 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ