



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 21 - 12 - 2010
Αριθ. πρωτ: 192278

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090

Προς: Greenfarm Χημικά Α.Ε.
Παπαδά 2 και Μεσογείων
115 25, Αθήνα

Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87 161
e-mail: svg036@minagric.gr

(με απόδειξη)

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση οριστικής έγκρισης
διάθεσης στην αγορά στο
φυτοπροστατευτικό προϊόν
(εντομοκτόνο) DELTASIX 2,5 EC
”

- Κοιν.:
1. Γραφείο Υπουργού
κου. Κ. Σκανδαλίδη
 2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
κ. Ι. Κουτσούκο
 3. Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις
Δ/νσεις Γεωργίας (με e-mail)
Έδρες τους
 4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά
 5. *Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.*
Έδρες τους
 6. ΕΣΥΦ
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα
 7. Εσωτερική διανομή:
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της
Δ/σής μας
-Γραμματεία της Δ/σής μας
 8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων
Λιδότου 26, Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως έχει συμπληρωθεί και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. (1) και το Παράρτημα VI αυτού.
2. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Απόφαση του Υπ. Γεωργίας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», όπως ισχύει σήμερα και τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.
3. Την Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθ. 119119/19-7-2004 (ΦΕΚ 1177/Β/2-8-2004) για την «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 115/1997, Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Α' 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2003/82/ΕΚ της Επιτροπής».
4. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
5. Τη με αριθ. 101383/27-5-2003 (ΦΕΚ 736/Β/10-6-2003) Κοινή Απόφαση των Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία καταχωρήθηκε στο Παρ/μα Ι του ΠΔ 115/1997 η δραστική ουσία deltamethrin.
6. Τη γνωμοδότηση του **Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ** για το **4^ο** θέμα της **6^{ης}/1-11-2010** Συνεδρίασής του.
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/7.9.2010 (ΦΕΚ 154/Α' /7-9-2010) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Τη με αριθ. 271752/21.10.2010 (Β' 1673) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ελένη – Μαρία Αποστολάκη και Ιωάννη Κουτσούκο».
9. Την από 13-2-2007 αίτηση της εταιρείας **Greenfarm Χημικά Α.Ε.**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το ΠΔ 115/97, άρθρο 4 παρ.(1), στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **DELTASIX 2,5 EC** της εταιρείας **Greenfarm Χημικά Α.Ε.** με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

14355

21-12-2010

31-10-2013

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

DELTASIX

1.2.β Μορφή:

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

1.3 Δραστική ουσία

α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Deltamethrin
(ομάδα πυρεθρινοειδών)

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

98,5% (β/β) min

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

Bayer CropScience AG
Alfred-Nobel-Straße 50
D-40789 Monheim am Rhein
Germany

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: BILAG Industries, PVT Ltd Ινδίας

(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας)

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας deltamethrin προσδιορίζονται στο Τμήμα J της αίτησης με ημερομηνία 30/10/2006 (Αρ. Πρ. ΥΓ 122837) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης

Greenfarm Χημικά Α.Ε.
Παπαδά 2 και Μεσογείων,
115 25, Αθήνα
Τηλ: 210 69 90 932
Fax: 210 69 90 862
e-mail: info@gr.nufarm.com

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης)

Ο κάτοχος της έγκρισης

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Bayer Cropscience SA, France

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

1) Bayer CropScience France,

2) Bayer CropScience S.r.l. Italy

(οι Δ/νσεις των εργοστασίων είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας)

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
ALAPIS ABEE, Ύπατο Θηβών

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: deltamethrin 2,5% β/β
 Βοηθητικές ουσίες: 97,15 % β/β
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στο Τμήμα J της αίτησης με ημερομηνία 30/10/2006 (Αρ. Πρ. ΥΓ 122837), αναγράφεται στο Part C της έκθεσης αξιολόγησης και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

2 Συσσκευασίες

2.2 Συσσκευασίες: 5 (πέντε)

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	100 κ.εκ., 250 κ.εκ, 500 κ.εκ 1 λίτρο, 3 λίτρα	HDPE/PA COEX

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες..

Τρόπος εφαρμογής : Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό και βάλτε τον αναδευτήρα σε λειτουργία. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του

φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος να γίνεται σε υψικαμίνους που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του.

Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα με κατάλληλο μηχανισμό (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την

τρόπος δράσης:	αντιμετώπιση μυζητικών και μασητικών εντόμων. Το deltamethrin δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων και συγκεκριμένα στις διαύλους των ιόντων Na στις προσυναπτικές μεμβράνες των νευρικών κυττάρων.
----------------	---

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχοι	Δόσεις			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής/ μεσοδιαστήματα επεμβάσεων (ημέρες)	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		Κ.εκ. Σκευάσματα / 100 λίτρα ψεκ. Υγρό	Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα / στρέμμα)	Κ.εκ. σκευάσματα / στρέμμα		
Εσπεριδοειδή -Πορτοκαλιά -Λεμονιά -Μανταρινιά -Γκρέιπ-φρούτ -Νερατζιά	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i>)	30-50	100	(30-50)	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	1
	Λεκάνιο (<i>Saissetia oleae</i>), Μύγα της Μεσογείου (<i>Ceratitis capitata</i>)	50	100	(50)		
Ακρόδρυα -Αμυγδαλιά -Φιστικιά -Φουντουκιά -Καρυδιά -Καστανιά	Αφίδες (<i>Hyalopterus</i> spp.), Καρπόκαψα καρυδιάς (<i>Laspeyresia pomonella</i>), Καρπόκαψα καστανιάς (<i>Laspeyresia splendana</i>)	30 50	140 100	(42-50)	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών	2
	Ευρύτομο (<i>Eurytoma plotnicovi</i>)	50	100			
	Καρπόκαψα της μηλιάς (<i>Laspeyresia pomonella</i>), Αφίδες (<i>Aphis pomi</i> , <i>Dysaphis plantaginea</i>), Ψύλλα μηλιάς (<i>Psylla mali</i>)	30-50 *	100-140	(30-50)	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών	
Φυλλοδέτες (<i>Adoxophyes orana</i> , <i>Archips rosanus</i>)	35		(35-50)			
Ψύλλα αχλαδιάς (<i>Psylla pyri</i>)	50	100	(50)			

Πυρηνόκαρπα -Ροδακινιά -Νεκταρινιά -Βερικοκιά -Δαμασκηνιά -Κερασιά -Βυσσινιά	Φυλλοδέτες (<i>Adoxophyes orana</i> , <i>Archips rosanus</i>), Ανάρσια (<i>Anarsia lineatella</i>)	35	100-140	(35-49)	ΑΔΑ: 4Α9ΑΒ-Φ Τεκμήριος με την εμφάνιση των προσβολών	
	Ραγολέτιδα (<i>Rhagoletis cerasi</i>)	40-50		(40-70)		
	Μύγα της μεσογείου (<i>Ceratitis capitata</i>)	50		(50-70)		

	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> , <i>Myzus cerasi</i> , <i>Hyalopterus pruni</i>), Καρπόκαψα της Δαμασκηλιάς (<i>Laspeyresia funebrana</i>)	30-50		(30-70)		
Αμπέλι **	Ευδεμίδα (<i>Lobesia botrana</i>)	50 (1η γενεά) 50-70 (2η και 3 ^η γενεά)	100	(50-70)	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών	3
	Κοχλίδα (<i>Clysia ambiguella</i>)	50-70		(50-70)		
	Τζιτζικάκια (<i>Empoasca</i> spp.)	50		(50)		
Φράουλα (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου)	Αφίδες (<i>Aphis</i> spp.)	50	50-100	(25-50)	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών	3
Ελιά	Δάκος (<i>Bactrocera oleae</i>)	50	100-140	(50-70)	Σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες Με την εμφάνιση των προσβολών	1
	Λεκάνιο (<i>Saissetia oleae</i>)	50		(50-70)		
	Βαμβακάδα (<i>Euphyllura</i> spp.)	30-50		(30-70)		
	Πυρηνοτρήτης (<i>Prays oleae</i>)	30 (ανθοβ.) 50 (καρποβ.)		(30-70)	Στην έναρξη της άνθησης (ανθόβια γενεά) και αμέσως μετά την καρπόδεση (καρπόβια γενεά) μεταξύ ωοθεσίας και εκκόλαψης των ωών και σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις φερομονικές παγίδες	
Κρεμμύδι, Πράσο, Σκόρδο	Θρίπας (<i>Thrips tabaci</i>) Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> spp.)	-	40-50	30-50	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών	3

Σολανώδη -Τομάτα -Πιπεριά -Μελιτζάνα (Υπαίθρου) Πιπεριά (Θερμοκηπίου)	Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i>), Σποντόπτερα (<i>Spodoptera</i> spp.), Δορυφόρος (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Anuraphis cardui</i> , <i>Hyperomyzus lactucae</i>)	50	60-100 (Υ) 60-140 (Θ)	(30-50) (Υ) (30-70) (Θ)	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών	Υπαίθρου: 3 Θερμοκηπίου: 4
	Βρωμούσα (<i>Nezara viridula</i>)	30	60-100 (Υ) 60-140 (Θ)	(18-30) (Υ) (18-42) (Θ)		
	Αλευρώδης (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	70 (Θ)	60-100 (Θ)	(42-70) (Θ)		
	Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> spp.)	-	60-100 (Υ)	30-50 (Υ)		
Σολανώδη -Τομάτα -Μελιτζάνα (Θερμοκηπίου)	Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i>), Σποντόπτερα (<i>Spodoptera</i> spp.), Δορυφόρος (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Anuraphis cardui</i> , <i>Hyperomyzus lactucae</i>)	50	60-100 (Θ)	(30-50) (Θ)	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών	4
	Βρωμούσα (<i>Nezara viridula</i>)	30	60-140 (Θ)	(18-42) (Θ)		
Κολοκυνθοειδή -Αγγούρι -Αγγουράκι -Κολοκύθι -Πεπόνι -Καρπούζι (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου)	Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i>), Σποντόπτερα (<i>Spodoptera</i> spp.), Αφίδες (<i>Aphis</i> spp., <i>Hyperomyzus lactucae</i>)	50	60-100 (Υ) 60-140 (Θ)	(30-50) (Υ) (30-70) (Θ)	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών	3
	Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> spp.)	-	60-100 (Υ)	30-50 (Υ)		

Λάχανο (εκτός από το κινέζικο) Κουνουπίδι, Μπρόκολο	Πιερίδα (<i>Pieris</i> spp.), Μαμέστρα (<i>Mamestra brassicae</i>), Πλούζια (<i>Plusia gamma</i>), Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i>), Σποντόπτερα (<i>Spodoptera littoralis</i>), Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> , <i>Brevicoryne brassicae</i>), Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> spp.)	-	50	30-50	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών	2
	Πλουτέλλα (<i>Plutella xylostella</i>)	-	50	50		
Μαρούλι (Υπαίθρου)	Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i>), Σποντόπτερα (<i>Spodoptera exigua</i>), Άλτης (<i>Chrysodeixis chalcites</i>), Αφίδες (<i>Hyperomyzus lactucae</i> , <i>Aphis</i> spp., <i>Nasonovia ribis-nigri</i>)	50	50-100	(25-50)	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών.	3
	Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> spp.)	-		30-50		
Σπανάκι	Αφίδες (<i>Aphis</i> spp.), Σποντόπτερα (<i>Spodoptera exigua</i>), Μαμέστρα (<i>Mamestra spp.</i>), Άλτης (<i>Chrysodeixis chalcites</i>)	50	70	(35)	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών	2
	Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> spp.)	-				
Μαϊντανός, Σέλινο, Ρόκα, Αντίδι	Αφίδες (<i>Aphis</i> spp.), Σποντόπτερα (<i>Spodoptera exigua</i>), Μαμέστρα (<i>Mamestra spp.</i>), Άλτης (<i>Chrysodeixis chalcites</i>)	50	70	(35)	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών	2
	Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> spp.)	-		30-50		

Ψυχανθή -Φασόλια, -Κουκιά, -Φακή, -Ρεβίθια	Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i>), Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis</i> spp.) Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> spp.)	-	50-100	30-50	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών.	2
Μπιζέλια	Αφίδα των μπιζελιών (<i>Acyrtosiphon pisum</i> , Σιτόνα (<i>Sitona</i> spp.)	-	100	25	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών	2
	Αφίδα των κουκιών (<i>Aphis fabae</i>), Κάμπια των μπιζελιών (<i>Laspeyresia nigricana</i>), Θρίπας (<i>Thrips angusticeps</i>), Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> spp.)	-		30-50		
Αγκινάρα	Κασσιδά (<i>Cassida</i> spp.)	-	100	50	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών.	3
	Προντένια (<i>Spodoptera litura</i>), Αφίδες (<i>Anuraphis cardui</i> , <i>Myzus persicae</i>)	-		30-50		
Πατάτα	Δορυφόρος (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	-	60	50	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών	3
	Σποντόπτερα (<i>Spodoptera littoralis</i>)	-		30-50		
Βαμβάκι	Ρόδινο σκουλήκι (<i>Pectinophora gossypiella</i>), Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i>)	-	30-50	50-70	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών.	2
	Αλευρώδης (<i>Bemisia tabaci</i>), Τζιτζικάκια (<i>Empoasca</i> spp.)	-		50		
	Σποντόπτερα (<i>Spodoptera</i> spp.) Αφίδα (<i>Aphis gossypii</i>), Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> spp.)	-		30-50		
Καπνός	Θρίπας (<i>Thrips tabaci</i>), Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> spp.)	-	50-100	30-50	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών	3

Ζαχαρότευτλα, Σέσκουλο, Παντζάρι	Αφίδες (<i>Aphis fabae</i> , <i>Myzus persicae</i>), Μύγα των τεύτλων (<i>Pegomya</i> spp.), Άλτης (<i>Chaetocnema tibialis</i>), Σποντόπτερα (<i>Spodoptera</i> spp.), Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> spp.)	-	50	30-50	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	1
	Κασσίδα (<i>Cassida nebulosa</i>)			50		
Αραβόσιτος***	Πυραλίδα (<i>Ostrinia nubilalis</i>), Σεζάμια (<i>Sesamia nonagrioides</i>), Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i>), Σποντόπτερα (<i>Spodoptera</i> spp.), Αφίδες (<i>Rhopalosiphum padi</i> , <i>Sitobion avenae</i>), Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> spp.)	-	60	30-50	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 -21 ημερών	3
	<i>Diabrotica virgifera</i>	-		50	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7- 14 -ημερών	
Σιτηρά (Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη)	Αφίδες (<i>Rhopalosiphum padi</i> , <i>Sitobion avenae</i>), Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> spp.)	-	40-60	30-50	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	1

Μηδική	Αφίδα των μπιζελιών (<i>Acyrtosiphon pisum</i>), Σκαθάρι των μπιζελιών (<i>Apion pisi</i>), Φυτονόμος (<i>Hypera postica</i>)	-	40	25	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών	2
Καλλωπιστικά (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου)	Αφίδες (<i>Myzus</i> spp.), Θρίπες (<i>Thrips tabaci</i>)	50	50-100	(25-50)	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών.	3
	Φυλλοδέτες (<i>Archips</i> spp., <i>Adoxophyes</i> spp., <i>Pandemis</i> spp.)	35		(17,5-35)		
	Αλευρώδης (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	70	70	(50)		

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- * **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Στα μηλοειδή η δόση των 50κ.εκ. σκευάσματος /hl πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα με τον μικρό όγκο ψεκαστικού υγρού (100 lt/στρεμμα) έτσι ώστε η τελική δόση να μην ξεπερνάει τα 50κ.εκ. σκευάσματος στο στρέμμα. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει υπέρβαση του Μέγιστου Επιτρεπόμενου Ορίου Υπολειμμάτων.
- ** Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση με το φυτοπροστατευτικό προϊόν.
- *** Η εφαρμογή του Decis 2,5 EC στο καλαμπόκι οδηγεί στη μείωση των επιπέδων των μυκοτοξινών, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς αντιμετώπισης των εντόμων *Ostrinia* spp. και *Sesamia* spp. στην περίπτωση που η προσβολή αυτή υπάρχει

6

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Διαχείριση ανθεκτικότητας

- Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο
- Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς
- Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό
- Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με **DELTASIX**. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης
- Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/στόχων με τη γρήγορη μέθοδο της αντικειμενοφόρου πλάκας, **ειδικό σύστημα μικροδοκιμής**, έτσι ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας
- Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
 - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

- 9** Σήμανση σκευάσματος:

Xn- Επιβλαβές
N – Επικίνδυνο για το περιβάλλον.

- 10** Φράσεις R

R 10: Εύφλεκτο
R 20/22: Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως
R 37/38: Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα
R 41: Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών
R 50/53: Πολύ τοξικό για υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον
R 65: Επιβλαβές, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης

S 1/2 – Φυλάξτε το κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

S13 - Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S20/21 - Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε

S 26: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή

S 37/39: Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου

S60 «Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα»

S61 «Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον.

.

SP1 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του

Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμένουν στις κυψέλες τους για μια μέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες σε απόσταση τουλάχιστον 3 χιλιομέτρων

SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μian ανέκαστη ζώνη προστασίας **30 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα για τις δενδρώδεις καλλιέργειες και την ελιά **20 μέτρων** για την καλλιέργεια αμπελιού και **10 μέτρων** για τα λαχανικά και τις λοιπές καλλιέργειες στον αγρό .

SPe3 Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μian ανέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** από την μη γεωργική γη.

Spe8 Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Απομακρύνετε τα λερωμένα ρούχα αμέσως και απορρίψτε τα ασφαλώς.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ξαπλωμένο. Εάν τα συμπτώματα διαρκούν καλέστε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα που ήρθαν σε επαφή με το ψεκαστικό διάλυμα. Πλυθείτε αμέσως με σαπούνι και πολύ νερό. Μετά από επαφή με το δέρμα απλώστε κρέμα βιταμίνης E ή απλό γαλάκτωμα. Αν διαρκούν τα συμπτώματα ή υπάρχει κάποια αμφιβολία, συμβουλευτείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύντε τα αμέσως πολύ καλά με άφθονο και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλείτε εμετό. Ξεπλύντε το στόμα με νερό. Κρατήστε σε ηρεμία. Καλέστε αμέσως γιατρό.

Πληροφορίες για το γιατρό :

Θεραπευτικά μέτρα :

Επιτόπιος χειρισμός: συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία. Μετά από επαφή με τα μάτια ενστάλαξη τοπικά αναισθητικών σταγόνων π.χ. 1% Amethocaine Hydrochloride. Χορηγήστε αναλγητικά εάν χρειαστεί.

Δεν υπάρχει αντίδοτο.

Αντιμετώπιση σπασμών: Χορηγήστε diazepam: για ενήλικες 5-10 mg ενδοφλεβίως όσο χρειάζεται ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η ηρεμία· για παιδιά 2,5 mg ενδοφλεβίως

Αντενδείξεις: ατροπίνη και παράγωγα αδρεναλίνης.

ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 2107793777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα Όρια
Υπολειμμάτων
(MRLs)
Deltamethrin

Φυτικά προϊόντα	Προσωρινά σε mg/kg
Έχουν οριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά υπολείμματα οριστεί με τον κανονισμό 396/2005	

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Βαμβάκι, Ζαχαρότευτλα, Σέσκουλο, Παντζάρι Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ-φρουτ, Νερατζιά, Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά, Αραβόσιτος	30
Μηδική	14
Αμπέλι, Ελιά, Πατάτα, Κρεμμύδι, Πράσο, Σκόρδο, Λάχανο, Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Φασόλια, Κουκιά, Φακή, Ρεβίθια, Μπιζέλια, , Καπνός, Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά, Κερασιά, Βυσσινιά	7
Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Μαρούλι, , Φράουλα, Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι, Μαϊντανός, Σέλινο, Ρόκα, Αντίδι, Αγκινάρες, Σπανάκι	3

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται σε χώρο δροσερό και καλά αεριζόμενο, στην αρχική του κλειστή συσκευασία.

15 Προστατευόμενα στοιχεία και μελέτες

Στο Παράρτημα I (Annex I) του registration report καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα έγκριση κυκλοφορίας. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

16 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

Β Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ

Ι. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ

Δ – 7 (GAP)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Γεωργικό (ά) Φάρμακο (ά) (κοινή ονομασία)

deltamethrin 2,5 %

Σελίδες :

EEC No (α)

:

Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ

Εμπορικό (ά) όνομα (τα)

Deeltasix 2,5 EC

Κύρια χρήση π.χ. εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο

Εντομοκτόνο

1	2	3	4	5	6			7			8	9	
Καλλιέργεια Και/ή Συνθήκες χρήσης	Α, Θ ή Κ	Εχθρός, ομάδα εχθρών ή ασθενειών ή ζιζανίων που ελέγχονται	Σκεύασμα		Εφαρμογή			Δοσολογία ανά επέμβαση			Τελευ ταία επέμβα ση πριν τη συγκομ ιδή (ημέρες)	Παρατηρήσ εις	
			Μορ φή	Περιεκτι κότητα σε δ.ο.	Μέθοδ ος/τρόπ ος	Στάδιο ανάπτυξης και εποχή	Αριθμός εφαρμογ ών ελάχ.- μέγιστ.	Μεσοδι άστημα μεταξύ εφαρμο γών (ελάχ.)	g δ.ο. / 100 λίτρα	Όγκο ς ψεκα στικο ύ υγρού l/ εκτάρ ιο			g δ.ο. / εκτάρ ιο
(α)	(β)	(γ)	(δ-στ)	(θ)	(στ-η)	(ι)	(κ)				(λ)	(μ)	
Εσπεριδοειδή -Πορτοκαλιά -Λεμονιά -Μανταρινιά -Γκρέιπ-φρούτ -Νερατζιά	Α	<i>Myzus persicae</i>	EC	25g/L	Ψεκασ μός φυλλώ ματος	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	1	-	0,75-1,25	1000	(7,5- 12,5)	30	
		1,25							(12,5)				

ΑΔΑ: 4Α9ΑΒ-Φ

Ακρόδρυα -Αμυγδαλιά -Φιστικιά -Φουντουκιά -Καρυδιά- Καστανιά	Α	<i>Hyalopterus spp.</i> ,	EC	25g/L	Ψεκασμός φυλλώματος	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	2	14	0,75	1400	(10,5-12,5)	30		
		<i>Cydia pomonella, Laspayresia splendana</i>							1,25	1000				
		<i>Eurytoma spp</i>							1,25	1000				12,5
Μηλοειδή -Μηλιά -Αχλαδιά -Κυδωνιά -Μουσμουλιά	Α	<i>Laspeyresia pomonella)</i> <i>Aphis pomi,</i> <i>Dysaphis plantaginea</i> <i>Psylla mali</i>	EC	25g/L	Ψεκασμός φυλλώματος	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	2	14	0,75-1,25	1000-1400	(7,5-1,75)	7	Max 1,25 gr δρ.ου /ha	
		<i>Adoxophyes orana,</i> <i>Archips rosanus.</i>							0,875		12,25-17,5)			
		<i>Psylla pyri</i>							1,25		1000			1,25
Πυρηνόκαρπα -Ροδακινιά -Νεκταρινιά -Βερικοκιά -Δαμασκηνιά -Κερασιά -Βυσσινιά	Α	<i>Adoxophyes orana,</i> <i>Archips rosana,</i> <i>Anarsia lineatella</i>	EC	25g/L	Ψεκασμός φυλλώματος	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	1	14	0,875	1000-1400	(8,75-12,25)	7		
		<i>Ceratitis capitata</i>							1,25		1000-1400			(12,5-17,5)
		<i>Rhagoletis cerasi</i>							1-1,25		1000-1400			(10-17,5)

ΑΔΑ: 4Α9ΑΒ-Φ

		<i>Myzus persicae</i> , <i>Myzus cerasi</i> , <i>Hyalopterus pruni</i> , <i>Laspeyresia</i> <i>funebrana</i>							0,75-1,25	1000-1400	(7,5-17,5)		
Αμπέλι	Α	<i>Lobesia botrana</i>	EC	25g/L	Ψεκασμός φυλλώματος	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	2-3	14	1,25 (1 ^η γενιά), 1,25-1,75 (2 ^η και 3 ^η γενιά)	1000	(12,5-17,5)	7	
		3					1,25-1,75		(12,5-17,5)				
							1,25		(12,5)				
Φράουλα	A+ Θ	<i>Aphids spp</i>	EC	25g/L	Ψεκασμός φυλλώματος	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	3	14	1,25	500-1000	(6,25-12,5)	3	
Ελιά	Α	<i>Bactrocera (Dacus) oleae</i>	EC	25g/L	Ψεκασμός φυλλώματος	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	1	14	1,25	1000-1400	(12,5-17,5)	7	
									0,75 (ανθόβια γενιά) 1,25 (καρπόβια γενιά)		(12,5-17,5)		
									1,25 ή 1 + 0,5% έλαιο		(10-17,5)		
									0,75-1,25		(7,5-17,5)		
		<i>Prays oleellus</i>											
		<i>Saissetia oleae</i>											
		<i>Euphyllura spp.</i>											

ΑΔΑ: 4Α9ΑΒ-Φ

Κρεμμύδι, Πράσο, Σκόρδο	A	<i>Thrips tabaci</i> , <i>Agrotis sp.</i>	EC	25g/L	Ψεκασ μός φυλλώ ματος	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	3	14	-	400- 500	(7,5- 12,5)	7	
Σολανώδη -Τομάτα --Μελιτζάνα (Υπαίθρου) Πιπεριά (Υπαίθρου και θερμοκηπίου)	A	<i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Spodoptera spp.</i> , <i>Leptinotarsa decemlineata</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Anuraphis cardui</i> , <i>Hyperomyzus lactucae</i> ,	EC	25g/L	Ψεκασ μός φυλλώ ματος	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	3	7	1,25	600- 1000	(7,5- 12,5)	3	
	Θ	<i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Spodoptera spp.</i> , <i>Leptinotarsa decemlineata</i> , , <i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Anuraphis cardui</i> , <i>Hyperomyzus lactucae</i> ,					4		1,25	600- 1400	(7,5- 17,5)		
	A	<i>Nezara viridula</i>					3		0,75	600- 1000	(4,5- 7,5)		
	Θ	<i>Nezara viridula</i>					4		0,75	600- 1400	(4,5- 10,5)		

ΑΔΑ: 4Α9ΑΒ-Φ

	Θ	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>					4		1,75	600-1000	(10,5-17,5)		
	A	<i>Agrotis sp.</i>					3		-	600-1000	07,5-12,5		
Σολανώδη -Τομάτα -Μελιτζάνα (ιΘερμοκηπίο υ)	Θ	<i>Helicoverpa armigera, Spodoptera spp., Leptinotarsa decemlineata, Myzus persicae, Aphis gossypii, Anuraphis cardui, Hyperomyzus lactucae,</i>	EC	25g/L	Ψεκασμός φυλλώματος	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	4	7	1,25	600-1400	(7,5-12,5)	3	
	Θ	<i>Nezara viridula</i>							0,75	600-1400	(4,5-10,5)		
Κολοκυνθοειδ ή -Αγγούρι -Αγγουράκι -Κολοκύθι -Πεπόνι	A	<i>Helicoverpa armigera, Spodoptera sp., Aphis gossypii, Aphis sp., Hyperomyzus lactucae</i>	EC	25g/L	Ψεκασμός φυλλώματος	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	3	7	1,25	600-1000	7,5-12,5	3	

ΑΔΑ: 4Α9ΑΒ-Φ

-Καρπούζι (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου)	Θ	<i>Helicoverpa armigera, Spodoptera sp., Aphis gossypii, Aphis sp., Hyperomyzus lactucae</i>							1,25	600-1400	7,5-17,5		
	A	<i>Agrotis sp.</i>							-	600-1000	7,5-12,5		
Λάχανο,(εκτός από το Κινέζικο) Κουνουπίδι, Μπρόκολο	A	<i>Pieris spp, Mamestra brassicae Plusia gamma Helicoverpa armigera Spodoptera littoralis, Myzus persicae, Brevicoryne brassicae Agrotis spp</i>	EC	25g/L	Ψεκασμός φυλλώματος	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	2	14	-	500	7,5-12,5	7	
		<i>Plutella xylostella,</i>							-		12,5		
Μαρούλι	A	<i>Helicoverpa armigera, Spodoptera exiqua, Chrysodeixis chalcites, Nasonovia ribis-nigri, Hyperomyzus lactucae, Aphis sp.</i>	EC	25g/L	Ψεκασμός φυλλώματος	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	3	7	1.25	500-1000	6,25-12,5	3	
	A	<i>Agrotis spp</i>	EC	25g/L	Ψεκασμός φυλλώματος	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών			-		7,5-12,5		

ΑΔΑ: 4Α9ΑΒ-Φ

Σπανάκι	Α	<i>Aphis sp., Spodoptera exigua, Mamestra sp., Chrysodeixis chalcites</i>	EC	25g/L	Ψεκασμός φυλλώματος	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	2	14	1,25	700	8,75	2	
		<i>Agrotis sp.</i>							-				
Μαϊντανός, Σέλινο, Ρόκα, Αντίδι,	Α	<i>Aphis sp., Spodoptera exigua, Mamestra sp., Chrysodeixis chalcites</i>	EC	25g/L	Ψεκασμός φυλλώματος	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	2	14	1,25	700	8,75	2	
		<i>Agrotis sp.</i>							-		7,5-12,5		
Φασόλι, Κουκιά, Ρεβίθια, Φακή	Α	<i>Helicoverpa armigera Myzus persicae Aphis spp. Agrotis spp.</i>	EC	25g/L	Ψεκασμός φυλλώματος	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	2	14	-	500-1000	7,5-12,5	7	
Μπιζέλι	Α	<i>Acyrtosiphon pisums Sitona spp.,</i>	EC	25g/L	Ψεκασμός φυλλώματος	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	2	14	-	1000	6,25	7	
		<i>Aphis fabae Laspeyresia nigricana, Thrips angusticeps, Agrotis spp</i>							-				

ΑΔΑ: 4Α9ΑΒ-Φ

Αγγινάρες	Α	<i>Cassida spp.</i>	EC	25g/L	Ψεκασμός φυλλώματος	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	3	7	-	1000	12,5	3	
		, <i>Anuraphis cardui</i> , <i>Myzus persicae</i> , , <i>Spodoptera litura</i>							-	1000	7,5-12,5		
Πατάτα	Α	<i>Leptinotarsa decemlineata</i> , <i>Liriomyza huidobrensis</i>	EC	25g/L	Ψεκασμός φυλλώματος	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	3	14	-	60	1,25	7	
		<i>Spodoptera litoralis</i>	EC	25g/L	Ψεκασμός φυλλώματος	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	3	14	-	60	1-1,25	7	
Βαμβάκι	Α	<i>Pectinophora gossypiella</i> , <i>Helicoverpa armigera</i>	EC	25g/L	Ψεκασμός φυλλώματος	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	2	14	-	300-500	12,5-17,5	30	
		<i>Spodoptera spp.</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Agrotis spp.</i> ,									7,5-12,5		
		<i>B. emisia tabaci</i> , <i>Empoasca spp.</i>									12,5		
Καπνός	Α	<i>Thrips tabaci</i> , <i>Agrotis spp.</i>	EC	25g/L	Ψεκασμός φυλλώματος	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	3	7	-	500-1000	7,5-12,5	7	

ΑΔΑ: 4Α9ΑΒ-Φ

Ζαχαρότευτλα Σέσκουλο, Παντζάρι	Α	<i>Aphis fabae,</i> <i>Myzus persicae,</i> <i>Pegomya sp.,</i> <i>Chaetochema tibialis</i> <i>Spodoptera spp.</i> <i>Agrotis spp.</i>	EC	25g/L	Ψεκασ μός φυλλώ ματος	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	1	-	-	500	7,5- 12,5	30	-
		<i>Cassida nebulosa,</i>									12,5		
Αραβόσιτος	Α	<i>Ostrinia nubilalis,</i> <i>Sesamia nonagriodes</i> <i>Helicoverpa</i> <i>armigera,</i> <i>Spodoptera spp</i> <i>Agrotis spp.</i> <i>Rhopalosiphum padi</i> <i>Sitobion avena</i>	EC	25g/L	Ψεκασ μός φυλλώ ματος	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	1-3	14-21	-	600	7,5- 12,5	30	
		<i>Diabrotica virgifera</i>						7-14	-		12,5		
Σιτηρά (Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη)	Α	<i>Rhopalosiphum padi,</i> <i>Sitobion avenae,</i> <i>Agrotis spp.</i>	EC	25g/L	Ψεκασ μός φυλλώ ματος		1	-	-	400- 600	7,5- 12,5	30	
Μηδική	Α	<i>Acyrtosiphon pisum</i> <i>Apion pisi, Hypera</i> <i>postica</i>	EC	25g/L	Ψεκασ μός φυλλώ ματος	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	2	14	-	40	6,25	14	

ΑΔΑ: 4Α9ΑΒ-Φ

Καλλωπιστικά	Α/θ	<i>Myzus spp., Thrips tabaci</i>	EC	25g/L	Ψεκασμός φυλλώματος	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	3	7	1,25	500-1000	6,25-12,5	--	
		<i>Archips spp., Adoxophyes spp., Pandemis spp.)</i>							0,875		6,125-12,25		
		<i>Trialeurodes vaporariorum</i>							1,75		8,75		

Παρατηρήσεις: (α) Για τις καλλιέργειες, η ταξινόμηση της ΕΕ και του Codex (και τα δύο)

θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Όπου βρίσκει εφαρμογή, οι συνθήκες χρήσης θα πρέπει να περιγράφονται (π.χ. καπνισμός των κατασκευών).

(β) Ανοιχτού αγρού (Α), εφαρμογές σε θερμοκήπια (Θ), ή σε κλειστούς χώρους (Κ).

(γ) πχ. Μασητικά και μυζητικά έντομα, έτομα εδάφους, έντομα φυλλώματος, ζιζάνια Stages of Prants, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), περιλαμβάνοντας όπου

(δ) πχ. Βρέξιμη σκόνη (WP), γαλακτωματοποιήσιμο συμπύκνωμα (EC) βρίσκει εφαρμογή, πληροφορίες σχετικά με την εποχή κατά τον χρόνο εφαρμογής

(ε) GCPF Κώδικες – GIFAP Technical Monograph No 2, 1989.

(στ) όλες οι χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες θα πρέπει να εξηγούνται

(ζ) Μέθοδος πχ. Ψεκασμός υψηλού όγκου, σκονισμός.

(η) Τρόπος. Πχ σ' όλη την επιφάνεια, από αέρος, στις γραμμές, ατομικά φυτά

– ο τύπος του ψεκαστικού μηχανήματος θα πρέπει να προσδιορίζεται

(θ) g/kg ή g/lt

(ι) Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία εφαρμογή (BBCH Monograph, Growth

(κ) Ο ελάχιστος και ο μέγιστος δυνατός αριθμός εφαρμογών υπό πρακτικές συνθήκες

(λ) Ελάχιστο χρονικό μεσοδιάστημα πριν τη συγκομιδή

(μ) Οι παρατηρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: οικονομική σημασία / περιορισμούς στη χρήση