



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 08-02-2006

Αριθ. πρωτ.: 116007

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 72 11

ΠΡΟΣ: ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ Α.Β.Ε.Ε.
Τ.Θ. 26, ΤΚ 57022, ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος
(με απόδειξη)
ΚΟΙΝ.: 1) Μ.Φ.Ι.
Τμήμα Ελέγχου Γεωργ. Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 – Κηφισιά
2) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους
3) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
α) Διευθύνσεις Γεωργίας
Έδρες τους με email
β) Διευθύνσεις Εμπορίου
Έδρες τους με email
4) Τμήματα Β', Γ', Ε' της Δ/νσής μας
5) Γραμματεία της Διεύθυνσής μας

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση οριστικής
έγκρισης στο φυτο-
προστατευτικό προϊόν
(εντομοκτόνο)
FENOXYCARB FARMA-CHEM 25 WP ”

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/97 (ΦΕΚ Α'/104/30.5.97) «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 8 (παρ. 2 και 3).
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ Β'/674/13.9.88) Απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το κεφάλαιο Β' (παρ. 1).
3. Τη με αριθ. 83345/28.7.88 (ΦΕΚ Β'/599/24.8.88) Απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», όπως ισχύει σήμερα και τη με αριθ. 265/3.9.02 (ΦΕΚ Β'/1214/19.9.02) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.
4. Τη με αριθ. 93267/12.2.03 Απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 1971 οριστική έγκριση στο όμοιας σύνθεσης φυτοπροστατευτικό προϊόν TSESTAK 25 WP.
5. Το με αριθ. 123951/14.6.2005 έγγραφό μας, στο οποίο αναφέρονται τα εθνικά ανώτατα όρια υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας fenoxycarb.
6. Τη αριθμ. Υ132/11.10.2004 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό» (1533 ΤΒ/14.10.2004).

7. Τη αριθμ. 301509/19.11.2004 Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της εξουσίας να υπογράψουν “με εντολή Υφυπουργού” (1762 ΤΒ/30.11.2004)».
8. Τις από 28-5-2004 και 16-11-2005 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας καθώς και το από 16-11-2005 πρωτόκολλο εξέτασης φακέλου.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **14118** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **(Εμπορικό) όνομα:** FENOXYCARB
 2. **Μορφή:** Βρέξιμη σκόνη (WP)
 3. **Εγγυημένη σύνθεση:** fenoxycarb 25% β/β
βοηθητικές ουσίες: 73,4% β/β
 4. **Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:** 94% min.
 5. **α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** SINOCHEM NINGBO LTD, Κίνα.
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: SINOCHEM NINGBO LTD, Κίνα (Η Διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας fenoxycarb, όπως προσδιορίζονται στο τμήμα ζ (έντυπα IV_α, IV_β και V) της αίτησης, με ημερομηνία 28-5-2004 (αριθ. πρωτ. ΥΑΑ&Τ 104642) και παραμένουν στα αρχεία της αρμόδιας αρχής..
 6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ , Τ.Θ. 26 , 570 22-ΣΙΝΔΟΣ.
β. Σημείο επαφής: ---
γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ , Τ.Θ. 26, 570 22-ΣΙΝΔΟΣ.
 7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ , Τ.Θ. 26, 570 22-ΣΙΝΔΟΣ.
 8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ , ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος.
 9. **α. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ , ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος.
β. Συσκευασία: -ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
 - i) Χάρτινα κουτιά με εσωτερικό πολυαιθυλένιο και με εκτυπωμένη ετικέτα
 - ii) Σακίδια από σύνθετο υλικό με εκτυπωμένη ετικέτα.**ΜΕΓΕΘΟΣ:** i) Καθαρό βάρος 200, 250, 300, 400, 500 γραμμαρίων και 1 κιλού
ii) 50 και 100 γραμμαρίων
-ΥΛΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
 - i) Χάρτινο με εσωτερικό στρώμα πολυαιθυλενίου.
 - ii) Σύνθετο υλικό (αλουμίνιο-P/E-Polyester)Τα υλικά συσκευασίας θα είναι τέτοια, ώστε να αποκλείετε το σχίσιμο κατά την μεταφορά.
 - γ. Σύνολο συσκευασιών:** οκτώ (8).
- 9. Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης:**
Καρβαμδικό εντομοκτόνο. Ρυθμιστής αυξήσεως των εντόμων. Δρα δι'επαφής και από στομάχου. Εμποδίζει τη μεταμόρφωση των προνυμφών ή την εκκόλαψη των αυγών (ωοκτόνο και προνυμφοκτόνο δράση). Δεν έχει ακμαιοκτόνο δράση.
- 10. Τρόπος εφαρμογής:**
Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος.

11. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

- Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος κατά τα $\frac{3}{4}$ με νερό.
- Ρίχνουμε χωρίς προδιάλυση την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος.
- Αναδεύουμε καλά και συμπληρώνουμε μέχρι επάνω με νερό.

13. Φάσμα δράσης:

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ			ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
		Γρ. σκ./100 λίτρα ψεκαστικό υγρό	Λίτρα νερού /στρ.	Γραμ. σκευάσματος /στρέμμα	
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Λεμονιά Πορτοκαλιά Μανταρινιά)	Κηροπλάστης (Ceroplastes sp) Λεκάνιο (Saissetia oleae)	20-40	150	30-60	Μία εφαρμογή με ψεκασμό των κινητών μορφών προνυμφών.
ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά)	Φυλλορύκτες (Phyllonorycter corylifoliella, Ph blancardella, Chemiosstoma scitella, Lyonetia sp.)	50	150	75	Με την έναρξη της εναπόθεσης των αυγών, που συνήθως συμπίπτει με το μέγιστο της πτήσης των ακμαίων.
	Φυλλοδέτες	40 (με τουλάχιστον 150 lt ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα)	150	60	Δύο ψεκασμοί εναντίον των προνυμφών του τελευταίου σταδίου.
	Καρπόκαψα (Cydia pomonella)	40	150	60	Με την έναρξη των πρώτων εναποθέσεων.
	Ψύλλα αχλαδιάς (Psylla pygi)	100	150	150	Κατά την άνοιξη μέχρι και τις αρχές του καλοκαιριού που ο πληθυσμός είναι ακόμη χαμηλός και δεν υπάρχει υπέρθεση των γενεών, ιδίως κατά την ένταξη του σε προγράμματα ολοκληρωμένης καταπολέμησης.
	Κοκκοειδή (Quadraspidiotus pernicosus)	150	150	225	Όταν τα 2/3 του πληθυσμού είναι σε κινητά στάδια.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ			ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
		Γρ. σκ./100 λίτρα ψεκαστικό υγρό	Λίτρα νερού /στρ.	Γραμ. σκευάσματος /στρέμμα	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ	Φυλλοδέτες	40 (με τουλάχιστον 150 lt ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα)	150	60	Δύο ψεκασμοί εναντίον των προνυμφών του τελευταίου σταδίου.
	Κοκκοειδή (Quadraspidiotus perniciosus, Pseudalacapsis pentagona)	150	150	225	Όταν τα 2/3 του πληθυσμού είναι σε κινητά στάδια.
ΑΜΠΕΛΙ	Ευδεμίδα (Polychrosis botrana) Κογχυλίδα (Eupoecillia ambiquella)	20-40	150	30-60	Με την έναρξη των πρώτων εναποθέσεων των αυγών.
ΕΛΙΑ	Λεκάνιο (Saissetia oleae)	40	150	60	Όταν το 65% του πληθυσμού είναι σε κινητά στάδια.

Παρατηρήσεις:

1. Οι προαναφερθείσες δόσεις, σε όλες τις καλλιέργειες, αφορούν σε ποσότητα 150 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα. Εάν ανά στρέμμα απαιτηθεί μεγαλύτερη ποσότητα ψεκαστικού υγρού, τότε πρέπει να ρυθμιστούν ανάλογα οι δόσεις ανά 100λίτρο, έτσι ώστε η δόση σκευάσματος ανά στρέμμα να παραμείνει σε 60 γραμ.
2. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:

Εσπεριδοειδή:	1
Μηλοειδή:	2
Ροδακινιά:	2
Αμπέλι	2
Ελιά	1

14. Φυτοτοξικότητα:

Υπάρχει κίνδυνος φυτοτοξικότητας σε καρπούς και φύλλα μερικών ποικιλιών αχλαδιάς. Πριν από ευρεία χρήση σε συγκεκριμένη ποικιλία, να γίνεται δοκιμαστική εφαρμογή και μη γίνεται υπέρβαση των δόσεων.

15. Συνδυαστικότητα:

Ειδικά όταν χρησιμοποιείται στην αχλαδιά, να μην συνδυάζεται με ορυκτέλαια.

16. Σημάνσεις: N – επικίνδυνο για το περιβάλλον.

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις): ----

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO & R φράσεις):

- (RO3) Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες.
Σχετικά μη τοξικό για τα αρπακτικά έντομα και ακάρεα.
- (R50/53) Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

- (S1/2) Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
- (S13) Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- (S20/21) Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά την διάρκεια του ψεκασμού.
- (S22) Μην αναπνέετε τη σκόνη.
- (S25) Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.
- (S26) Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια.
- (S36/37/39) Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών /προσώπου
- (SY8) Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.»

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

- Μεταφέρετε τον παθόντα σε καλά αεριζόμενο χώρο και προστατέψτε τον από την υποθερμία.. Σε περίπτωση υποθερμίας καλέστε αμέσως γιατρό.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα , αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε τα με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε γιατρό.
- Σε περίπτωση κατάποσης και εφόσον ο παθών έχει τις αισθήσεις του , χορηγήστε σε επανάληψη ενεργό άνθρακα με μεγάλη ποσότητα νερού.
Μη δίνετε τίποτα από το στόμα σε άτομα που δεν έχουν τις αισθήσεις τους.
Μην προκαλέσετε εμετό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

- (SO4) Μη ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του
- (S60) Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.
- (S61) Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κουτιά και τα σακίδια συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα εναποτεθούν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):

- A1 -Απαγορεύεται η εφαρμογή του με αεροψεκασμούς.

-Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες καλλιεργητές.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

(Π1)	Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
	Εσπεριδοειδή: 45 ημέρες
	Μηλιά: 20 ημέρες
	Αχλαδιά: 30 ημέρες
	Ροδακινιά: 20 ημέρες
	Αμπέλι: 20 ημέρες
	Ελιά 60 ημέρες

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δυο (2) χρόνια.

II. Ετικέτα:

α) Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/97, την Οδηγία 1999/45 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και με την παρούσα Απόφαση.

β) Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **31-12-2010**.

β. Πριν τη λήξη της έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

E.Y.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

K. ΣΚΙΑΛΑΣ