



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 1 - 3 - 2011
Αριθ. πρωτ: 93751

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Μ. Γάσπαρη
Τηλέφωνο: 210 92 87 250
e-mail: syg108@minagric.gr

Προς: COMPO ΕΛΛΑΣ ΑΕ
(Δια της κας Ε. Λεφάκη
Σωκράτους 12, Καλλιθέα 17671)
(με απόδειξη)

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση οριστικής έγκρισης
διάθεσης στην αγορά στο
φυτοπροστατευτικό προϊόν
(εντομοκτόνο) AXORIS ENDOM
STICKS για ερασιτεχνική χρήση”

Κοιν.: 1 Γραφείο Υπουργού
κ. Κ. Σκανδαλίδη
2 Γραφείο Υφυπουργού
κ. Ι. Κουτσούκου
3 Γραφείο Γενικού Γραμματέα
κ. Γ. Κανελλόπουλου
4 Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις
Δ/σεις Γεωργίας (με e-mail)
Έδρες τους
5 Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά
6 Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους
7 ΕΣΥΦ
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα
8 Εσωτερική διανομή:
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της
Δ/σής μας
-Γραμματεία της Δ/σής μας
9 Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων
Διδότου 26, Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως έχει συμπληρωθεί και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. (1).
2. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Απόφαση του Υπ. Γεωργίας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», όπως ισχύει σήμερα και τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.
3. Την Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθ. 119119/19-7-2004 (ΦΕΚ 1177/Β/2-8-2004) για την «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 115/1997, Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Α΄ 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2003/82/ΕΚ της Επιτροπής».
4. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
5. Τη με αριθ. 119986/15-6-2007 (ΦΕΚ 1174/Β/12-7-2007) Κοινή Απόφαση των Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών – Γεωργίας με την οποία καταχωρήθηκε στο Παράρτημα Ι του ΠΔ 115/1997 η δραστική ουσία thiamethoxam.
6. Τη με αριθ. 74015/4-5-1990 Απόφαση του Υπ. Γεωργίας με θέμα τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα σκευάσματα γεωργικών φαρμάκων προκειμένου να χρησιμοποιούνται από ερασιτέχνες. Διαδικασίες έγκρισης και διάθεσή τους στην αγορά.
7. Τη γνωμοδότηση του ΑΣΥΓΕΦ για το 4^ο θέμα της 1^{ης}/31-1-2011 Συνεδρίασής του.
8. Το από 21-9-2010 Υπηρεσιακό σημείωμα με θέμα : Οικοτοξικολογικός έλεγχος των νικοτινοειδών (εντομοκτόνα) ως προς την σήμανση για τις μέλισσες (εφαρμογές με ψεκάσμο καλύψεως ή ριζοπότισμα)
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/7.9.2010 (ΦΕΚ 154/Α΄/7-9-2010) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Τη με αριθ. 271752/21.10.2010 (Β΄ 1673) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για “ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ελένη – Μαρία Αποστολάκη και Ιωάννη Κουτσούκο”.
11. Την από 17-12-2007 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Να χορηγηθεί οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το ΠΔ 115/97, άρθρο 4 παρ.(1), στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **AXORIS ENDOM STICKS** της εταιρείας **COMPO ΕΛΛΑΣ ΑΕ** με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

14358

1-3-2011

31-1-2017

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

AXORIS ENDOM STICKS

1.2.β Μορφή:

ΕΤΟΙΜΟΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΨΟΥΛΕΣ (Plant Rodlet-PR)

1.3 Δραστική ουσία

α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

thiamethoxam

(ομάδα νεονικοτινοειδών)

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

98 % (β/β) min

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

Syngenta Crop Protection
AG Ελβετίας

δ) Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1) DSM Chemie Linz Αυστρία

2)Syngenta Ltd India

3) AlzChem Trostberg GmbH Γερμανία

(οι Δ/νσεις των εργοστασίων είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκονται στο Παράρτημα I της παρούσας)

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας thiamethoxam προσδιορίζονται στο Τμήμα J της αίτησης με ημερομηνία 24-6-2008 (αρ. πρωτ.ΥΑΑΚΤ 122624) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης

COMPO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
 Αιγιαλείας 54, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα
 Τηλ. : 211 1769100
 Φαξ : 211 1769150
 e-mail: info@compo.gr

Υπεύθυνη επικοινωνίας:
 Ευτυχία .Ε. Λεφάκη
 Σωκράτους 12, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα
 Τηλ: 210 93 41 976
 Fax: 210 93 41 976
 E-mail: lefakief@otenet.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης)

Ο κάτοχος της έγκρισης

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

COMPO GmbH & Co. KG, Γερμανία

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
 COMPO GmbH & Co. KG, Γερμανία

(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας)

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

COMPO GmbH & Co. KG, Γερμανία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία thiamethoxam 1.2% β/β

Βοηθητικές ουσίες 98,77 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στο Τμήμα J της αίτησης με ημερομηνία 17-12-2007 (αρ. πρωτ.ΥΑΑκΤ 125034), αναγράφεται στο Part C της έκθεσης αξιολόγησης (registration report) και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

2

Συσκευασίες

2.2 Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Μεμονωμένες κάψουλες του σκευάσματος μέσα σε αεροστεγείς καλά σφραγισμένες κυψελίδες (blisters) σταθερά επικολλημένες στη καρτέλα	20 τεμάχια/ καρτέλα σε 2 σειρές X 10 τεμάχια	Κυψελίδα: Πλαστικό PVC, PET Καρτέλα: Χάρτινη (350 g/m ²) Σφράγισμα: Φύλλο αλουμινίου
2	Μεμονωμένες κάψουλες του σκευάσματος μέσα σε αεροστεγείς καλά σφραγισμένες κυψελίδες (blisters) μέσα σε κουτί	Έως 150 τεμάχια	Κυψελίδα: Πλαστικό PVC, PET Σφράγισμα: Φύλλο αλουμινίου Κουτί: Χάρτινο
3	Μεμονωμένες κάψουλες του σκευάσματος μέσα σε αεροστεγείς καλά σφραγισμένες κυψελίδες (blisters) μέσα σε δοχείο με βιδωτό πώμα	Έως 150 τεμάχια	Κυψελίδα: Πλαστικό PVC, PET Σφράγισμα: Φύλλο αλουμινίου Δοχείο: Πλαστικό PP Πώμα: Πλαστικό PP
4	Μεμονωμένες κάψουλες του σκευάσματος μέσα σε αεροστεγείς καλά σφραγισμένες κυψελίδες (blisters) μέσα σε σακούλα	Έως 150 τεμάχια	Κυψελίδα: Πλαστικό PVC, PET Σφράγισμα: Φύλλο αλουμινίου Σακούλα: PE
5	Μεμονωμένες κάψουλες του σκευάσματος μέσα σε αεροστεγείς καλά σφραγισμένες κυψελίδες (blisters) μέσα σε σακούλα εντός κουτιού	Έως 150 τεμάχια	Κυψελίδα: Πλαστικό PVC, PET Σφράγισμα: Φύλλο αλουμινίου Σακούλα: PE Κουτί: Χάρτινο

<p>3 Οδηγίες χρήσης:</p>	<p>Προορίζεται μόνο για ερασιτέχνες χρήστες</p> <p>Τρόπος εφαρμογής</p> <p>Το εντομοκτόνο AXORIS ENDOM STICKS (PR) είναι ένα ετοιμόχρηστο σκεύασμα σε μορφή κάψουλας και εφαρμόζεται:</p> <p>A) Σε φυτά μέσα σε γλάστρα σε χώμα: Τοποθετούμε την κάψουλα στη γλάστρα, πιέζοντας την ολόκληρη από το πάνω μέρος μέσα στο χώμα, προς τη μπάλα των ριζών Μετά την εφαρμογή ποτίζουμε καλά τις γλάστρες, αποφεύγοντας το υπερβολικό πότισμα</p> <p>B) Σε γλάστρες υδροπονικού τύπου Για τις μικρές γλάστρες ανασηκώνουμε τη γλάστρα και τοποθετούμε την κάψουλα μέσα στο νερό. Για τις μεγαλύτερες γλάστρες τοποθετούμε την βέργα/κάψουλα στο σημείο του δείκτη του επιπέδου νερού.</p> <p>Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: -</p> <p>Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:</p> <p>Τα κενά υλικά συσκευασίας εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.</p>
---------------------------------	---

<p>4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:</p>	<p>Το AXORIS ENDOM STICKS (PR) είναι ένα ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο σε μορφή κάψουλας με δραστική ουσία το thiamethoxam.</p> <p>Είναι διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου της ομάδας των νεονικοτινοειδών. Η εντομοκτόνος δράση του οφείλεται στη δέσμευση των υποδοχέων της ακετυλοχολίνης στις συνάψεις του περιφερειακού νευρικού συστήματος.</p> <p>Το AXORIS ENDOM STICKS (PR) εισέρχεται στα φυτά από τις ρίζες και μεταφέρεται ακροπεταλικά.</p> <p>Η κάψουλα λειτουργεί σαν αποθήκη από την οποία η δραστική ουσία αποδεσμεύεται σιγά-σιγά, και μεταφέρεται από τις ρίζες δια του ξύλου στα πράσινα μέρη των φυτών, τα οποία προσβάλλονται κατά κύριο λόγο από τα έντομα.</p> <p>Καταπολεμά μυζητικά και μασητικά έντομα.</p>
--	--

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος (κάψουλες ανά λίτρο χώματος / υποστρώματος)	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά έτος
Πράσινα και ανθοφόρα, καλλωπιστικά φυτά σε γλάστρες με χώμα, εσωτερικού χώρου και βεράντας.	Αφίδες (μελίγκρα) <i>(Aphis fabae, Aphis gossypii, Myzus persicae, Myzus nicotianae, Rhopalosiphum padi, Macrosiphum rosae)</i>	$\frac{1}{2}$ Χρησιμοποιήστε μισή κάψουλα ($\frac{1}{2}$) ανά λίτρο χώματος. Σε ζαρντινιέρες χρησιμοποιήστε μισή κάψουλα ανά 12 εκ. ή ανά φυτό	Με την έναρξη της προσβολής ή την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων τοποθετείστε την κάψουλα στη γλάστρα, πιέζοντάς την ολόκληρη από το πάνω μέρος μέσα στο χώμα, προς τις ρίζες Μετά την εφαρμογή ποτίστε καλά τις γλάστρες, αποφεύγοντας το υπερβολικό πότισμα.	Το πολύ μία εφαρμογή ανά προσβολή Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 12 εβδομάδες εφόσον απαιτείται
	Αλευρώδεις <i>(Trialeurodes vaporarium, Aleurodes spp.)</i> Ψευδόκοκοι-Βαμβακάδα <i>(Pseudococcus sp., Planococcus citri, Nipaecoccus filamentosus),</i> Ψώρες (<i>Coccus hesperidum</i>) Θρίπες <i>(Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci),</i> <i>Cacyreus marshalli</i>	1 Χρησιμοποιήστε μία κάψουλα ανά λίτρο χώματος. Σε ζαρντινιέρες χρησιμοποιήστε μία κάψουλα ανά 12 εκ. ή ανά φυτό		
Πράσινα και ανθοφόρα καλλωπιστικά φυτά σε γλάστρες υδροπονικού τύπου, εσωτερικού χώρου και βεράντας	Αφίδες (μελίγκρα) <i>(Aphis fabae, Aphis gossypii, Myzus persicae, Myzus nicotianae, Rhopalosiphum padi, Macrosiphum rosae)</i> Αλευρώδεις <i>(Trialeurodes vaporarium, Aleurodes spp.)</i> Ψευδόκοκοι-Βαμβακάδα <i>(Pseudococcus sp., Planococcus citri, Nipaecoccus</i>	1/2 Χρησιμοποιήστε μισή (1/2) κάψουλα ανά λίτρο υποστρώματος για όλα τα είδη των εντόμων.	Με την έναρξη της προσβολής ή την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων α) Για τις μικρές γλάστρες ανασηκώστε τη γλάστρα και τοποθετείστε την κάψουλα μέσα στο νερό. β) Για τις μεγαλύτερες γλάστρες τοποθετείστε	Το πολύ μία εφαρμογή ανά προσβολή Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 12 εβδομάδες εφόσον απαιτείται

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος (κάψουλες ανά λίτρο χώματος / υποστρώματος)	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά έτος
	<i>filamentosus</i>), Ψώρες (<i>Coccus hesperidum</i>) Θρίπες (<i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>Thrips tabaci</i>)		την κάψουλα (τεμαχισμένη) στο σημείο του δείκτη του επιπέδου νερού.	

Παρατηρήσεις:

1. Σε περίπτωση ανεπαρκούς φωτισμού μπορεί να παρατηρηθεί κάποια καθυστέρηση στην εμφάνιση της αποτελεσματικότητας.
2. Διάρκεια προστασίας : Συνήθως μεγαλύτερη από 12 εβδομάδες, γι' αυτό μία εφαρμογή ανά εποχή είναι αρκετή.
3. Οι αφίδες αντιμετωπίζονται επαρκώς εντός 1 - 2 ημερών, οι θρίπες μετά από 7 ημέρες, οι αλευρώδεις, οι ψευδόκοκκοι και οι ψώρες μετά από 2-3 εβδομάδες
4. Ακολουθεί πίνακας, με τον ενδεικτικό συνιστώμενο αριθμό καψουλών ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της γλάστρας και τα είδη των εντόμων.

Πεδίο εφαρμογής	Διάμετρος γλαστρών	Αφίδες (μελίγκρα) Αριθμός καψουλών	Λοιπά έντομα Αριθμός καψουλών
Πράσινα και ανθοφόρα καλλωπιστικά σε γλάστρες με χώμα	Έως 14 cm	½	1
	Έως 17 cm	1	2
	Έως 19 cm	1 ½	3
	Έως 21 cm	2	4
	Έως 23 cm	2 ½	5
	Έως 27 cm	4	8
	Έως 28 cm	5	10
Πράσινα και ανθοφόρα καλλωπιστικά σε γλάστρες υδροπονικού τύπου	Ανά λίτρο υδροπονικού υποστρώματος	1/2	1/2

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

ΝΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ

- Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα όταν οι μέλισσες είναι σε φάση έντονης κινητικότητας.
- Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα κατά την περίοδο της άνθισης.

Διαχείριση ανθεκτικότητας --

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
 - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Σε μεγάλες δόσεις έχουν εμφανίσει ευαισθησία ορισμένα είδη των παρακάτω οικογενειών, στα οποία δεν συνιστάται η εφαρμογή του
Araliaceae: (*Polyscias* sp. και *Dizygotheca* sp)
Araceae: (*Epipremnum* spp., *Spathiphyllum* spp., *Syngonium* spp.)
Agavaceae: (*Cordyline* spp)

- 9** Σήμανση σκευάσματος:

N-Επικίνδυνο για το περιβάλλον

- 10** Φράσεις R

R50/53- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

- 11** Φράσεις S

S 1/2- Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά
S13- Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές
S20/21- Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε
S29 Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση

“Κατά την εφαρμογή, συνιστάται η χρήση γαντιών”

S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα.

S61 Αποφύγετε τη ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες /δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

SP1 ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

SPe8 Τοξικό για τις μέλισσες

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

12	Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο	<p><u>Γενική υπόδειξη:</u> Να αφαιρέσετε αμέσως όλα τα λερωμένα ρούχα και να τα πλύνετε πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Μετά τη χρήση πλύνετε τα χέρια σας καλά με άφθονο νερό και σαπούνι.</p> <p><u>Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:</u> Πλυθείτε καλά με σαπούνι και άφθονο νερό.</p> <p><u>Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:</u> Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια καλά με άφθονο καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά.</p> <p><u>Σε περίπτωση κατάποσης:</u> Ξεπλύνετε το στόμα αμέσως και πιείτε άφθονο νερό. Μην προκαλέσετε εμετό. Αν υποψιάζεστε δηλητηρίαση καλέστε αμέσως γιατρό.</p> <p>Αντίδοτο: Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210 7793777</p>

13**13.1** Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRL's)

thiamethoxam

Φυτά ή φυτικά προϊόντα / Ζωϊκά προϊόντα	MRL (mg/kg)
Έχουν οριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά υπολείμματα οριστεί με τον κανονισμό 396/2005	

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Καλλωπιστικά	Μη εφαρμόσιμο

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

15 Στο Παράρτημα I (Annex I) του registration report καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα έγκριση κυκλοφορίας. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

16 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

B**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά..

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Ι. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε. ΧΑΤΖΗ

Δ – 7 (GAP)**ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ****ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ**

Γεωργικό (ά) Φάρμακο (ά) (κοινή ονομασία)

: **thiamethoxam**

Σελίδες :

Εμπορικό (ά) όνομα (τα)

: **AXORIS ENDOM STICKS (PR)**Χώρα : **ΕΛΛΑΔΑ**

Κύρια χρήση

: **Εντομοκτόνο/Ετοιμόχρηστο (RTU) σε μορφή κάψουλας για καλλωπιστικά σε γλάστρες με χώμα και σε γλάστρες υδροπονικού τύπου**

Καλλιέργεια Και/ή Συνθήκες χρήσης	Κράτος Μέλος ή χώρα	Εμπορικό όνομα του σκευά σματος	(Α) (Θ) ή (Κ)	Εχθρός, ομάδα εχθρών που ελέγχονται	Σκεύασμα		Εφαρμογή			Δοσολογία ανά επέμβαση ¹			Τελευταία Επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες)	
					Μορφή	Περιεκ σε δ.ο.	Μέθοδος/ τρόπος	Στάδιο Ανάπτυξη ς και εποχή	Αριθμός Ελάχ. Μεγ.	Μεσο διά στημα εφαρμο γών (ελάχ.)	Αρ. κάψουλών ανά λίτρο εδάφους ελάχ. -μεγ.	λίτρα ψεκ. υγρού / εκτάριο ελάχ. μεγ.		γρ. δ.ο. ανά λίτρο εδάφους/ υποστρώμα τος ελάχ. μεγ.
(α)			β)	(γ)	(δ-στ)	(θ)	(στ-η)	(ι)	(κ)	(ελάχ.)			(λ)	
Πράσινα και ανθοφόρα καλλωπιστικά φυτά σε γλάστρες με χώμα, εσωτερικού χώρου και βεράντας	Ελλάδα	AXORIS ENDOM STICKS		Αφίδες <i>Aphis fabae</i> , <i>Aphis</i> <i>gossypii</i> , <i>Myzus</i> <i>persicae</i> , <i>Myzus</i> <i>nicotianae</i> , <i>Rhopalosiphum</i> <i>radii</i> , <i>Macrosiphum</i> <i>rosae</i>	Ετοιμόχ ρηστη κάψουλα PR	Thiame thoxam 12 g δ.ο. ανά kg σκευάσμα τος	Τοποθετούμε την κάψουλα στη γλάστρα, πιέζοντάς την ολόκληρη από το πάνω μέρος μέσα στο χώμα, προς τις ρίζες Μετά την εφαρμογή ποτίζουμε καλά τις γλάστρες, αποφεύγοντάς το υπερβολικό πότισμα.	Εφαρμο γή με την έναρξη της προσβο λής	1-4	12 εβδομά δες	½	Δεν έχει εφαρμογή	0.018	-
				Αλευρώδεις <i>Trialeurodes</i> <i>vaporarium</i> , <i>Aleurodes spp</i> Ψευδόκοκοι, Βαμβακάδα <i>Pseudococcus sp.</i> , <i>Planococcus citri</i> , <i>Nipaeococcus</i> <i>filamentosus</i> Ψώρες <i>Coccus hesperidum</i> ,							1	Δεν έχει εφαρμογή	0.036	

¹ Ένας πίνακας, με τον ενδεικτικό συνιστώμενο αριθμό κάψουλών ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της γλάστρας και τα είδη των εντόμων όπως φαίνεται στις παρατηρήσεις θα συμπεριληφθεί στην τελική ετικέτα² Το έντομο *Cacyreus marshalli* είναι ένα έντομο που εξαπλώνεται τα τελευταία χρόνια ταχύτατα στη νότια Ευρωπαϊκή ζώνη

ΑΔΑ: 4Α1ΕΒ-Φ

				<p>Θρίπες <i>Thrips tabacci</i>, <i>Frankliniella occidentalis</i></p> <p><i>Cacyreus marshalli</i>²</p>									
Πράσινα και ανθοφόρα καλλωπιστικά φυτά σε γλάστρες υδροπονικού τύπου εσωτερικού χώρου και βεράντας			<p>Αφίδες <i>Aphis fabae</i>, <i>Aphis gossypii</i>, <i>Myzus persicae</i>, <i>Myzus nicotianae</i>, <i>Rhopalosiphum padi</i>, <i>Macrosiphum rosae</i></p> <p>Αλευρώδεις <i>Trialeurodes vaporariorum</i>, <i>Aleurodes spp</i></p> <p>Ψευδόκοκκοι, Βαμβακάδα <i>Pseudococcus sp.</i>, <i>Planococcus citri</i>, <i>Nipaecoccus filamentosus</i></p> <p>Ψώρες <i>Coccus hesperidum</i>, Θρίπες <i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i></p>	<p>α) Για τις μικρές γλάστρες ανασηκώστε τη γλάστρα και τοποθετείστε την κάψουλα μέσα στο νερό.</p> <p>β) Για τις μεγαλύτερες γλάστρες τοποθετείστε την κάψουλα (τεμαχισμένη) στο σημείο του δείκτη του επιπέδου νερού.</p>	Εφαρμογή με την έναρξη της προσβολής	1-4	12 εβδομάδες	½ μισή κάψουλα ανά λίτρο υδροπονικού υποστρώματος	Δεν έχει εφαρμογή	0.018	-		

ΑΔΑ: 4Α1ΕΒ-Φ

Παρατηρήσεις:

1. Σε περίπτωση ανεπαρκούς φωτισμού μπορεί να παρατηρηθεί κάποια καθυστέρηση στην εμφάνιση της αποτελεσματικότητας.
2. Διάρκεια προστασίας : Συνήθως μεγαλύτερη από 12 εβδομάδες, γι' αυτό μία εφαρμογή ανά εποχή είναι αρκετή.
3. Οι αφίδες αντιμετωπίζονται επαρκώς εντός 1 - 2 ημερών, οι θρίπες μετά από 7 ημέρες, οι αλευρώδεις, οι ψευδόκοκκοι και οι ψώρες μετά από 2-3 εβδομάδες
4. Ακολουθεί πίνακας, με τον ενδεικτικό συνιστώμενο αριθμό καψουλών ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της γλάστρας και τα είδη των εντόμων.

Πεδίο εφαρμογής	Διάμετρος γλαστρών	Αφίδες (μελίγκρα) Αριθμός καψουλών	Λοιπά έντομα Αριθμός καψουλών
Φυτά σε γλάστρα με χόμα Πράσινα και ανθοφόρα καλλωπιστικά σε γλάστρες	Έως 14 cm	½	1
	Έως 17 cm	1	2
	Έως 19 cm	1 ½	3
	Έως 21 cm	2	4
	Έως 23 cm	2 ½	5
	Έως 27 cm	4	8
Σε γλάστρες υδροπονικού τύπου	Έως 28 cm	5	10
	Ανά λίτρο υδροπονικού υποστρώματος	1/2	1/2

- Παρατηρήσεις :
- (α) Για τις καλλιέργειες, η ταξινόμηση της ΕΕ και του Codex (και τα δύο) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Όπου βρίσκει εφαρμογή, οι συνθήκες χρήσης θα πρέπει να περιγράφονται (π.χ. καπνισμός των κατασκευών).
 - (β) Ανοιχτά αγρού (Α), εφαρμογές σε θερμοκήπια (Θ) ή σε κλειστούς χώρους (Κ).
 - (γ) Π.χ. μασητικά και μυζητικά έντομα, έντομα εδάφους, έντομα φυλλώματος, ζιζάνια.
 - (δ) Π.χ. βρέξιμη σκόνη (WP), γαλακτωματοποιήσιμο συμπύκνωμα (EC).
 - (ε) GCPF κώδικες – GIFAP Technical Monograph No 2, 1989.
 - (στ) Όλες οι χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες θα πρέπει να εξηγούνται.
 - (ζ) Μέθοδος π.χ. ψεκασμός υψηλού όγκου, χαμηλού όγκου, σκονισμός.
 - (η) Τρόπος, π.χ. σε όλη την επιφάνεια, από αέρος, στις γραμμές, ατομικά φυτά – Ο τύπος του ψεκαστικού μηχανήματος θα πρέπει να προσδιορίζεται.
 - (θ) g/kg ή g/l
 - (ι) Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία εφαρμογή (BBCH Monograph, Growth Stages of Plants, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), περιλαμβάνοντας, όπου βρίσκει εφαρμογή, πληροφορίες σχετικά με την εποχή και το χρόνο εφαρμογής.
 - (κ) Ο ελάχιστος και μέγιστος δυνατόν αριθμός εφαρμογών υπό πρακτικές συνθήκες.
 - (λ) Ελάχιστο χρονικό μεσοδιάστημα πριν τη συγκομιδή (PHI).
 - (μ) Οι παρατηρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: οικονομική σημασία / περιορισμούς στη χρήση.