



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα 3-10-2000

Αριθ. Πρωτ.: 105853

Ταχ. Δ/ση : Ιπποκράτους 3-5  
Ταχ. Κώδικας : 101 64 ΑΘΗΝΑ

TELEFAX: 3617103

Πληροφορίες: Α.Φονταρά  
Τηλέφωνο: 5291411

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
κυκλοφορίας στο φυτοπροστα-  
τευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο)  
ENODOX 35 SC.**

**ΠΡΟΣ: 1) ΛΑΠΑΦΑΡΜ Α.Ε.  
Μενάνδρου 73  
10437 ΑΘΗΝΑ**

(Με απόδειξη)

**2) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις**

**α) Δ/σεις Γεωργίας  
Έδρες τους**

**β) Δ/σεις Εμπορίου  
Έδρες τους**

**3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό  
Ινστιτούτο**

**Τμήμα Ελέγχου**

**Γεωργικών Φαρμάκων**

**Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά**

**ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 για «την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το άρθρο 2, παρ. 2 και το άρθρο 5, παρ.8.
2. Τη με αριθ.85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το Κεφ. Β, παρ. 2.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων» καθώς και το με αριθ. 115/5-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) Π.Δ.
4. Τη με αριθ. 100586/12-7-99 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. **6775** οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο μεγαλύτερης περιεκτικότητας και άλλης μορφής από το αιτούμενο σκεύασμα DODYLON 65 WP.
5. Τη με αριθ. 353001/13-4-2000 (Β'566/20-4-2000) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη».
6. Τις από 12-11-99 και 28-3-00 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 28-3-00 πρωτόκολλο εξέτασης του σχετικού φακέλου.

## Αποφασίζουμε

- I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό 6814 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:
1. **Εμπορικό όνομα:** ENODOX 35 SC
  2. **Μορφή:** Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
  3. **Εγγυημένη σύνθεση:** dodine 35 % β/ο  
βοηθητικές ουσίες 64,3 % β/β
  4. **Καθαρότητα Technical** από το οποίο παρασκευάζεται: 98 % min.
  5. **Παρασκευαστής:** SIPCAM SpA, Ιταλία
  6. **Αντιπρόσωπος :** ΛΑΠΑΦΑΡΜ Α.Ε., Μενάνδρου 73 10437 Αθήνα
  7. **Τυποποιητής:** Ο παρασκευαστής
  8. **Συσκευαστής:** Ο παρασκευαστής
  9. **Συσκευασία :** 9α. **Είδος - Μέγεθος:** Φιάλες 500 κ.εκ., 1 λίτρου, 1.5, 2, 3, 5 και 10 λίτρων  
9β. **Υλικό:** Πολυαιθυλένιο HDPE ή PE/PA
  10. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης:**  
Τοπικά διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση. Ειδικό για το Φουζικλάδιο Μηλιάς και Αχλαδιάς.
  11. **Τρόπος εφαρμογής :** Ψεκασμοί καλύψεως μέχρις απορροής.
  12. **Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:**  
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση.  
Ανακινήστε το σκεύασμα καλά και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.  
Να αποφεύγεται η χρήση σκληρού νερού.

### 13. Φάσμα δράσης.

Καλλιέργειες	Ασθένειες	Δόσεις κ.εκ./100 λίτρα νερό	Όγκος ψεκαστικού υγρού λίτρα/στρέμμα	Χρόνος εφαρμογής
Μηλιά	Φουζικλάδιο ( <i>Venturia inaequalis</i> )	110 (προληπτικά) 170-180 (θεραπευτικά)	100-200	Οι ψεκασμοί αρχίζουν από τη στιγμή που σκάζουν τα μάτια (πράσινη κορυφή) και συνεχίζονται μέχρι πλήρους σχηματισμού των καρπών. Από το στάδιο αυτό και μετά οι ψεκασμοί αραιώνουν.
Αχλαδιά Μουσμουλιά	Φουζικλάδιο ( <i>Venturia pirina</i> , <i>Venturia eriobotryae</i> )	170 (προληπτικά) 180-220 (θεραπευτικά)	100-200	Οι ψεκασμοί αρχίζουν από τη στιγμή που σκάζουν τα μάτια (πράσινη κορυφή) και συνεχίζονται μέχρι πλήρους σχηματισμού των καρπών. Από το στάδιο αυτό και μετά οι ψεκασμοί αραιώνουν.

Κερασιά Βυσσιλιά	Ανθράκνωση (Gnomonia erythrostoma, Coccomyces hiemalis)	150-180	150-250	Ένας ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.
Ελιά	Κυκλοκόνιο (Spilocaea oleagina)	180	150-300	2 ψεκασμοί: Ο πρώτος πριν την έναρξη των φθινοπωρινών βροχών και ο δεύτερος κατά το τέλος του χειμώνα πριν το κλάδεμα.
	Γλοιοσπόριο (Gloeosporium olivarum)	180	150-300	1-2 ψεκασμοί λίγο πριν την έναρξη αλλαγής του χρώματος του ελαιοκάρπου.

**Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:**

Μηλιά 2, Αχλαδιά-Μουσμουλιά 2, Κερασιά-Βυσσιλιά 1, Ελιά 2.

**Παρατηρήσεις:**

1. Για τη Μηλιά θεραπευτικά το πολύ 48 ώρες μετά την έναρξη της βροχής, εφόσον δημιουργούνται συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας.
2. Η δράση του στην καταπολέμηση του Κυκλοκόνιου και Γλοιοσπόριου της Ελιάς είναι μέτρια.
14. **Φυτοτοξικότητα:**  
Να μην ψεκάζεται σε αχλαδιές και μηλιές κατά τη διάρκεια της άνθησης ή αμέσως μετά την πτώση των πετάλων, εάν ο καιρός είναι πολύ ψυχρός (<5°C).  
Μπορεί να προκαλέσει εσχάρωση στην ποικιλία μηλιάς Golden Delicious.
15. **Συνδυαστικότητα:**  
Δεν συνδυάζεται με ασβέστιο, Θερινό ή Χειμερινό πολτό και γενικά πολύ αλκαλικά σκευάσματα.
16. **Σημάνσεις:** Xi, Ερεθιστικό.
17. **Κίνδυνοι για τον άνθρωπο ( R φράσεις):**  
**R36/38** Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.  
**R41** Κίνδυνος σοβαρής βλάβης των ματιών.
18. **Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):**  
**RO3** Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες.  
**RO5** Τοξικό για τα ψάρια.
19. **Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):**  
**S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.  
**S13** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.  
**S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, ή καπνίζετε.  
**S25** Αποφεύγετε επαφή με τα μάτια.  
**S35** Καταστρέψτε τα κενά μέσα συσκευασίας με τρύπημα. Η χρήση τους για οποιοδήποτε σκοπό είναι επικίνδυνη.  
**SY1/4** Φοράτε φόρμα, μπότες, γάντια, και γυαλιά όταν χειρίζεστε ή εφαρμόζετε το σκεύασμα.  
**SY8** Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.

**S43** Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτή την ετικέτα όπου είναι δυνατόν.

**20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο :**

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, κρατήστε τα ανοικτά και πλύντε τα με άφθονο νερό, συνέχεια, για 15 λεπτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως γιατρό.

Η κατάσταση μπορεί να χειροτερέψει με την κατανάλωση αλκοόλ.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 77 93 777**

**21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):**

**SO4** Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

**22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):**

**23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):**

**(Π1)** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 15 ημέρες για όλες τις καλλιέργειες.

**24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:**

Διατηρήστε το κλειστό, στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και σκιερό. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

**II. Ετικέτα:**

**α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 22 , παρ.1 του Ν.721/77 και με την παρούσα απόφαση.

**β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2004.**

**β.** Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν την λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται αίτηση ανανέωσης.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

**Ε. ΑΡΓΥΡΗΣ**