



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Αθήνα, 15 - 10 - 2012
Αριθ. πρωτ: 10668/106282**

**Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87 161
e-mail: syg036@minagric.gr**

**Προς: PROBELTE S.A.,
Ctra Madrid, Km 384.6,
Poligono Industrial El Tiro
30100 Espinardo
MURCIA – ΙΣΠΑΝΙΑ**

**Δια μέσου της εταιρείας
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος &
Σια Ε.Ε.
Τσιτούρη 22, 152 31 - Χαλάνδρι
(με απόδειξη)**

**Κοιν.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ**

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης
διάθεσης στην αγορά στο
φυτοπροστατευτικό προϊόν
(μυκητοκτόνο) FOSBEL PLUS 80
WP**

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερο το άρθρο 80.5 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις
3. Τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.

4. Τον Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
5. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών
6. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου , όπως τροποποιήθηκε με το SANCO doc.357 /rev.3/ 2008
7. Την έγκριση του από την Ιταλία.
8. Τη με αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/Β/22-5-2009) Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για “Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με «Εντολή Υφυπουργού».
9. Την από 9/2/2010 και 14/6/2012 αίτηση της Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & Σια Ε.Ε εκ μέρους της εταιρείας **PROBELTE S.A.**, Ισπανίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 80.5, του Κανονισμού 1107/2009 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **FOSBEL PLUS 80 WP** της εταιρείας **PROBELTE S.A.**, Ισπανίας με υπεύθυνο επικοινωνίας στη χώρα μας την εταιρεία. Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & Σια Ε.Ε με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

60.341
15/10/2015
30/4/2017

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα

FOSBEL PLUS WP

- 1.2.β Μορφή

ΒΡΕΞΙΜΗ ΣΚΟΝΗ (WP)

1.3 Δραστικές ουσίες

- α) Κοινή ονομασία των δραστικών ουσιών κατά ISO

FOSETYL AL (ομάδα των φωσφονικών) MANCOZEB (ομάδα διθειοκαρβαμιδικά)

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας
σε καθαρή δραστική ουσία:

FOSETYL AL	96 % (β/β) min
MANCOZEB	85 % (β/β) min

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

FOSETYL AL

FATF - INDUSTRIAS AFRASA SA,

Pol. Ind. Fuente del Jarro,
C/Ciudad de Sevilla 53
E-46988 Paterna (Valencia)
Τηλ.: +34 96 132 1700
E-mail: egay@afrasa.es
ΙΣΠΑΝΙΑ

MANCOZEB

Indofil Industries Limited,

Kalpataru Square 4th floor, Kondivita Road, Off-Andheri
Kurla Road, Andheri (East), Mumbai, 400 059, α
Tel: +91 22 67999100
Fax: +91 22 25898357
Με εκπρόσωπο στην Ευρώπη:
Indofil Industries Limited
Via Filippo Turati, 6
20121 Milan,

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

FOSETYL AL

Manufacturing plant 1

HANGZHOU MARCH CHEMICALS LABORATORY,
7-B Ziyun Building, Xizi Garden,
598 North Zhong Road Hangzhou 310014 P.R. KINA

Manufacturing plant 2

SHANDONG DACHENG PESTICIDE CO.,
Ltd No. 25, Honggou Road, Zhandiang, Shandong, KINA.

MANCOZEB

Manufacturing plant 1

Indofil Industries Limited

Kolshet, Off Swami
Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug, Thane-400
607, Maharashtra, Ινδία
Tel: +91 22 67999100
Fax: +91 22 25898357
E-mail: indofil@modi.com

Manufacturing plant 2

Indofil Industries Limited

Plot No.Z7-1/z8, SEZ Dahej Ltd.,
SEZ Dahej, Taluka, Vagra, District Bharuch, Gujarat-392 130,
Ινδία

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας **fosetyl Al** όπως προσδιορίζονται στο **Annex II - Doc J** της αίτησης με ημερομηνία 25/04/2007 (Αρ. Πρ. ΥΓ 118806) ή όπως αυτές έχουν μεταγενέστερα τροποποιηθεί μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρμόδιας Αρχής και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας **mancozeb** όπως προσδιορίζονται στο **Annex II - Doc J** της αίτησης που κατατέθηκε με ημερομηνία 17-05-2006 (Αρ. Πρ. ΥΑΑκΤ 118790) της εταιρείας Indofil Industries Limited.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

PROBELTE S.A.,
Ctra Madrid, Km 384.6, Poligono Industrial El Tiro
30100 Espinardo
MURCIA - ΙΣΠΑΝΙΑ
Mr Pedro Martínez Ortiz
General Manager
Tel.: +34 968 307250
Fax.: +34 968 305432
E-mail: pedromartinez@probelte.es

Υπεύθυνος επικοινωνίας στην Ελλάδα

ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & Σία Ε.Ε.
ΤΣΙΤΟΥΡΗ 22, 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Τηλ.: 210 6725174
E-mail: aconsult@otenet.gr

β) Υπεύθυνος για την διάθεση στην Ελληνική αγορά:

ΣΕΓΕ Α.Β.Ε.Ε.
Εθνικής Αντιστάσεως 84, 15231 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 6717794
Fax: 210 6722310
E-mail: sege@otenet.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Fosetyl-Mancozeb TASK FORCE (FMTF)
PROBELTE S.A.,
Ctra Madrid, Km 384.6, Poligono Industrial El Tiro
30100 Espinardo
MURCIA - ΙΣΠΑΝΙΑ
Mr Pedro Martínez Ortiz
General Manager
Tel.: +34 968 307250
Fax.: +34 968 305432
E-mail: pedromartinez@probelte.es

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
PROBELTE S.A.,
 Ctra Madrid, Km 384.6, Poligono Industrial El Tiro
 30100 Espinardo
 MURCIA - ΙΣΠΑΝΙΑ
 Mr Pedro Martínez Ortiz
 General Manager
 Tel.: +34 968 307250
 Fax.: +34 968 305432
 E-mail: pedromartinez@probelte.es

Δ) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
PROBELTE S.A.,
 Ctra Madrid, Km 384.6, Poligono Industrial El Tiro
 30100 Espinardo
 MURCIA - ΙΣΠΑΝΙΑ
 Mr Pedro Martínez Ortiz
 General Manager
 Tel.: +34 968 307250
 Fax.: +34 968 305432
 E-mail: pedromartinez@probelte.es
 &
ΣΕΓΕ Α.Β.Ε.Ε.
 Θέση Μαδάρω, Οινόφυτα Βοιωτίας
 Τηλ.: 22620 31851
 Fax : 22620 32748
 E-mail: sege@otenet.gr

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες
fosetyl Al 35 % + mancozeb 35% (β/β)
Βοηθητικές ουσίες: 22,37%(β/β)

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στο Doc J του ANNEX III της αίτησης με ημερομηνία 9/2/2010 (Αρ. Πρ. ΥΓ 181099) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής στο Part C του registration report της αρμόδιας αρχής της Ιταλίας

2 Συσκευασία(ες)

2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Κουτί με εσωτερική σακούλα	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 750, 800 γραμ., 1 κιλού, (1,2), (2,5), 3και 5 κιλά.	Σακούλα PE ή PET/PE ή AL/ PET/ PE και κουτί χάρτινο
2	Σακούλα	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 550, 600, 750, 800 γραμ., 1 κιλού, (1,2), (2,5) και 3 κιλά.	Σακούλα PE ή PET/PE ή AL/ PET/ PE

3	Σάκος	3, 5 και 10 κιλά	PE ή PET/PE ή AL/ PET/ PE.
---	-------	------------------	----------------------------

3	Οδηγίες χρήσης:	Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες
		<p><u>Τρόπος εφαρμογής:</u> Ψεκασμοί φυλλώματος με καλή διαβροχή των φυτών.</p> <p><u>Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:</u> Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.</p> <p><u>Συνδυαστικότητα:</u> δεν συνδυάζεται με διαφυλλικά λιπάσματα, με όξινα ή οξειδωτικά σκευάσματα</p> <p><u>Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:</u> Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, σακίδια) μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.</p>

4	Κατηγορία και τρόπος δράσης:	<p>Μίγμα ενός διασυστηματικού μυκητοκτόνου της ομάδας των οργανοφωσφορικών (fosetyl Al) και ενός μυκητοκτόνου επαφής της ομάδας των διθειοκαρβαμιδικών (mancozeb) με προστατευτική και θεραπευτική δράση..</p> <p>Το Mancozeb δρα εμποδίζοντας τον κυτταρικό μεταβολισμό των μυκήτων σε πολλαπλά σημεία</p> <p>Το fosetyl Al δρα παρεμποδίζοντας την βλάστηση των σπορίων αλλά και επάγοντας μηχανισμούς άμυνας των φυτών.</p> <p>Το προϊόν απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες και μεταφέρεται σε όλο το φυτό</p>
----------	------------------------------	--

5

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός εφαρμ/ ανά καλλ..περίοδο Μεσοδιάστ. Εφαρμογών σε ημέρες
		γρ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα	γρ/ στρέμμα (max)		
Αμπέλι	Περονόσπορος (<i>Plasmopara viticola</i>)	300 - 500	30 - 70	90 - 350	Εφαρμογή όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας ή με την έναρξη της προσβολής. Γενικά γίνονται εφαρμογές στα στάδια: βλαστοί μήκος περίπου 10 εκ., λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση.	3 /10 - 14
Πατάτα	Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>)	300 - 500	30 - 80	90 - 400	Εφαρμογή όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας ή με την έναρξη της προσβολής. Γενικά γίνονται εφαρμογές όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ.	3/15

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

1. Η μεγάλη δόση χρησιμοποιείται όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας ή σε ασθένεια που εκδηλώνεται.
2. Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθούνται τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

30 ημέρες από την εφαρμογή

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, εναισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

9 Σήμανση σκευάσματος:

Xn – Επιβλαβές
N - Επικίνδυνο για το περιβάλλον

10 Φράσεις R

R36 Ερεθίζει τα μάτια.
R63 Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.
R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

11 Φράσεις S

(S1/2) Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
(S13) Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
(S20/21) Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε μην πίνετε ή καπνίζετε.
(S22) Μη εισπνέετε την σκόνη
(S25) Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια
(S29) Μην αδειάζετε το περιεχόμενο στη αποχέτευση
(S36/37/39) Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου
 Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική μάσκα κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατάλληλα γάντια κατά την εφαρμογή

(S60/61) Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά την διάθεση τους επικίνδυνα απόβλητα. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες /δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Περιέχει mancozeb. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

(Sp1) Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν η τη συσκευασία του.
(SPE3) Για να προστατέψτε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν απέκαστη ζώνη προστασίας **20** μέτρων (για το αμπέλι) και **5** μέτρων (στην πατάτα) από τα επιφανειακά ύδατα.
(SPE3) Για να προστατέψτε τα αρθρόποδα να αφήσετε μίαν απέκαστη ζώνη προστασίας **5** μέτρων για το αμπέλι από μη γεωργική γη.

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Γενικά: Μη χορηγείτε υγρά και μην προκαλείτε εμετό εάν ο παθών δεν διατηρεί τις αισθήσεις του ή παρουσιάζει σπασμούς.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Πλύνετε τα λερωμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής μετά από 1-2 λεπτά και συνεχίστε το ξέπλυμα για αρκετά λεπτά ακόμη. Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Συμβουλευθείτε γιατρό.

Για το γιατρό: Φροντίδα υποστηρικτική. Ταυτόχρονη έκθεση στο οινόπνευμα θα πρέπει να αποφεύγεται γιατί το mancozeb έχει δράση δισουλφιράμης.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

13 Προστασία των καταναλωτών**13.1** Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)

Φυτικά προϊόντα	mg/kg
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 396/2005 ΕΚ	

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αμπέλι	28
Πατάτα	21

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού 1107/2009 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ

Δ – 7 (GAP)**ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ****ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ**

Γεωργικό (ά) Φάρμακο (ά) (κοινή ονομασία)

FOSETYL AL + MANCOZEB 35+35%

Ημερομ. : 6/2012

EEC No (α)

Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ

Εμπορικό (ά) όνομα (τα)

FOSBEL PLUS WP

Κύρια χρήση π.χ. εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο

Μυκητοκτόνο

1	2	3	4	5	6		7				8			9	10		
Καλλιέργεια Και/ή Συνθήκες χρήσης	Κράτος Μέλος ή χώρα	Εμπορικό όνομα του σκευάσματος	(Α) (Θ) ή (Κ)	Εχθρός, ομάδα εχθρών ή ασθενειών ή ζιζανίων που ελέγχονται	Σκεύασμα		Εφαρμογή				Δοσολογία ανά επέμβαση			Τελευταία Επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες)	Παρατη- ρήσεις		
(α)			(β)	(γ)	(δ-στ)	(θ)	Μορφή	Περιεκ- σε δ.ο.	Μέθοδος/ τρόπος	Στάδιο Ανάπτυξης και εποχή	Αριθμός Εφαρμογών Ελάχ. Μεγ.	Χρονικό μεσοδιά- στημα μεταξύ των εφαρμογών (ελάχ.)	γρ δ.ο. / εκατόλιτρο ελάχ. μεγ.	λίτρα ψεκαστ. υγρού / εκτάριο ελαχ. μεγ.	Γρ. δ.ο. /εκτάριο ελάχ. μεγ.	(λ)	(μ)
Αμπέλι	EL	FOSBEL PLUS WP	A	Περωνόσπορος (<i>Plasmopara viticola</i>)	WP	FOSETYL AL 350 gr/kg + MANCOZEB 350 gr/kg	Ψεκασμός φυλλώματος		Όταν οι βλαστοί είναι μήκος περίπου 10 εκ., λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση Από BBCH 50	3	10 - 14	105 + 105 175 + 175	300 - 700	315 + 315 1225 + 1225	28		
Πατάτα	EL	FOSBEL PLUS WP	A	Περωνόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>)	WP	FOSETYL AL 350 gr/kg MANCOZEB 350 gr/kg	Ψεκασμός φυλλώματος		Όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ.) Από BBCH09.	3	15 ημέρες	105 + 105 175 + 175	300 - 800	315 + 315 1400 + 1400	21		

Παρατηρήσεις:

(α) Για τις καλλιέργειες, η ταξινόμηση της ΕΕ και του Codex (και τα δύο)

θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Οπου βρίσκεται εφαρμογή, οι συνθήκες

χρήσης θα πρέπει να περιγράφονται (π.χ. καπνισμός των κατασκευών).

(β) Ανοιχτού αγρού (Α), εφαρμογές σε θερμοκήπια (Θ), ή σε κλειστούς χώρους (Κ).

(γ) πχ. Μυκητοκτόνα και μυκητοκτόνα έντομα, έτομα εδάφους, έντομα φυλλώματος, ζιζάνια

(δ) πχ. Βρέξιμη σκόνη (WP), γαλακτοποίηση συμπίκνωμα (EC)

(ε) GCPF Κώδικες – GIFAP Technical Monograph No 2, 1989.

(στ) όλες οι χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες θα πρέπει να εξηγούνται

(ζ) Μέθοδος πχ. Ψεκασμός υψηλού όγκου, σκονισμός.

(η) Τρόπος. Πχ σ' όλη την επιφάνεια, από αέρος, στις γραμμές, ατομικά φυτά

– ο τύπος του ψεκαστικού μηχανήματος θα πρέπει να προσδιορίζεται

(θ) g/kg ή g/lt

(ι) Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία εφαρμογή (BBCH Monograph, Growth

Stages of Prants, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), περιλαμβάνοντας όπου

βρίσκει εφαρμογή, πληροφορίες σχετικά με την εποχή κατά τον χρόνο εφαρμογής

(κ) Ο ελάχιστος και ο μέγιστος δυνατόν αριθμός εφαρμογών υπό πρακτικές συνθήκες

(λ) Ελάχιστο χρονικό μεσοδιάστημα πριν τη συγκομιδή

(μ) Οι παρατηρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: οικονομική σημασία / περιορισμούς στη χρήση