



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Αθήνα, 13 - 4 - 2011
Αριθ. πρωτ: 95674

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Μ. Γάσπαρη
Τηλέφωνο: 210 92 87 250
e-mail: syg108@minagric.gr

Προς: **COMPO ΕΛΛΑΣ ΑΕ**
(Δια της κας Ε. Λεφάκη
Σωκράτους 12 Καλλιθέα)

(με απόδειξη)

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση οριστικής έγκρισης
διάθεσης στην αγορά στο
φυτοπροστατευτικό προϊόν
(εντομοκτόνο) AXORIS ENDOM
SPRAY για ερασιτεχνική χρήση”

Κοιν.:

- 1 Γραφείο Υπουργού
κ. Κ. Σκανδαλίδη
- 2 Γραφείο Υφυπουργού
κ. Ι. Κουτσούκου
- 3 Γραφείο Γενικού Γραμματέα
κ. Γ. Κανελλόπουλου
- 4 Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις
Δ/νσεις Γεωργίας (με e-mail)
Έδρες τους
- 5 Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά
- 6 Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους
- 7 ΕΣΥΦ
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα
- 8 Εσωτερική διανομή:
-Τμήματα Β΄, Γ΄ & Ε΄ της
Δ/νσής μας
-Γραμματεία της Δ/νσής μας
- 9 Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων
Διδότου 26, Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως έχει συμπληρωθεί και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. (1).
2. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Απόφαση του Υπ. Γεωργίας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», όπως ισχύει σήμερα και τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.
3. Την Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθ. 119119/19-7-2004 (ΦΕΚ 1177/Β/2-8-2004) για την «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 115/1997, Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Α΄ 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2003/82/ΕΚ της Επιτροπής».
4. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
5. Τη με αριθ. 119986/15-6-2007 (ΦΕΚ 1174/Β/12-7-2007) Κοινή Απόφαση των Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών – Γεωργίας με την οποία καταχωρήθηκε στο Παράρτημα Ι του ΠΔ 115/1997 η δραστική ουσία thiamethoxam.
6. Τη με αριθ. 74015/4-5-1990 Απόφαση του Υπ. Γεωργίας με θέμα τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα σκευάσματα γεωργικών φαρμάκων προκειμένου να χρησιμοποιούνται από ερασιτέχνες. Διαδικασίες έγκρισης και διάθεσή τους στην αγορά.
7. Τη γνωμοδότηση του ΑΣΥΓΕΦ για το 1^ο θέμα της 2ης/28-2-2011 Συνεδρίασής του.
8. Το από 21-9-2010 Υπηρεσιακό σημείωμα με θέμα : Οικοτοξικολογικός έλεγχος των νικοτινοειδών (εντομοκτόνα) ως προς την σήμανση για τις μέλισσες (εφαρμογές με ψεκάσμο καλύψεως ή ριζοπότισμα)
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/7.9.2010 (ΦΕΚ 154/Α΄/7-9-2010) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Τη με αριθ. 271752/21.10.2010 (Β΄ 1673) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για “ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ελένη – Μαρία Αποστολάκη και Ιωάννη Κουτσούκο”.
11. Την από 17-12-2007 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α Να χορηγηθεί οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το ΠΔ 115/97, άρθρο 4 παρ.(1), στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **AXORIS ENDOM SPRAY** της εταιρείας **COMPO ΕΛΛΑΣ ΑΕ** με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

14361

13-4-2011

30-4-2019

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

AXORIS ENDOM SPRAY

1.2.β Μορφή:

Ετοιμόχρηστο υδατικό διάλυμα (AL)

1.3 Δραστική ουσία

α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

thiamethoxam
(χημική ομάδα
νεονικοτινοειδών)

abamectin
(χημική ομάδα: avermectins)

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

thiamethoxam: 98 % (β/β) min

abamectin: 90% (β/β) min

γ) Παρασκευαστής των δ.ο.:

thiamethoxam / abamectin:
Syngenta Crop Protection AG
Ελβετίας

δ) Εργοστάσια παρασκευής των δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. thiamethoxam

α) DSM Chemie Linz Αυστρία

β) Syngenta Ltd India

γ) AlzChem Trostberg GmbH Γερμανία

2.abamectin

North China Pharmaceutical Group AINO Co Ltd, Κίνα.

(οι Δ/νσεις των εργοστασίων είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας)

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας thiamethoxam προσδιορίζονται στο Τμήμα J της αίτησης με ημερομηνία 24-6-2008 (Α.Π. Υ.Α.Α.Τ.122624), και της δραστικής ουσίας abamectin προσδιορίζονται στο Τμήμα J της αίτησης με ημερομηνία 24-04-2009 (Α.Π. Υ.Α.Α.Τ. 128248) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης

COMPO ΕΛΛΑΣ ΑΕ
Αιγιαλείας 54, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ. : 211 1769100
Φαξ : 211 1769150
e-mail: info@compo.gr

Υπεύθυνη επικοινωνίας:
Ευτυχία Ε. Λεφάκη
Σωκράτους 12, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα
Τηλ: 210 93 41 976
Fax: 210 93 41 976
E-mail: lefakief@otenet.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης)

Ο κάτοχος της έγκρισης

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

COMPO GmbH & Co. KG, Γερμανία

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
COMPO GmbH & Co. KG, Γερμανία

(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας)

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

COMPO GmbH & Co. KG, Γερμανία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία thiamethoxam 0.01% (β/ο) + abamectin 0.0015% (β/ο)
Βοηθητικές ουσίες 99,99 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στο Τμήμα J της αίτησης με ημερομηνία 17-12-2007 (αρ. πρωτ.ΥΑΑκΤ 125037), αναγράφεται στο Part C της έκθεσης αξιολόγησης (registration report) και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

2

Συσκευασίες

2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Μικρό ψεκαστηράκι χειρός με σκανδάλη	500 κ.εκ.	Φιάλη: COEX HDPE Σκανδάλη: Πλαστικό
2	Δίδυμο σύστημα ψεκασμού (δύο χώρων), σακούλα με σύστημα βαλβίδας (Bag on valve system), Εξωτερική φιάλη με λαιμό, εσωτ. σακούλα με το ετοιμόχρηστο σκεύασμα. Ο χώρος μεταξύ της σακούλας και της φιάλης είναι γεμάτος με πεπιεσμένο αέρα	200, 300, 400 κ.εκ.	Εξωτερική φιάλη: Κασσίτερος Εσωτερική σακούλα: Polypropylene-OPA-Aluminium-Polyethylene Βαλβίδα: Από POM Polyacetal Πώμα :Από πλαστικό Polypropylene

<p>3 Οδηγίες χρήσης:</p>	<p>Προορίζεται μόνο για ερασιτέχνες χρήστες</p> <p>Τρόπος εφαρμογής Το εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο AXORIS ENDOM SPRAY (AL) είναι ένα ετοιμόχρηστο σκεύασμα. Εφαρμόζεται με ασφάλεια και ευκολία από τον ερασιτέχνη χρήστη σε μικρή κλίμακα χωρίς να χρειάζεται προετοιμασία του ψεκαστικού διαλύματος ή του διαλύματος για ριζοπότισμα και χρήση άλλων ψεκαστικών μηχανημάτων. Εφαρμόζεται α) με ψεκασμό φυλλώματος β) με ριζοπότισμα.</p> <p>Τρόπος παρασκευής διαλύματος (ψεκαστικού υγρού) : --</p> <p>Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας: Στα κενά υλικά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, εφόσον αυτό είναι δυνατό, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας</p>
---------------------------------	---

<p>4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:</p>	<p>Το AXORIS ENDOM SPRAY (AL) είναι ένα ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο σκεύασμα, το οποίο περιέχει thiamethoxam (διασυστηματικό) με εντομοκτόνο δράση (κυρίως) και abamectin (επαφής και στομάχου) με ακαρεοκτόνο δράση (κυρίως).</p> <p>Η δραστική ουσία thiamethoxam είναι διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου της ομάδας των νεονικοτινοειδών. Η εντομοκτόνος δράση του οφείλεται στη δέσμευση των υποδοχέων της ακετυλοχολίνης που υπάρχουν στις συνάψεις του περιφερειακού νευρικού συστήματος των εντόμων. Εισέρχεται στα φυτά από τα φύλλα και τις ρίζες και μεταφέρεται ακροπεταλικά. Καταπολεμά μασητικά και μυζητικά έντομα.</p> <p>Η δραστική ουσία abamectin είναι ακαρεοκτόνο-εντομοκτόνο επαφής και στομάχου. Δρα κατά των ακμαίων και νυμφών. Δεν έχει ωοκτόνο δράση. Έχει διελασματική και περιορισμένη διασυστηματική κίνηση.</p>
--	---

5

5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο εφαρμογή	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά έτος
		κ. εκ. / m ² ή κ. εκ. / λίτρο γλαστρικού χώματος		
Καλλωπιστικά σε γλάστρες και ζαρντινιέρες, εσωτερικού χώρου, βεράντας, αίθριων, ταράτσας και άλλων κλειστών σχετικά και προστατευμένων χώρων	<p>Αφίδες (<i>Aphis fabae</i>, <i>Aphis gossypii</i>, <i>Myzus persicae</i>, <i>Myzus nicotianae</i>, <i>Rhopalosiphum padi</i>, <i>Macrosiphum rosae</i>)</p> <p>Αλευρώδεις (<i>Trialeurodes vaporarium</i>, <i>Bemisia tabaci</i>, <i>Aleurodes</i> spp.)</p> <p>Ψευδόκοκκοι (<i>Pseudococcus</i> sp., <i>Planococcus citri</i>, <i>Nipaecoccus filamentosus</i>)</p> <p>Ψώρες (<i>Parlatoria</i> spp., <i>Coccus hesperidum</i>)</p> <p>Θρίπες (<i>Frankliniella occidentalis</i>, <i>Thrips</i> spp.)</p> <p>Λιριόμυζα (<i>Liriomyza</i> spp.)</p> <p>Ακάρεα (<i>Tetranychus urticae</i>, <i>Tetranychus cinnabarinus</i>, <i>Tetranychus</i> spp.)</p> <p>Cacyreus marshalli</p>	<p>Ανάλογα με το ύψος των φυτών υπολογίζονται κατά προσέγγιση οι εξής δόσεις εφαρμογής σε κ.εκ. / m² :</p> <p>α) Ύψος έως 50 εκ: 40-60 β) Ύψος 50-125 εκ: 60-80 γ) Ύψος >125 εκ.: 80-100</p>	Ομοίομορφος ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής ⁽¹⁾	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται

Πεδίο εφαρμογή	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά έτος
		κ. εκ. / m ² ή κ. εκ. / λίτρο γλαστρικού χώματος		
Καλλωπιστικά σε γλάστρες και ζαρντινιέρες, εσωτερικού χώρου, βεράντας, αίθριων, ταράτσας και άλλων κλειστών σχετικά και προστατευμένων χώρων	Θρίπες <i>(Frankliniella occidentalis, Thrips spp.)</i> Αλευρώδεις <i>(Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci, Aleurodes spp.)</i> Ψευδόκοκκοι <i>(Pseudococcus sp., Planococcus citri, Nipaecoccus filamentosus)</i> Ψώρες <i>(Parlatoria spp., Coccus hesperidum)</i> Σκιαρίδες μύγες Sciarids	50 κ.εκ. ανά λίτρο γλαστρικού χώματος	Ριζοπότισμα ⁽²⁾ με την έναρξη της προσβολής	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται
	Αφίδες <i>(Aphis fabae, Aphis gossypii, Myzus persicae, Myzus nicotianaе, Rhopalosiphum padi, Macrosiphum rosae)</i>	25 κ.εκ. ανά λίτρο γλαστρικού χώματος		

Πεδίο εφαρμογή	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά έτος
		κ. εκ. / m ² ή κ. εκ. / λίτρο γλαστρικού χώματος		
Καλλωπιστικά εξωτερικού χώρου στον κήπο	Αφίδες <i>(Aphis fabae, Aphis gossypii, Myzus persicae, Myzus nicotiana, Rhopalosiphum padi, Macrosiphum rosae)</i> Αλευρώδεις <i>(Trialeurodes vaporarium, Bemisia tabaci, Aleurodes spp.)</i> Τζιτζικάκια <i>(Cicada spp., Empoasca vitis, Cicadula spp., Chlorita biguttula)</i> Ψώρες <i>(Parlatoria spp., Coccus hesperidum)</i> Λιριόμυζα <i>(Liriomyza spp.)</i> Ακάρεα <i>(Tetranychus urticae, Tetranychus cinnabarinus, Tetranychus spp.)</i> Φυλλοφάγα Υμενόπτερα	<p>Ανάλογα με το ύψος των φυτών υπολογίζονται κατά προσέγγιση οι εξής δόσεις εφαρμογής σε κ.εκ. / m² :</p> <p>α) Ύψος έως 50 εκ: 40-60 β) Ύψος 50-125 εκ: 60-80 γ) Ύψος >125 εκ.: 80-100</p>	<p>Ομοιόμορφος ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής</p>	<p>Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται</p>

Παρατηρήσεις

1. Για την καλύτερη καταπολέμηση των θριπών φροντίστε να ψεκαστεί και η κάτω πλευρά των φύλλων. Να φροντίζετε να γίνεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη του φυλλώματος των φυτών αποφεύγοντας την απορροή.
2. Εφαρμογή με ριζοπότισμα:
Το χώμα της γλάστρας πρέπει να είναι ελαφρά υγρό για την εφαρμογή με ριζοπότισμα. Μετά το ριζοπότισμα, ποτίστε τα φυτά φροντίζοντας το νερό να είναι μόνο τόσο όσο μπορεί να απορροφηθεί από το χώμα της γλάστρας.

Για ορθή εφαρμογή υπολογίστε προηγουμένως τον όγκο του χώματος της γλάστρας με βάση τον παρακάτω βοηθητικό πίνακα :

Διάμετρος γλάστρας	Όγκος χώματος κατά προσέγγιση
Έως 14 εκ.	1 λίτρο
Έως 17 εκ	2 λίτρα
Έως 19 εκ	3 λίτρα
Έως 21 εκ	4 λίτρα
Έως 23 εκ	5 λίτρα
Έως 27 εκ	8 λίτρα
Έως 28 εκ	10 λίτρα

Διάρκεια προστασίας: Υπό συνθήκες μεγάλης πίεσης προσβολής η διάρκεια προστασίας είναι περίπου 30 έως 42 ημέρες

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

ΝΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

- Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα όταν οι μέλισσες είναι σε φάση έντονης κινητικότητας.
- Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα κατά την περίοδο της άνθισης.

Διαχείριση ανθεκτικότητας --

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό για τα περισσότερα είδη καλλωπιστικών όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως

Επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι φυτοτοξικό σε φύλλα Διεφενμπάχιας (*Dieffenbachia*), Σπαθίφυλλου (*Spathiphyllum*), Βιγκόνιας (*Begonia*), Φτέρης (*fern*) και Γαριφαλιάς (*Dianthus*) και σε άνθη Καλανχόης (*Kalanchoe*) και Αζαλέας (*Azalea*), δεν συνιστάται η εφαρμογή του σε αυτά.

9 Σήμανση
σκευάσματος:

N-Επικίνδυνο για το περιβάλλον

10 Φράσεις R

R50/53- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

11 Φράσεις S

S 1/2- Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά
S13 - Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
S20/21- Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε

“Κατά την εφαρμογή, συνιστάται η χρήση γαντιών ”

S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα.

S61 Αποφύγετε τη ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες /δελτίο δεδομένων ασφαλείας

SP1 ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Spe8 Τοξικό για τις μέλισσες.

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο**Πρώτες βοήθειες**

Γενική υπόδειξη: Να αφαιρέσετε αμέσως όλα τα ρούχα που ήρθαν σε επαφή με το ψεκαστικό υγρό και να τα πλύνετε πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. **Αν υποψιάζεστε δηλητηρίαση καλέστε αμέσως γιατρό.**

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε καλά με σαπούνι και άφθονο νερό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα αμέσως και πιείτε άφθονο νερό, καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον παθόντα σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια καλά με άφθονο καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210 7793777

13**13.1** Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRL's)

thiamethoxam/abamectin

Φυτά ή φυτικά προϊόντα / Ζωϊκά προϊόντα	MRL (mg/kg)
Έχουν οριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά υπολείμματα οριστεί με τον Κανονισμό 396/2005	

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Καλλωπιστικά	Μη εφαρμόσιμο

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο, μακριά από άμεσο ηλιακό φως και σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C και 25 °C.

15 Στο Παράρτημα I (Annex I) του registration report καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα έγκριση κυκλοφορίας. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

16 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

B

Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά..

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ι. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ

Δ – 7 (GAP)**ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ**

Γεωργικό (ά) Φάρμακο (ά) (κοινή ονομασία) : **thiamethoxam & abamectin**
 EEC No (α) :
 Εμπορικό (ά) όνομα (τα) : **AXORIS ENDOM SPRAY**
 Κύρια χρήση π.χ. εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο : **Εντομοκτόνο**

Σελίδες :
 Χώρα : **ΕΛΛΑΔΑ**

Καλλιέργεια Και/ή Συνθήκες χρήσης	Κράτος Μέλος ή χώρα	Εμπορικό όνομα του σκευά σματος	Α Θ ή Κ	Εχθρός, ομάδα εχθρών που ελέγχονται	Σκεύασμα		Εφαρμογή				Δοσολογία ανά επέμβαση			ΡΗΙ (ημέ ρες)	Πα ρατ ηρή σει ς
					Μορφή	Περιεκ σε δ.ο.	Μέθοδος/ τρόπος	Στάδιο Ανάπτυξης και εποχή	Αριθμ ός Ελάχ. Μεγ.	Μεσο διά στημα εφαρμο γών (ελάχ.)	Λίτρα σκευάσματος ανά εκτάριο ελάχ. -μεγ.	Όγκος υγρού λίτρα /εκτάριο ελάχ. μεγ.	γρ. δ.ο. ανά εκτάριο ελάχ. μεγ.		
(α)			β)	(γ)	(δ-στ)	(θ)	(στ-η)	(ι)	(κ)				(λ)	(μ)	

ΑΔΑ: 4ΑΓΥΒ-Ψ

Καλλιέργεια Και/ή Συνθήκες χρήσης	Κράτος Μέλος ή χώρα	Εμπορικό όνομα του σκευά σματος	Α Θ ή Κ	Εχθρός, ομάδα εχθρών που ελέγχονται	Σκεύασμα		Εφαρμογή				Δοσολογία ανά επέμβαση			PHI (ημέ ρες)	Πα ρατ ηρή σει ς
					Μορφή	Περιεκ σε δ.ο.	Μέθοδος/ τρόπος	Στάδιο Ανάπτυξης και εποχή	Αριθμ ός Ελάχ. Μεγ.	Μεσο διά στημα εφαρμο γών (ελάχ.)	Λίτρα σκευάσματος ανά εκτάριο ελάχ.-μεγ.	Όγκος υγρού Λίτρα /εκτάριο ελαχ. μεγ.	γρ. δ.ο. ανά εκτάριο ελάχ. μεγ.		
(α)			β)	(γ)	(δ-στ)	(θ)	(στ-η)	(ι)	(κ)						
Καλλωπιστικά σε γλάστρες και ζαρντιέρες , εσωτερικού χώρου, βεράντας, αίθριων, ταράτσας κ.α κλειστών σχετικά και προστατευμένων χώρων	Ελλάδα	AXORIS ENDOM SPRAY	Κ	Αφίδες <i>Aphis fabae</i> , <i>Aphis</i> . <i>gossypii</i> , <i>Myzus</i> <i>persicae</i> , <i>Myzus</i> <i>nicotiana</i> , <i>Rhopalosiphum padi</i> , <i>Macrosiphum rosae</i> Αλευρώδεις <i>Trialeurodes</i> <i>varporarium</i> , <i>Bemisia tabacci</i> , <i>Aleurodes spp</i> Ψευδοκοκκοί <i>Pseudococcus sp.</i> , <i>Planococcus citri</i> , <i>Nipaecoccus</i> <i>filamentosus</i> Ψώρες <i>Parlatoria spp.</i> , <i>Coccus hesperidum</i> Θρίπες <i>Thrips spp.</i> , <i>Frankliniella</i> <i>occidentalis</i> Λιρίμυζα <i>Liriomyza spp.</i> Ακάρεα <i>Tetranychus</i> <i>urticae</i> , <i>T.</i> <i>cinnabarinus</i> , <i>Tetranychus spp.</i> <i>Cacyreus marshalli</i>	Υδατι κό διάλυ μα AL	Thiamethoxam 0,1 g δ.ο. ανά λίτρο σκευάσματος + Abamectin 0,015 g δ.ο. ανά λίτρο σκευάσματος	Ομοιόμορφος ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος φροντίζοντας να γίνει καλή διαβροχή των φυτών. Χρησιμοποιείστε το ειδικό ψεκαστηράκι χειρός η το σύστημα ψεκασμού με βαλβίδα της COMPO, που περιέχουν το ετοιμόχρηστο προϊόν.	Εφαρμο γή με την έναρξη της προσβο λής	1-3	10-14 ημέρες	400-1000 Ανάλογα με το ύψος των φυτών 40 έως 100 ml/m²	Δεν έχει εφαρμο γή	40-100 Thiamethoxa m + 6-15 Abamectin Σημείωση: Σε g/m ² Αντίστοιχα 0.004-0.01 thiamethoxa m + 0.0006 - 0.0015 abamectin	-	*

ΑΔΑ: 4ΑΓΥΒ-Ψ

Καλλέργεια Και/ή Συνθήκες χρήσης	Κράτος Μέλος ή χώρα	Εμπορικό όνομα του σκευά- σματος	Α Θ ή Κ	Εχθρός, ομάδα εχθρών που ελέγχονται	Σκευάσμα		Εφαρμογή				Δοσολογία ανά επέμβαση			PHI (ημέ- ρες)	Πα- ρατ- ηρή- σει- ς
					Μορφή	Περιε- σε δ.ο.	Μέθοδος/ τρόπος (στ-η)	Στάδιο Ανάπτυξης και εποχή	Αριθμ ός Ελάχ. Μεγ.	Μεσο διά- στημα εφαρμο- γών (ελάχ.)	Λίτρα σκευάσματος ανά εκτάριο ελάχ. -μεγ.	Όγκος ψεκ. υγρού Λίτρα /εκτάριο ελαχ. μεγ.	γρ. δ.ο. ανά εκτάριο ελάχ. μεγ.		
(α)			β)	(γ)	(δ-στ)	(θ)		(ι)	(κ)				(λ)		(μ)
Καλλοπιστικά, σε γλάστρες και ζαρντιέρες, εσωτερικού χώρου, βεράντας, αίθριων, ταράτσας κ.α κλειστών σχετικά και προστατευμένων χώρων	Ελλάδα	AXORIS ENDOM SPRAY	Κ	Θρίπες <i>Thrips spp., Frankliniella occidentalis</i>	Υδατι- κό διάλυ- μα AL	Thiamethoxam 0,1 g δ.ο. ανά λίτρο σκευάσματος + Abamectin 0,015 g δ.ο. ανά λίτρο σκευάσματος	Ριζοπότισμα	Εφαρμο- γή με την έναρξη της προσβο- λής	1-3	10-14 ημέρες	Προϊόν ανά λίτρο γλαστρικού γώματος (ml/l) 50 ml	Δεν έχει εφαρμο- γή	gr δ.ο. ανά λίτρο γλαστρικού γώματος 0,005 g δ.ο. / L εδάφους thiamethoxa m + 0,00075 g δ.ο. / L εδάφους abamectin	-	*
				25 ml							0,0025g δ.ο. / L εδάφους thiamethoxa m + 0,000375 g δ.ο. / L εδάφους abamectin				

ΑΔΑ: 4ΑΓΥΒ-Ψ

Καλλιέργεια Και/ή Συνθήκες χρήσης	Κράτος Μέλος ή χώρα	Εμπορικό όνομα του σκευά σματος	Α Θ ή Κ	Εχθρός, ομάδα εχθρών που ελέγχονται	Σκεύασμα		Εφαρμογή				Δοσολογία ανά επέμβαση			ΡΗΙ (ημέ ρες)	Πα ρατ ηρή σει ς
					Μορφή	Περιεκ σε δ.ο.	Μέθοδος/ τρόπος	Στάδιο Ανάπτυξης και εποχή	Αριθμ ός Ελάχ. Μεγ.	Μεσο διά στημα εφαρμο γών (ελάχ.)	Λίτρα σκευάσματος ανά εκτάριο ελάχ. -μεγ.	Όγκος υγρού Λίτρα /εκτάριο ελαχ. μεγ.	γρ. δ.ο. ανά εκτάριο ελάχ. μεγ.		
(α)			β)	(γ)	(δ-στ)	(θ)	(στ-η)	(ι)	(κ)					(λ)	(μ)

ΑΔΑ: 4ΑΓΥΒ-Ψ

Καλλιέργεια Και/ή Συνθήκες χρήσης	Κράτος Μέλος ή χώρα	Εμπορικό όνομα του σκευά- σματος	Α Θ ή Κ	Εχθρός, ομάδα εχθρών που ελέγχονται	Σκεύασμα		Εφαρμογή				Δοσολογία ανά επέμβαση			ΡΗΙ (ημέ- ρες)	Πα- ραρ- τή- σει- ς
					Μορφή	Περιεκ- σε δ.ο.	Μέθοδος/ τρόπος	Στάδιο Ανάπτυξης και εποχή	Αριθμ ός Ελάχ. Μεγ.	Μεσο διά- στημα εφαρμο- γών (ελάχ.)	Λίτρα σκευάσματος ανά εκτάριο ελάχ. -μεγ.	Όγκος υγρού Λίτρα /εκτάριο ελαχ. μεγ.	γρ. δ.ο. ανά εκτάριο ελάχ. μεγ.		
(α)			β)	(γ)	(δ-στ)	(θ)	(στ-η)	(ι)	(κ)						
Καλλωπιστικά, εξωτερικού χώρου, στον κήπο	Ελλάδα	AXORIS ENDOM SPRAY	A	Αφίδες , <i>Aphis fabae</i> , <i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i> , <i>Myzus nicotiana</i> , <i>Rhopalosiphum padi</i> , <i>Macrosiphum rosae</i> Αλευρόδεις <i>Trialeurodes</i> <i>varporarium</i> , <i>Bemisia tabaci</i> , <i>Aleurodes spp</i> Τζιτζικάρια <i>Cicada spp.</i> , <i>Empoasca vitis</i> , <i>Cicadula spp.</i> , <i>Chlorita biguttula</i> Ψόρες <i>Parlatoria spp.</i> , <i>Coccus hesperidum</i> Λιριόμυζα <i>Liriomyza spp.</i> Ακάρεα <i>Tetranychus urticae</i> , <i>Tetranychus cinnabarinus</i> , <i>Tetranychus spp</i> Φυλλοφάγα υμενόμετρα	Υδατι- κό διάλυ- μα AL	Thiamethoxam 0,1 g δ.ο. ανά λίτρο σκευάσματος + Abamectin 0,015 g δ.ο. ανά λίτρο σκευάσματος	Ομοιόμορφος ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος φροντίζοντας να γίνει καλή διαβροχή των φυτών. Χρησιμοποιείστε το ειδικό ψεκαστηράκι χειρός ή το σύστημα ψεκασμού με βαλβίδα της COMPO, που περιέχουν το ετοιμόχρηστο προϊόν.	Εφαρμο- γή με την έναρξη της προσβο- λής	1-2	10-14 ημέρες	400-1000 Ανάλογα με το ύψος των φυτών 40 έως 100 ml/m²	Δεν έχει εφαρμο- γή	40-100 thiamethoxa m + 6-15 abamectin Σημείωση: Σε g/m ² Αντίστοιχα 0.004-0.01 thiamethoxa m + 0.0006 - 0.0015 abamectin	-	*