



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 8 - 6 - 2011
 Αριθ. πρωτ: 97680

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
 Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
 TELEFAX: 210 92 12 090
 Πληροφορίες: Λ. Σωτηροπούλου
 Τηλέφωνο: 210 92 87 244
 e-mail: syg035@minagric.gr

Προς: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ
 ΑΕΒΕ
 Εθνικής Αντιστάσεως 73
 152 31 - Χαλάνδρι
 (με απόδειξη)

- Κοιν.: 1. Γραφείο Υπουργού
 κ. Κ. Σκανδαλίδη
 2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
 κ. Ι. Κουτσούκου
 3. Περιφερειακές Ενότητες
 Δ/σεις Αγροτικής Οικονομίας
 κ' Κτηνιατρικής (με e-mail)
Έδρες τους
 4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
 Ινστιτούτο
 Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
 Φαρμάκων
 Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά
 5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους
 6. ΕΣΥΦ
 Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα
 7. Εσωτερική διανομή:
 -Τμήματα Β', Γ' & Ε' της
 Δ/σής μας
 -Γραμματεία της Δ/σής μας
 8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων
 Λιδότου 26, Αθήνα

ΘΕΜΑ: "Τροποποίηση της αριθ. 7566 οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) LINAGAN 50 SC ως προς το φάσμα δράσης "

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) με τίτλο «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτής.
2. Τη με αριθ. **126219/23-12-2008** Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. **7566** οριστική έγκριση διάθεση στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **LINAGAN 50 SC**, τη με αριθ. **131165/20-8-2009** Απόφασή μας με την οποία τροποποιήθηκε η εν λόγω έγκριση καθώς και τη με αριθ. **182639/17-3-2010** Απόφασή μας με την οποία τροποποιήθηκε η εν λόγω έγκριση ως προς το εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας linuron.
3. Το από 3-5-2011 Υπηρεσιακό σημείωμα της ομάδας αξιολόγησης υπολειμμάτων της Υπηρεσίας μας.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/7.9.2010 (ΦΕΚ 154/Α'/7-9-2010) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τη με αριθ. 271752/21.10.2010 (Β' 1673) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για "ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ελένη – Μαρία Αποστολάκη και Ιωάννη Κουτσούκο".

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. **7566** οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) **LINAGAN 50 SC** που τροποποιήθηκε με την αριθ. **131165/20-8-2009** Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς το **φάσμα δράσης**.

Συγκεκριμένα το σημείο **5 (φάσμα δράσης)** διαμορφώνεται ως εξής:

5		5.1 Φάσμα δράσης			
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο
		Κ.εκ. σκ./στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα/στρ.		
Πράσο	<i>Καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων & αγρωστωδών ζιζανίων</i>	100-140	30-60	Μεταφυτρωτικά: όταν η καλλιεργεία βρίσκεται στο στάδιο των 3-5 φύλλων και τα ζιζάνια είναι μικρά (μέχρι 5 εκ.).	1
Σπαράγγι	<i>Καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων & αγρωστωδών ζιζανίων</i>	100-150	15-40	Προφυτρωτικά: α) είτε στην επιφάνεια των σαμαριών μετά την κατασκευή τους, πριν την κάλυψη με πλαστικό. β) είτε στην επιφάνεια του ισοπεδωμένου εδάφους (μετά το τέλος της συγκομιδής και την καταστροφή των σαμαριών), το αργότερο μέχρι τέλη Ιουλίου (μέχρι και το στάδιο BBCH 08).	1
Αγκινάρα	<i>Καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων & αγρωστωδών ζιζανίων</i>	90-140	15-40	Προφυτρωτικά: πριν το φύτευμα της καλλιεργείας και των ζιζανίων.	1
Ηλιάνθος	<i>Καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων & αγρωστωδών ζιζανίων</i>	100-140	30-50	Προφυτρωτικά: αμέσως μετά την σπορά.	1
Πατάτα	<i>Καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων & αγρωστωδών ζιζανίων</i>	150-190	30-50	α) Προφυτρωτικά: μετά την φύτευση και πριν φυτρώσει η καλλιεργεία και τα ζιζάνια. β) μεταφυτρωτικά: με κατευθυνόμενο ψεκάσμο μεταξύ των γραμμών μετά το παράχωμα των πατατόφυτων.	1

Αραβόσιτος	Καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων & αγρωστωδών ζιζανίων	100-190	30-50	Προφυτρωτικά: αμέσως μετά την σπορά.	1
Γλαδίολος και Φθινοπωρινά βολβώδη (Τουλίπες, Ίριδες, Νάρκισσοι και Ζουμπούλια)	Καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων & αγρωστωδών ζιζανίων	150-190	40-60	Προφυτρωτικά: μετά την φύτευση των βολβών και πριν φυτρώσει η καλλιέργεια και τα ζιζάνια.	1

Η χρήση στο καρότο θα χορηγηθεί σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ μόνο εφόσον το MRL καθορισθεί στον κανονισμό 396/2005 σε 0.5 mg/kg αντί του υφιστάμενου 0.2 mg/kg. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή.

Καρότο	Καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων & αγρωστωδών ζιζανίων	100-190	40-50	α) Προφυτρωτικά: αμέσως μετά την σπορά.	1
		150-190		β) Μεταφυτρωτικά: μετά το στάδιο των 4 φύλλων του καρότου και εφόσον τα ζιζάνια είναι μικρά (μέχρι 5 εκ).	

Παρατηρήσεις:

- α) Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα στο φύτευμα ή όταν είναι μικρά.
β) Οι μεγαλύτερες δόσεις για τα βαριά εδάφη.

Καταπολεμούμενα ζιζάνια:

Ανθεμίδα (*Anthemis* spp.), Καφέλλα (*Capsella bursa-pastoris*), Λουβουδιά (*Chenopodium album*), Αγριομαργαρίτα (*Chrysanthemum segetum*), Κοινή παπαρούνα (*Papaver rhoeas*), Κοινή πόα (*Poa annua*), Λαπάτσα (*Polygonum lapathifolium*), Μαρτιάκος (*Senecio vulgaris*), Άγριο σινάπι (*Sinapis arvensis*), Ζωχός (*Sonchus oleraceus*), Στελλάρια (*Stellaria media*), Μικρή τσουκνίδα (*Urtica urens*), Αγριομελιτζάνα (*Xanthium strumarium*), Αγριοπαμπακιά (*Abutilon theophrasti*), Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis*), Αναγαλλίδα (*Anagallis arvensis*), Αναρριχώμενο πολύγωνο (*Bilderdykia convolvulus*), Αντράκλα (*Portulaca oleracea*), Ασπράγκαθο (*Xanthium spinosum*), Βλήτα (*Amaranthus spp*), Ήμερο σινάπι (*Sinapis alba*), *Lolium rigidum* (λεπτή ήρα), *Buglossoides arvensis* (λιθόσπερμο), *Papaver dubium* (μακρόκαρπη παπαρούνα), Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*), Νεροπιπεριά (*Polygonum hydropiper*), Πολύανθη ήρα (*Lolium multiflorum*), Ραπανίδα (*Rapahanus raphanistrum*), Σετάρια (*Setaria* spp.), Σπέργουλα (*Spergula* spp), Αγριοντοματιά (*Solanum nigrum*), Χαμομήλι (*Chamomilla recutita*).

Ανθεκτικά ζιζάνια:

Αγριόβικος (*Vicia* spp.), Αγριοβρώμη (*Avena* spp.), Αγριοράδικο (*Taraxacum* spp.), Αλεπονουρά (*Alopecurus myosuroides*), Δωδεκάνθι (*Lamium amplexicaule*), Καπνόχορτο (*Fumaria* spp.), Μεγαλόκαρπη κολλητσίδα (*Galium aparine*), Βερόνικα (*Veronica* spp.), Πολυκόμπι (*Polygonum aviculare*), Ρανούγκουλος. (*Ranunculus* spp.).

Π. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. **131165/20-8-2009** Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία τροποποιήθηκε η με αριθ. **7566** οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) **LINAGAN 50 SC** καθώς και η με αριθ. **182639/17-3-2010** Απόφασή μας με την οποία τροποποιήθηκε η εν λόγω έγκριση ως προς το εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας linuron.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Ι. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ

Δ – 7 (GAP)
ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Γεωργικό (ά) Φάρμακο (ά) (κοινή ονομασία)	: Linuron 50%	Σελίδες	
EEC No (α)	:	Χώρα	: ΕΛΛΑΔΑ
Εμπορικό (ά) όνομα (τα)	LINAGAN 50 SC		
Κύρια χρήση π.χ. εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο	Ζιζανιοκτόνο		

1	2	3	4	5	6		7				8			9	10
Καλλιέργεια Καυή Συνθήκες χρήσης	Κράτος Μέλος ή χώρα	Εμπορικό όνομα του σκευάσματος	(Α) (Θ) (Κ)	Εχθρός, ομάδα εχθρών ή ασθενειών ή ζιζανίων που ελέγχονται	Σκεύασμα		Εφαρμογή				Δοσολογία ανά επέμβαση			Τελευταία Επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες)	Παρατηρήσεις
(α)			(β)	(γ)	Μορφή (δ-στ)	Περιεκ σε δ.ο. (θ)	Μέθοδος/ τρόπος (στ-η)	Στάδιο Ανάπτυξης και εποχή (ι)	Αριθμός Εφαρμογών Ελάχ. Μεγ. (κ)	Χρονικό μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών (ελάχ.)	Χγρ δ.ο. / εκατόλιτρο ελάχ. μεγ.	λίτρα ψεκαστ. υγρού / εκτάριο ελάχ. μεγ.	Χγρ. δ.ο. /εκτάριο ελάχ. μεγ.	(λ)	(μ)
Πράσο	ΕΛΛΑΔΑ	LINAGAN 50 SC	A	Ετήσια αγρωστώδη & πλατύφυλλα ζιζάνια	SC	Linuron 500 g/lit	Ψεκασμός σε όλη την επιφάνεια του εδάφους	Μεταφρωτικά: όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στο στάδιο των 3-5 φύλλων και τα ζιζάνια είναι μικρά (μέχρι 5 εκ.).	1	-	-	300-600	0.5-0.7	-	-
Σπαράγγι	ΕΛΛΑΔΑ	LINAGAN 50 SC	A	Ετήσια αγρωστώδη & πλατύφυλλα ζιζάνια	SC	Linuron 500 g/lit	Ψεκασμός σε όλη την επιφάνεια του εδάφους	Προφυτωτικά α) είτε στην επιφάνεια των σαμαριών μετά την κατασκευή τους, πριν την κάλυψη με πλαστικό. β) είτε στην επιφάνεια του ισοπεδωμένου εδάφους (μετά το τέλος της συγκομιδής και την καταστροφή των σαμαριών), το αργότερο μέχρι τέλη Ιουλίου. (Μέχρι και το στάδιο BBCH 08)	1	-	-	150-400	0.5-0.75	-	-

ΑΔΑ: 4Α3ΚΒ-Ν

Αγκινάρα	ΕΛΛΑΔΑ	LINAGAN 50 SC	A	Ετήσια αγρωστώδη & πλατύφυλλα ζιζάνια	SC	Linuron 500 g/lit	Ψεκασμός σε όλη την επιφάνεια του εδάφους	Προφυτρωτικά: πριν το φύτευμα της καλλιέργειας και των ζιζανίων.	1	-	-	150-400	0.45-0.7	-	-
Ηλιάνθος	ΕΛΛΑΔΑ	LINAGAN 50 SC	A	Ετήσια αγρωστώδη & πλατύφυλλα ζιζάνια	SC	Linuron 500 g/lit	Ψεκασμός σε όλη την επιφάνεια του εδάφους	Προφυτρωτικά: αμέσως μετά τη σπορά.	1	-	-	300-500	0.5-0.7	-	-
Πατάτα	ΕΛΛΑΔΑ	LINAGAN 50 SC	A	Ετήσια αγρωστώδη & πλατύφυλλα ζιζάνια	SC	Linuron 500 g/lit	α. Ψεκασμός σε όλη την επιφάνεια του εδάφους β. Με κατευθυνόμενο ψεκασμό μεταξύ των γραμμών	α) Προφυτρωτικά: μετά τη φύτευση και πριν φυτρώσει η καλλιέργεια και τα ζιζάνια. β) Μεταφυτρωτικά: μετά το παράχωμα των πατατόφυτων.	1	-	-	300-500	0,75-0,95	-	-
Αραβόσιτος	ΕΛΛΑΔΑ	LINAGAN 50 SC	A	Ετήσια αγρωστώδη & πλατύφυλλα ζιζάνια	SC	Linuron 500 g/lit	Ψεκασμός σε όλη την επιφάνεια του εδάφους	Προφυτρωτικά: αμέσως μετά τη σπορά.	1	-	-	300-500	0.5-0.95	-	-
Γλαδιόλος και Φθινοπωρινά βολβώδη (Τουλίπες, Ίριδες, Νάρκισσοι και Ζουμπούλια)	ΕΛΛΑΔΑ	LINAGAN 50 SC	A	Ετήσια αγρωστώδη & πλατύφυλλα ζιζάνια	SC	Linuron 500 g/lit	Ψεκασμός σε όλη την επιφάνεια του εδάφους	Προφυτρωτικά: μετά τη φύτευση των βολβών και πριν φυτρώσει η καλλιέργεια και τα ζιζάνια.	1	-	-	400-600	0.75-0.95	-	-

ΑΔΑ: 4Α3ΚΒ-Ν

Η χρήση στην καλλιέργεια του καρότου θα χορηγηθεί σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ μόνο εφόσον το MRL καθοριστεί στον κανονισμό 396/2005 σε 0.5 mg/kg αντί του υφιστάμενου 0.2 mg/kg.

Καρότο	ΕΛΛΑΔΑ	LINAGAN 50 SC	Α	Ετήσια αγρωστώδη & πλατύφυλλα ζιζάνια	SC	Linuron 500 g/lt	Ψεκασμός σε όλη την επιφάνεια του εδάφους	Προφυτρωτικά: αμέσως μετά την σπορά.	1	-	-	400-500	0,5-0,95	-	-
								Μεταφυτρωτικά: μετά το στάδιο των 4 φύλλων του καρότου και εφόσον τα ζιζάνια είναι μικρά (μέχρι 5 εκ).				400-500	0,75-0,95		

Παρατηρήσεις: (α) Για τις καλλιέργειες, η ταξινόμηση της ΕΕ και του Codex (και τα δύο)

- θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Οπου βρίσκει εφαρμογή, οι συνθήκες χρήσης θα πρέπει να περιγράφονται (π.χ. καπνισμός των κατασκευών).
 (β) Ανοιχτού αγρού (Α), εφαρμογές σε θερμοκήπια (Θ), ή σε κλειστούς χώρους (Κ).
 (γ) πχ. Μασητικά και μυζητικά έντομα, έντομα εδάφους, έντομα φυλλώματος, ζιζάνια
 (δ) πχ. Βρέξιμη σκόνη (WP), γαλακτοποιήσιμο συμπύκνωμα (EC)
 (ε) GCPF Κώδικες – GIFAP Technical Monograph No 2, 1989.
 (στ) όλες οι χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες θα πρέπει να εξηγούνται
 (ζ) Μέθοδος πχ. Ψεκασμός υψηλού όγκου, σκονισμός.

- (η) Τρόπος. Πχ σ' όλη την επιφάνεια, από αέρος, στις γραμμές, ατομικά φυτά – ο τύπος του ψεκαστικού μηχανήματος θα πρέπει να προσδιορίζεται
 (θ) g/kg ή g/lt
 (ι) Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία εφαρμογή (BBCH Monograph, Growth Stages of Plants, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), περιλαμβάνοντας όπου βρίσκει εφαρμογή, πληροφορίες σχετικά με την εποχή κατά τον χρόνο εφαρμογής
 (κ) Ο ελάχιστος και ο μέγιστος δυνατόν αριθμός εφαρμογών υπό πρακτικές συνθήκες
 (λ) Ελάχιστο χρονικό μεσοδιάστημα πριν τη συγκομιδή
 (μ) Οι παρατηρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: οικονομική σημασία / περιορισμούς στη χρήση