



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Αθήνα, 8-11-2011
Αριθ. πρωτ: 102386**

**Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 72 11
e-mail: syg046@minagric.gr**

**Προς: SHARDA EUROPE b.v.b.a.
(δια του κ. Τουτουτζιδάκη
Αντώνιου, Τσιτουρή 22, 152 31
Χαλάνδρι)
(με απόδειξη)**

**ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ.
14312/04.11.2008 έγκρισης του
φυτοπροστατευτικού προϊόντος
(εντομοκτόνο) SHARIMIDA 20 SL,
ως προς την εγγραμμένη σύνθεση
(αλλαγή βοηθητικής ουσίας), τον
τρόπο και χρόνο εφαρμογής, τις
παρατηρήσεις του φάσματος
δράσης, τις φράσεις κινδύνου (R)
και τις φράσεις προφύλαξης (S)»**

**Κοιν.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής
Δ/σης Φυτικής Παραγωγής
5. Περιφερειακές Ενότητες
Δ/σεις Αγροτικής Οικονομίας
& Κτηνιατρικής (με e-mail)
6. Μ.Φ.Ι.
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων (με e-mail)
7. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους (με e-mail)
8. Ε.ΣΥ.Φ.
Πατησίων 53, 104 33 – Αθήνα
9. Εσωτερική διανομή:
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της
Δ/σής μας
10 Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων
Λιδότου 26, Αθήνα**

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κανονισμού 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 80.
2. Τις διατάξεις της με αριθ. 190688/10.11.2010 ΚΥΑ (Β' 1773) με θέμα την "Τροποποίηση του παραρτήματος Ι του Π.Δ. 115/1997 (Α' 104) όσον αφορά τους ιδιαίτερους όρους για τις ουσίες clothianidin, thiamethoxam, fipronil και imidacloprid, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2010/21/ΕΕ της Επιτροπής της 12^{ης} Μαρτίου 2010".

3. Το από 21/9/2010 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Ομάδας Οικοτοξικολογικού Ελέγχου φυτοπροστατευτικών προϊόντων της υπηρεσίας μας.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/7.9.2010 (ΦΕΚ 154/Α'7-9-2010) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τη με αριθ. 155540/30.6.2011 (Β' 1588) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για "ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Δριβελέγκα".
6. Τη σχετική αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας (αριθ. πρωτ. 189486/4.10.2010).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I.** Τροποποιούμε την με αριθ. **14312/04.11.2008** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **SHARIMIDA 20 SL**, η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 124329/04.11.2008 Απόφασή μας, τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 129347/3.6.2009 Απόφασή μας και τροποποιήθηκε-αναμορφώθηκε μετά την καταχώριση της δραστικής ουσίας imidacloprid στο παράρτημα I του Π.Δ. 115/97 με τη με αριθ. 188087/18.8.2010 Απόφασή μας, ως προς την εγγυημένη σύνθεση (αλλαγή βοηθητικής ουσίας), τον τρόπο και χρόνο εφαρμογής, τις παρατηρήσεις του φάσματος δράσης, τις φράσεις κινδύνου (R) και τις φράσεις προφύλαξης (S).
Συγκεκριμένα, οι παράγραφοι 1.4ζ, 5, 10 και 11 της με αριθ. 188087/18.8.2010 Απόφασής μας, διαμορφώνονται ως ακολούθως:

1.4ζ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Imidacloprid 20% β/ο
 Βοηθητικές ουσίες: 82,25% β/β
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος έχει υποβληθεί στην υπηρεσία μας με τη με αριθ. 189486/4.10.2010 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

5. Φάσμα δράσης:

Πεδίο εφαρμογής	Στόχοι	Δόσεις			Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα επεμβάσεων (ημέρες)
		Κ.εκ σκευάσματος /100 λίτρα ψ.υ.*	Όγκος ψεκ. Υγρού (Λίτρα/στρ.)	κ.εκ./στρ.		
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρεπ Φρουτ)	Επιώδης αλευρώδης <i>Aleurothrixus floccosus</i>	75	200-400	150-300	Απρίλιο – Σεπτέμβριο με την εμφάνιση των νυμφών του εντόμου (στάδιο L1 & L2)	2 / 20-30
	Φυλλοκνίστης <i>Phyllocnistis citrella</i>	50-75	200-400	100-300	Με την έναρξη της προσβολής	

Αχλαδιά	Ψύλλα αχλαδιάς <i>Cacopsylla</i> <i>pyri</i>	60	150	90	Με την έναρξη της προσβολής. Μπορεί να εφαρμοστεί στις εξής περιόδους: Προανθικά μέχρι το στάδιο έναρξης της λευκής κορυφής (BBCH: 54) και μετά την καρπόδεση έως την έναρξη αλλαγής χρώματος (BBCH 71- 79)	1
Ροδακινιά	Αφίδες <i>Myzus</i> <i>persicae</i> <i>M. nicotianae</i>	25-30	150-250	37.5-75	Με την εμφάνιση της προσβολής. Μπορεί να εφαρμοστεί στις εξής περιόδους: Προανθικά μέχρι το στάδιο έναρξης της ρόδινης κορυφής (BBCH: 54) και μετά την καρπόδεση έως την έναρξη αλλαγής χρώματος (BBCH 71- 79)	2 /28
Τομάτα υπαίθρου	Αφίδες <i>Macrosiphum</i> <i>euphorbiae</i> Αλευρώδης <i>Trialeurodes</i> <i>vaporariorum</i>	50	50-100	25-50	Με την έναρξη της προσβολής	2 /14
Τομάτα θερμοκηπίου	Αλευρώδης <i>Trialeurodes</i> <i>vaporariorum</i>	--	--	75 - 125*	Με το νερό της άρδευσης, με την έναρξη της προσβολής	2 /14
Αγγούρι (Υ/Θ)	Αλευρώδης <i>Trialeurodes</i> <i>vaporariorum</i>	--	--	75 -125*	Με το νερό της άρδευσης, με την έναρξη της προσβολής	2 /14
Βαμβάκι	Αφίδες <i>Aphis</i> <i>gossypii</i>	62,5-100	50-80	50	Με την έναρξη της προσβολής	2 /14

Πατάτα	Αφίδες <i>Macrosiphum euphorbiae</i> Δορυφόρος <i>Leptinotarsa decemlineata</i>	50-100	50-100	50	Με την έναρξη της προσβολής και μέχρι 4 αφίδες ανά φύλλο. Να μην εφαρμόζεται όταν υπάρχει μελίτωμα.	2 /14
Καπνός	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> <i>Myzus nicotianae</i>	25-60	50 – 100	25 – 30	Με την εμφάνιση της προσβολής	2 /20-30
		---	---	50- 100*	Με πότισμα κατά την μεταφύτευση	1

*: το εύρος των δόσεων εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης των φυτών και την ένταση της προσβολής

Παρατηρήσεις:

- 1 Στα εσπεριδοειδή σε προγράμματα "ολοκληρωμένης αντιμετώπισης" συνιστάται να εφαρμόζεται, όταν υπάρχει μικρός πληθυσμός ακμαίων του παρασίτου *Cales noacki* ωρίμων για ωοτοκία.
- 2 Στα εσπεριδοειδή σε περίπτωση προχωρημένης προσβολής (μικτός πληθυσμός, παρουσία μελιτωμάτων) ο ψεκάσμος επαναλαμβάνεται 20-30 ημέρες από τον προηγούμενο.
- 3 Στα εσπεριδοειδή για την καταπολέμηση του Φυλλοκνίστη (*Phyllocnistis citrella*) η μικρή δόση συνιστάται για μικρή πίεση προσβολής ενώ η μεγάλη δόση για μεγάλη πίεση προσβολής.
4. Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα όταν οι μέλισσες είναι σε φάση έντονης κινητικότητας.
5. Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα κατά την περίοδο της άνθησης.
6. Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα σε περίπτωση που εμφανίζεται μελίτωμα (π.χ. περισσότερο από 4 αφίδες ανά φύλλο).

10. Φράσεις R

R36/38 Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα
Sp8: **Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν Απομακρύνετε ή και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Βλαβερό για τα πουλιά.**

11. Φράσεις S

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S20/21 Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε
S23 Μην αναπνέετε ατμούς/εκνεφώματα
S25 Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.
S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή
S36/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και συσκευή προστασίας ματιών προσώπου
S51 Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο
 << Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης >>

Π. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 124329/04.11.2008 Απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε-αναμορφώθηκε με τη με αριθ. 188087/18.8.2010 Απόφασή μας και ισχύει σήμερα.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ