



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

28 - 12 - 2011

Αθήνα,

Αριθ. πρωτ: 103845

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87 161
e-mail: syg036@minagric.gr

Προς: Agrichem B.V.
Koopvaardijweg 9
4906 CV Oosterhout
The Netherlands
Δια μέσου της εταιρείας
ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΑΔΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Τσιτούρη 22 , 152 31- Χαλάνδρι
(με απόδειξη)

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης
διάθεσης στην αγορά στο
φυτοπροστατευτικό προϊόν
(ζιζανιοκτόνο) FINY ”

- Κοιν.:
1. Γραφείο Υπουργού
κου. Κ. Σκανδαλίδη
 2. Γραφείο Υφυπουργού
κ. Ι. Δριβελέγκα
 3. Περιφερειακές Ενότητες
Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής (με e-mail)
Έδρες τους
 4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά
 5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους
 6. ΕΣΥΦ
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα
 7. Εσωτερική διανομή:
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της
Δ/νσής μας
-Γραμματεία της Δ/νσής μας
 8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων
Λιδότου 26, Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

- Έχοντας υπόψη
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερο το άρθρο 80 αυτού.
 2. Τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.
 3. Τον Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
 4. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών
 5. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου , όπως τροποποιήθηκε με το SANCO doc.357 /rev.3/ 2008
 6. Την έγκριση του από την Ιταλία και την αξιολόγηση του Η.Β.
 7. Τη με αριθ. 454/2011 ατομική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με θέμα “αρμόδιες αρχές εφαρμογής του Κανονισμού 1107/2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά”, η οποία έγινε αποδεκτή από τον ΥΠΑΑΤ
 8. Το Π.Δ. 110/11.11.2011 (Α΄ 243) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 9. Τη με αριθ. 196018/25.11.2011 (Β΄ 2741) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για “ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Δριβελέγκα και Αστέριο Ροντούλη».
 10. Τις από 4-10-2010 και 3-6-2011 αιτήσεις του κ. Τουτουντζιδάκη Αντώνιου εκ μέρους της .εταιρείας Agrichem B.V. Ολλανδίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 80, του Κανονισμού 1107/2009 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **FINY** της εταιρείας Agrichem B.V. Ολλανδίας, με υπεύθυνο επικοινωνίας στη χώρα μας την εταιρεία. **ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε** με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

7966
28-12-2011
31-12-2015

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

FINY

1.2.β Μορφή

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)**1.3 Δραστική ουσία**

α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Metsulfuron-methyl (ομάδα σουλφονυλουριών)

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

Min 960 g/kg

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

Agrichem B.V. Koopvaardijweg 9 4906 CV Oosterhout The Netherlands Tel: +31 162 431 931 Fax: +31 162 456 797 Contact: Mrs. M. van Rijswijk, Regulatory Affairs Manager E-mail: m.vanrijswijk@agrichem.nl

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Atul Limited Agrochemicals Division , India η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).
--

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Metsulfuron-methyl όπως προσδιορίζονται στο Τμήμα J της αίτησης για οριστική έγκριση με ημερομηνία 4-10-2010 (Αρ. Πρ. Υ.Α.Α.Τ. 189485), και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής
--

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

Agrichem B.V.
Koopvaardijweg 9
4906 CV Oosterhout
The Netherlands
Tel: +31 162 431 931
Fax: +31 162 456 797
Contact: Mrs. M. van Rijswijk,
Regulatory Affairs Manager
E-mail: m.vanrijswijk@agrichem.nl

Υπεύθυνος επικοινωνίας στην Ελλάδα

ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Τσιτούρη 22 , 152 31- Χαλάνδρι
Τηλ.: 210-6725174
Fax : 210-6725174
E-mail: aconsult@otenet.gr
a.toutoutzidakis@yahoo.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης)

ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Τσιτούρη 22 , 152 31- Χαλάνδρι
Τηλ.: 210-6725174
Fax : 210-6725174
E-mail: aconsult@otenet.gr
a.toutoutzidakis@yahoo.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Agrichem B.V.
Koopvaardijweg 9
4906 CV Oosterhout
The Netherlands
Contact: Mr. F. Borges, CEO
Tel: +31 162 431 931
Fax: +31 162 456 797
E-mail: info@agrichem.nl

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
Agrichem B.V.
The Netherlands

(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).

Δ) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

Agrichem B.V.
The Netherlands

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Metsulfuron-methyl **20 % (β/β)**
Βοηθητικές ουσίες **79,17% β/β**

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στο Τμήμα J της αίτησης για οριστική έγκριση με ημερομηνία 4-10-2010 (Αρ. Πρ. Υ.Α.Α.Τ. 189485) και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

2

Συσκευασία(ες)

2.1 Συσκευασία(ες):δέκαπέντε (15)

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
	Πλαστικό βάζο με καπάκι ασφαλείας	15, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 400, 500 και 600 γραμ.	HDPE (καπάκι) polypropylene homopolymer(βάζο)

3

Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Τρόπος εφαρμογής: Μεταφυτρωτικός ψεκασμός με μπεκ τύπου σκούπας και με 30-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το ψεκαστικό μέσο μέχρι τη μέση με καθαρό νερό και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος, υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση καθ όλη την διάρκεια του ψεκασμού

Καθαρισμό ψεκαστήρα: για να αποφευχθούν ζημιές σε επόμενες καλλιέργειες διαφορετικές από τα σιτηρά, αμέσως μετά το ψεκασμό του FINY, ξεπλύνετε σχολαστικά το ψεκαστικό μηχάνημα, τόσο στο εσωτερικό του όσο και στα ακροφύσια και στα φίλτρα, με κατάλληλο καθαριστικό διάλυμα, ακλουθώντας την εξής διαδικασία:

1. Αμέσως μετά το ψεκασμό, αδειάστε τελείως το βυτίο και ξεπλύνετε σχολαστικά το εξωτερικό μέρος του ψεκαστικού μηχανήματος με καθαρό νερό.

2. Ξεπλύνετε το εσωτερικό μέρος του βυτίου με καθαρό νερό και κυκλοφορείστε το μέσα από όλα τα μέρη του ψεκαστικού μηχανήματος χρησιμοποιώντας τουλάχιστον 1/10 της συνολικής χωρητικότητας του βυτίου. Αδειάστε τελείως το βυτίο.

3. Γεμίστε το βυτίο μέχρι την μέση με καθαρό νερό και προσθέστε 1/3 λίτρου οικιακής αμμωνίας για κάθε 100 λίτρα νερού (τελική επιθυμητή συγκέντρωση 0.03%). Βάλτε σε λειτουργία το αναδευτήρα και αφήστε το διάλυμα να κυκλοφορήσει σε όλο το ψεκαστικό μηχάνημα.

Απογεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό και αφήστε το για 15 λεπτά με συνεχή ανάδευση. Αφήστε το διάλυμα να κυκλοφορήσει ξανά σε όλο το ψεκαστικό μηχάνημα και στην συνέχεια αδειάστε τελείως το βυτίο.

4. Αφαιρέστε τα φίλτρα και τα μπεκ και ξεπλύνετε τα ξεχωριστά με διάλυμα οικιακής αμμωνίας στην ίδια συγκέντρωση που χρησιμοποιήθηκε για το καθαρισμό του ψεκαστικού μηχανήματος.

5. Γεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό με τουλάχιστον 1/10 της συνολικής χωρητικότητας του και αφήστε το νερό να κυκλοφορήσει σε όλο το ψεκαστικό μηχάνημα . Αδειάστε τελείως το βυτίο.

6. Μη ρίχνετε ποτέ τα νερά του καθαρισμού σε ευαίσθητες καλλιέργειες ή σε εδάφη στα οποία πρόκειται να καλλιεργηθούν ευαίσθητες καλλιέργειες.

Συνδυαστικότητα: Το προϊόν δεν αναμιγνύεται με προϊόντα που περιέχουν δ.ο. tralkoxidim και με λιπάσματα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4	Κατηγορία και τρόπος δράσης:	<p>Εκλεκτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των σουλφονυλουριών καταπολεμά πλατύφυλλα ζιζάνια, μεταφωτρωτικά στις καλλιέργειες του Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, και Τριτικάλε. Δρα παρεμποδίζοντας το ένζυμο ALS, συνθετάση του οξειγαλακτικού. Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και σε πολύ μικρό βαθμό από τις ρίζες και στη συνέχεια μεταφέρεται τόσο με τον ανιόντα όσο και με τον κατιόντα χυμό. Μερικές μέρες μετά τον ψεκασμό η ανάπτυξη των καταπολεμούμενων ζιζανίων έχει ήδη σταματήσει και τα πρώτα συμπτώματα αρχίζουν να εμφανίζονται. Πλήρης νέκρωση επέρχεται σε διάστημα 4-6 εβδομάδων</p>
----------	------------------------------	--

5

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ (γραμ./στρ.)	Όγκο ψεκ. υγρού λίτρα/στρ	ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδο
Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Τριτικάλε	πλατύφυλλα Ζιζάνια (1)	2 - 3	30-40	Εφαρμογή νωρίς την άνοιξη από την αρχή του φυτρώματος (BBCH 12) μέχρι το σχηματισμό του 2 ^{ου} γόνατου (BBCH 32) και όταν τα ζιζάνια είναι ακόμα μικρά και βρίσκονται σε φάση γρήγορης ανάπτυξης	1

Παρατηρήσεις:**1. Καταπολεμούμενα ζιζάνια**

Stellaria media (στελλάρια), *Veronica persica*. (βερόνικα), *Papaver rhoeas* (παπαρούνα), *Capsella bursa-pastoris* (καψέλλα), *Viola tricolore* (αγριοπανσές), *Matricharia chamomilla* (Χαμομήλι), *Cirsium arvensis* (Κίρσιο), *Amaranthus retroflexus* (τραχύ βλήτο), *Rumex spp.* (λάπαθο) , *Lamium purpureum* (πορφυρό λάμιο), *Polygonum aviculare* (Πολυκόμπι), *Polygonum convolvulus* (Πολύγωνο),

6	Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί	<ol style="list-style-type: none"> 1. Μη ψεκάσετε όταν φυσάει και αντίθετα με τη φορά του ανέμου. 2. Κατά τον ψεκασμό δίνετε την απαραίτητη προσοχή ώστε να μη μεταφέρετε το ψεκαστικό υγρό σε γειτονικές ή ευαίσθητες καλλιέργειες (ιδίως πλατύφυλλες) 3. Να μην εφαρμόζεται με αεροψεκασμούς. 4 . Κατά την εφαρμογή, μην διπλοψεκάσετε τα άκρα των ζωνών.
----------	--	---

να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί	<p>5. Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.</p> <p>6. Πριν και μετά τον ψεκάσμο ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με άφθονο νερό. Εάν είναι δυνατόν χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για την εφαρμογή του προϊόντος</p> <p>7. Μην το χρησιμοποιείτε σε εδάφη με μεγάλο βαθμό έκπλυσης</p> <p>8. Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες υπό καταπόνηση, από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, έλλειψη θρεπτικών στοιχείων ή προσβολές εντόμων, κ.λπ.</p> <p>9. Να μην εφαρμόζεται εάν έχει προηγηθεί εφαρμογή ζιζανιοκτόνου της ίδιας ομάδας (σουλφονουλουρίες) ή ζιζανιοκτόνου ίδιου τρόπου δράσης, κατά την ίδια καλ/κή περίοδο</p>
------------------------------------	--

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

--

Σε περίπτωση αποτυχίας, εντός 3 μηνών μετά την εφαρμογή του προϊόντος, μην σπέρνετε ή φυτεύετε άλλη καλλιέργεια εκτός σιταριού ή κριθαριού και μετά από βαθιά άροση. Σε αυτή την περίπτωση μην κάνετε δεύτερη εφαρμογή του Finy .
Μην σπέρνετε ή φυτεύετε άλλη καλλιέργεια εκτός από σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, τριτικάλε, ελαιοκράμβη, ξηρά φασόλια ή γρασίδι μετά από καλλιέργεια σιτηρών στην οποία εφαρμόστηκε το Finy.

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μετά την εφαρμογή, περιμένετε 24 ώρες για να εισέλθετε στο χωράφι

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

- 9** Σήμανση σκευάσματος:

N – Επικίνδυνο για το περιβάλλον

10 Φράσεις R

R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιδράσεις για το υδάτινο περιβάλλον.

11 Φράσεις S

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
S13 Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S20/21 Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε
S36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
S60/61 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεση τους επικίνδυνα απόβλητα. Αποφύγετε την διάθεση του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες/ το δελτίο δεδομένων ασφαλείας
Sp1 Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του
SPe3 Για την προστασία των υδροβίων οργανισμών αφήσετε αμέσως μια ζώνη προστασίας 5 μ. από τα επιφανειακά ύδατα
« Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης »

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Σε περίπτωση εισπνοής: μεταφέρετε τον παθόντα στο καθαρό αέρα..
Σε περίπτωση κατάποσης : Πιείτε νερό. Καλέστε αμέσως γιατρό.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα που ρυπάνθηκαν ή βράχθηκαν.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με άφθονο νερό. Συμβουλευθείτε γιατρό.
 Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, θεραπεία συμπτωματική.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)
 Metsulfuron-methyl

Φυτικά προϊόντα	MRL's σε mg/kg
Έχουν καθοριστεί προσωρινά κοινοτικά MRLs στον Κανονισμό 396/2005	

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Δεν εφαρμόζεται	

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Να αποθηκεύεται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από θερμότητα και πηγές ανάφλεξης, Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

15 Στο Παράρτημα I (Annex I) του registration report καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα έγκριση κυκλοφορίας. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

16 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

Β**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού 1107/2009 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά..

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Ι. ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ

Δ - 7 (GAP)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Γεωργικό (ά) Φάρμακο (ά) (κοινή ονομασία)

Metsulfuron-methyl

Ημερομηνία:

Σεπτέμβριος 2010

EEC No (α)

Σελίδες :

Εμπορικό (ά) όνομα (τα)

FINY® 20 WG

Χώρα :

ΕΛΛΑΔΑ

Κύρια χρήση π.χ. εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο

ζιζανιοκτόνο

1	2	3	4	5	6		7				8			9	10
Καλλιέργεια Και/ή Συνθήκες χρήσης	Κράτος Μέλος ή χώρα	Εμπορικό όνομα του σκευάσματος	(Α) (Θ) ή (Κ)	Εχθρός, ομάδα εχθρών ή ασθενειών ή ζιζανίων που ελέγχονται	Σκεύασμα		Εφαρμογή				Δοσολογία ανά επέμβαση			Τελευταία Επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες)	Παρατη- ρήσεις
(α)			(β)	(γ)	Μορφή (δ-στ)	Περιεκ- σε δ.ο. (θ)	Μέθοδος/ τρόπος (στ-η)	Στάδιο Ανάπτυξης και εποχή (ι)	Αριθμός Εφαρμογών Ελάχ. Μεγ. (κ)	Χρονικό μεσοδιά- στημα μεταξύ των εφαρμογών (ελάχ.)	g δ.ο. / εκατόλιτρο ελάχ. μεγ.	λίτρα ψεκαστ. υγρού / εκτάριο ελάχ. μεγ.	g. δ.ο. /εκτάριο ελάχ. μεγ.	(λ)	(μ)
Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Τriticάλε	EL	FINY® 20 WG	A	Ετήσια και Πολυετή πλατύφυλλα ζιζάνια	WG	200 gr/kg	Ψεκασμός με μπεκ τύπου σκούπας	Μεταφωτροτικά, νωρίς την άνοιξη από την αρχή του φυτρώματος (BBCH 12) μέχρι το σηματισμό του 2ου γόνατου (BBCH 32) και όταν τα ζιζάνια είναι ακόμα μικρά και βρίσκονται σε φάση γρήγορης ανάπτυξης	1	-		300 - 400	4 - 6	Δ.Ε.	