



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 02 - 4 - 2013  
 Αριθ. πρωτ: 2395/26497

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
 Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
 TELEFAX: 210 92 12 090  
 Πληροφορίες: Μ. Γάσπαρη  
 Τηλέφωνο: 210 92 87 250  
 e-mail: [svg108@minagric.gr](mailto:svg108@minagric.gr)

Προς: Cereagri S.A.S. Γαλλίας  
 (δια της Αλφα Γεωργικά Εφόδια  
 ΑΕΒΕ )  
 Εθν. Αντιστάσεως 73  
 ΤΚ152 31 Χαλάνδρι  
 (με απόδειξη)

**ΘΕΜΑ:** "Τροποποίηση της με αριθ. 60296 οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **TRIMANOC 80 WP** ως προς τον υπεύθυνο για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, τα εργοστάσια παρασκευής της δραστικής ουσίας, τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, τις συσκευασίες, το φάσμα δράσης, την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή και τις φράσεις S "

## ΑΠΟΦΑΣΗ

### Ο

## ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Καν. 1107/2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ και ειδικότερα το άρθρο 80 παρ. 5.
2. Τον Ν. 4036 (ΦΕΚ 8/Α/27-1-2012) σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, την ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τη με αριθ. 188161/6-9-2010 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 60296 οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) **TRIMANOC 80 WP** όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τη με αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/Β/22-5-2009) Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για "Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με «Εντολή Υφυπουργού»».
5. Το σημείωμα της ομάδας ελέγχου υπολειμμάτων της αρμόδιας αρχής αξιολόγησης
6. Τη με αριθ. 92857/02-2-2011 και τα από 16-7-2012, 27-7-2012 συμπληρωματικά στοιχεία.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. **60296** οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **TRIMANOC 80 WP** που χορηγήθηκε με την αριθ. 188161/6-9-2010 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, **ως προς τον υπεύθυνο για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, τα εργοστάσια παρασκευής της δραστικής ουσίας, τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, τις συσκευασίες, το φάσμα δράσης, την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή και τις φράσεις S (σημεία 1.3 δ), 1.4 β), δ), ε), 2, 5, 11, και 13).**  
Συγκεκριμένα η άδεια διάθεσης στην αγορά του TRIMANOC 80 WP διαμορφώνεται ως εξής:

### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

#### **1.1.Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

**60296**

**6-9-2010**

**30-6-2016**

#### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

**TRIMANOC**

1.2.β Μορφή:

**Βρέξιμη σκόνη (WP)**

#### **1.3 Δραστική ουσία (εξ)**

α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

**mancozeb**

(ομάδα διθειοκαρβαμιδικά)

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

**mancozeb: 850 g/kg min**

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

**Cerexagri BV, Ολλανδίας**

δ) Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1) Cerexagri B.V., Ολλανδίας
- 2) United Phosphorous Limited, Ινδίας

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας mancozeb προσδιορίζονται στην αίτηση με ημερομηνία 30-6-2006 (Αρ. Πρ. ΥΑΑκΤ 120031) και στο Doc J από την παρασκευάστρια εταιρεία Cerexagri με ημερομηνία 05-12-2006 (Αρ. Πρ. ΥΑΑκΤ 124144) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

**CEREXAGRI SAS – Γαλλίας**  
 1-rue des frères Lumière  
 78373 – Plaisir, FRANCE  
 Tel +33 (0)1 30 81 73 00  
 Fax +33 (0)1 30 81 72 50  
 Contact person: Barnali James,  
 Telephone No.: +44 1925 859 006  
 Telefax No.: +44 1925 817 425  
 e-mail: [bgoswami@uniphos.com](mailto:bgoswami@uniphos.com)

**Υπεύθυνος επικοινωνίας:**

**ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ**  
 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 73,  
 Τ.Κ.152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ  
 ΜΑΤΘΑΙΑ ΠΑΙΣΙΟΥ  
 Τηλ.: 211 120 5570  
 Fax.: 211 120 5572  
 E-mail: [martha.paissiou@alfagro.gr](mailto:martha.paissiou@alfagro.gr)  
[technical@alfagro.gr](mailto:technical@alfagro.gr)

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης):

**ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ**  
 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 73,  
 Τ.Κ.152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ  
 ΜΑΤΘΑΙΑ ΠΑΙΣΙΟΥ  
 Τηλ.: 211 120 5570  
 Fax.: 211 120 5572  
 E-mail: [martha.paissiou@alfagro.gr](mailto:martha.paissiou@alfagro.gr)  
[technical@alfagro.gr](mailto:technical@alfagro.gr)

γ) Παρασκευαστής  
σκευάσματος:

Cerexagri BV, Ολλανδίας

δ) Εργοστάσια παρασκευής του  
σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των  
επιχειρήσεων:

- 1) Cerexagri B.V., Ολλανδίας
- 2) United Phosphorous Limited, Ινδίας

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του  
σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των  
επιχειρήσεων:

- 1) ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ  
Διεύθυνση εργοστασίου:  
Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτίας  
Ταχ. Δ/ση:  
32 011 - Οινόφυτα, Βοιωτίας  
Τηλ.: 22620 – 30821-3  
FAX: 22620 – 30820  
E-mail: [nikos.kosmidis@alfagro.gr](mailto:nikos.kosmidis@alfagro.gr)
- 2) Cerexagri B.V. Ολλανδίας
- 3) United Phosphorous Limited, Ινδίας

στ) Εγγυημένη σύνθεση του  
σκευάσματος:

Mancozeb: 80% β/β  
Βοηθητικές ουσίες: 5.9% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος  
προσδιορίζεται στο Τμήμα J της αίτησης με  
ημερομηνία 1-7-2008 (Αρ. Πρ. ΥΑΑκΤ 120464)  
όπως τροποποιήθηκε (Αρ. Πρ. ΥΑΑκΤ  
131211/27-7-2009) και παραμένει στα αρχεία  
της Αρμόδιας Αρχής στο part C της έκθεσης  
αξιολόγησης (registration report).

## 2

### Συσκευασίες:

#### 2.1 Συσκευασίες:

A/A	Ε	Μέγεθος	Υλικό
1	Κουτί με εσωτερικό σακίδιο	200, 250, 300, 400, 500, 600 γρ., 1κιλού, 1.2 , 2 , 2.5, 3, 6 και 10 κιλών.	Χάρτινο κουτί με εσωτερικό σακίδιο πολυαιθυλένιο.

2	Σακίδια	200, 250, 300, 500, 600 γραμ., 1 κιλού, 2, 2.5, 3, 6, 10, 20 και 25 κιλών	Πολυαιθυλένιο ή πολυαιθυλένιο – πολυεστέρας ή πολυαιθυλένιο – πολυεστέρας- αλουμινίου πάχους 150 μ
3	Σάκοι	2.5, 3, 6, 10, 20 και 25 κιλών	Propylene/πολυαιθυλένιο ή Χαρτόσακος πολλαπλών στρώσεων με εσωτερική επένδυση πολυαιθυλένιο ή με εσωτερικό σακίδιο πολυαιθυλένιο

<b>3</b>	Οδηγίες χρήσης:	Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
		<p><b>Τρόπος εφαρμογής:</b> Ψεκασμός φυλλώματος.</p> <p><b>Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:</b></p> <p>Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.</p> <p><b>Συνδυαστικότητα: ----</b></p> <p><b>Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:</b></p> <p>Τα κενά υλικά συσκευασίας (σακούλες, σακίδια μαζί με τα κουτιά) αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας</p>

<b>4</b>	Κατηγορία και τρόπος δράσης:	Μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση κατά διαφόρων μυκητολογικών ασθενειών. Το Mancozeb δρα εμποδίζοντας τον κυτταρικό μεταβολισμό των μυκήτων σε πολλαπλά σημεία. Διαθέτει δε ευρύ φάσμα δράσης.
----------	------------------------------	---

<b>5</b>	<b>5.1 Φάσμα δράσης</b>					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο
		Γρ. σκ./στρ. (max)	Γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρέμμα		

Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά)	<b>Φουζικλάδιο</b> ( <i>Venturia inaequalis</i> <i>V. pirina</i> )	200	150- 200	50-100	Εφαρμογές στα στάδια της πράσινης, ρόδινης κορυφής, πτώσης πετάλων και 7-10 μέρες αργότερα	Μέχρι 4 εφαρμογές εφόσον απαιτείται
Αμπέλι (επιτραπέζιο και οينوποιήσιμο)	<b>Περονόσπορος</b> ( <i>Plasmopara viticola</i> )  <b>Φόμοψη</b> ( <i>Cryptosporella</i> = <i>Phomopsis viticola</i> )  <b>Μαύρη σήψη</b> ( <i>Guignardia bidwellii</i> )	200	200	50-100	Εφαρμογές όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ. και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων  1-3 ανοιξιάτικες εφαρμογές κατά την έκπτυξη των οφθαλμών, αμέσως μετά το σχηματισμό του 1 <sup>ου</sup> φύλλου, στο στάδιο των 2-3 φύλλων	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται
Κρεμμύδι (ξηρό)	<b>Περονόσπορος</b> ( <i>Peronospora destructor</i> )	250	200-250	40-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας.	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο
		Γρ. σκ./στρ. (max)	Γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρέμμα		
Τομάτα (Υπαίθρου)	<b>Περονόσπορος</b> ( <i>Phytophthora infestans</i> )  <b>Σεπτόρια</b> ( <i>Septoria lycopersici</i> ) <b>Αλτερναρίωση</b> ( <i>Alternaria solani</i> )	200	200	50-100	Εφαρμογές από το στάδιο των νεαρών σποροφύτων  Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται
Μελιτζάνα, Πιπεριά (Υπαίθρου)	<b>Αλτερναρίωση</b> ( <i>Alternaria solani</i> )	200	200	50-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται
Καρότο	<b>Αλτερνάρια</b> ( <i>Alternaria dauci</i> )	200	200	50-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση των συμπτωμάτων της ασθένειας	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον υπάρχει πρόβλημα.

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο
		Γρ. σκ./στρ. (max)	Γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρέμμα		
<u>Κολοκυνθοειδή</u> Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθι (Υπαίθρου)	<b>Κλαδοσπορίωση</b> <i>(Cladosporium cucumerinum)</i>	200	200	50-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται
Μαρούλι (Υπαίθρου)	<b>Περονόσπορος</b> <i>(Bremia lactucae)</i>	200	200	60-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται
Πατάτα	<b>Περονόσπορος</b> <i>(Phytophthora indestans)</i> <b>Αλτερναρίωση</b> <i>(Alternaria solani)</i>	200		50-100	Εφαρμογές όταν τα φυτά έχουν ύψος περίπου 15-20 εκ., μετά από 7 ημέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση	Μέχρι 8 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται

**Παρατηρήσεις:**

- Να μην χρησιμοποιούνται ως τροφή τα αμπελόφυλλα σε περίπτωση χρήσης του **TRIMANOC 80 WP**.
- Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας
- Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο της έντασης της προσβολής
- Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται τα προγράμματα γεωργικών προειδοποιήσεων να ακολουθούνται οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων
- Η χρήση στο σκόρδο (υπαίθρου) θα χορηγηθεί όταν και εάν καθοριστούν στον κανονισμό 396/2005 MRLs σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή.

<u>-Σκόρδο (ξηρό)</u>	<b>Περονόσπορος</b> <i>(Peronospora destructor)</i>	250 γρ. σκ./στρ	200-250 γρ.σκ. /100L	40-100 Όγκος ψεκαστικού υγρού L/στρ.	Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας.	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται	PHI 28 ημέρες
-----------------------	--	-----------------	----------------------	--------------------------------------	---	---	---------------------



**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

**Διαχείριση ανθεκτικότητας:**

Το TRIMANOC 80 WP πρέπει να χρησιμοποιείται προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε μυκητοκτόνα με εξειδικευμένο τρόπο δράσης.

**7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

----

---

---

---

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

**Φυτοτοξικότητα:**

Μπορεί να προκαλέσει σκωριόχρωση σε μηλιές «Golden Delicious». Είναι φυτοτοξικό στις ποικιλίες της αχλαδιάς Βουτυράτα, Κόσια και Κρυστάλι.

**9** Σήμανση σκευάσματος:

**Xn** – Επιβλαβές  
**N** - Επικίνδυνο για το περιβάλλον

**10** Φράσεις R

**R43** Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.  
**R63** Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.  
**R50** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

**S1/2** Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

**S13** Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές.

**S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.

**S24** Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα

**S36/37** Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

**S46** Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

«Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική μάσκα κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατάλληλες μπότες κατά την εφαρμογή»

«Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια εάν εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής λίγο μετά τον ψεκασμό»

**«Κατά την εφαρμογή σε οπωρώνες συνιστάται η χρήση τρακτέρ με κλειστή καμπίνα».**

**S61** Αποφύγετε τη λευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες /δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

**SP1 ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.**

**SPe3** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μian αγέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες του κρεμμυδιού, (του σκόρδου), της πατάτας και **10 μέτρων** για την καλλιέργεια του αμπελιού και **30 μέτρων** για τις **δενδρώδεις καλλιέργειες**

*«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»*

**12** Πρώτες βοήθειες  
- Αντίδοτο**Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:**

Γενικά: Μη χορηγείτε υγρά και μην προκαλείτε εμετό εάν ο παθών δεν διατηρεί τις αισθήσεις του ή παρουσιάζει σπασμούς.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Πλύνετε τα λερωμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής μετά από 1-2 λεπτά και συνεχίστε το ξέπλυμα για αρκετά λεπτά ακόμη. Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Συμβουλευθείτε γιατρό.

Για το γιατρό: Φροντίδα υποστηρικτική. Ταυτόχρονη έκθεση στο οινόπνευμα θα πρέπει να αποφεύγεται γιατί το mancozeb έχει δράση δισουλφιράμης.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777**

**13 Προστασία των καταναλωτών**

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργειες	ΡΗΙ(ημέρες)
<b>Μηλιά, Αχλαδιά, Αμπέλι</b> (επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο), <b>Κρεμμύδι, Μαρούλι</b> (Υπαίθρου)	28 ημέρες
<b>Καρότο</b>	35 ημέρες
<b>Τομάτα, Μελιτζάνα Πιπεριά , Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθι</b> (Υπαίθρου)	3 ημέρες
<b>Πατάτα</b>	7 ημέρες

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του όταν αποθηκεύεται στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο ξηρό χώρο προστατευόμενο από ακραίες θερμοκρασίες και το άμεσο ηλιακό φως.

**15 Προστατευόμενα στοιχεία και μελέτες**

Στο Παράρτημα I (Annex I) του registration report καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα έγκριση κυκλοφορίας. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**16** **Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**B*****Γενικές υποχρεώσεις***

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Καν. 1107/2009.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί ηλεκτρονικά στην Αρμόδια Αρχή η τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**M. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ**