



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Αθήνα, 29-7-2014  
Αριθ. πρωτ: 3590/39117**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 928 7211  
e-mail: [syg046@minagric.gr](mailto:syg046@minagric.gr)**

**Προς: SIPCAM S.p.A., Ιταλίας  
(δια της εταιρείας  
SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ,  
Ήρας 3,  
19400 - Κορωπί)**

**ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 60.178 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ALTIS 25 EW (δρ. ου.: tebuconazole), ως προς το φάσμα δράσης, τα εικονογράμματα κινδύνου (πρώην σημάνσεις), τις δηλώσεις κινδύνου (πρώην φράσεις κινδύνου), τις δηλώσεις προφύλαξης (πρώην φράσεις προφύλαξης), τις πρώτες βοήθειες και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή»**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο**

**ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 80 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον Κανονισμό 1272/08 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-12-08 “για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006”, καθώς και τη με αριθ. 7923/87577/12.7.13 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
4. Τον Κανονισμό 61/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24-1-14, “για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες *cyromazine*, *fenpropridin*, *formetanate*, *oxamyl* και ***tebuconazole*** μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα”.
5. Τη με αριθ. 462/106101/3.9.13 (ΦΕΚ 2240/Β'/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”».
6. Το σχετικό Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
7. Τις με αριθ. πρωτ. 3590/39117/24.3.14 και 8466/93080/17.7.14 αιτήσεις της εταιρείας SIPCAM S.p.A., Ιταλίας, δια της εταιρείας SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ.


## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Α. Τροποποιούμε την με αριθ. **60.178** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (**μυκητοκτόνο**) **ALTIS 25 EW (δραστική ουσία: tebuconazole)**, που χορηγήθηκε με τη αριθ. 117411/26.3.08 Απόφασή μας και τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 130468/1.7.09 και 188104/18.8.10 Αποφάσεις μας, ως προς το φάσμα δράσης, τα εικονογράμματα κινδύνου (πρώην σημάνσεις), τις δηλώσεις κινδύνου (πρώην φράσεις κινδύνου), τις δηλώσεις προφύλαξης (πρώην φράσεις προφύλαξης), τις πρώτες βοήθειες και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή. Οι παράγραφοι 5, 9, 10, 11, 12 και 13.2 της με αριθ. 188104/18.8.10 Απόφασής μας, διαμορφώνονται ως ακολούθως:

## 5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες
		κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα	κ.εκ./ στρέμμα (Μέγιστο)		
Μηλιά	<i>Φουζικλάδιο (Venturia inaequalis)</i>	40	100-150	60	Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του παθογόνου από την πράσινη κορυφή μέχρι την πτώση των πετάλων και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από τους DMIs Θεραπευτικές εφαρμογές μόνο κατόπιν σχετικής σύστασης από τα Κέντρα των γεωργικών προειδοποιήσεων.	2/14
Ροδακινιά, Νεκταρινιά	<i>Ωίδιο (Sphaerotheca pannosa)</i>	50	150	75	Εφαρμογές από το στάδιο της εμφάνισης του καρπιδίου έως την πλήρη ωρίμανση και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από τους DMIs.	2/14
	<i>Μονίλια (Monilinia laxa)</i>	50-75*	100-150*	75	Εφαρμογές από το στάδιο της εμφάνισης του καρπιδίου έως την πλήρη ωρίμανση και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από τους DMIs.	2/14
Αμπέλι (Επιτραπέζιες ποικιλίες)	<i>Ωίδιο (Uncinula necator)</i>	40	80-100	40	<b>Εφαρμογές από την έναρξη της άνθησης μέχρι το τέλος της άνθησης ανά 12-14 ημέρες.</b>	2/12-14
Αμπέλι (Οινοποιήσιμες ποικιλίες)	<i>Ωίδιο (Uncinula necator)</i>	40	80-100	40	Εφαρμογές από το στάδιο της καρπόδεσης μέχρι το κλείσιμο της σταφυλής ανά 12-14 ημέρες.	2/12-14
Σπαράγγι	<i>Σκωρίαση (Puccinia asparagi)</i>	--	100	100	Εφαρμογές μετά τη συγκομιδή από Ιούλιο μέχρι Σεπτέμβριο εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας με μεσοδιάστημα 14 ημέρες.	2/14

\*Παρατήρηση: Στα Πυρηνόκαρπα για την καταπολέμηση της **Μονίλιας** ο μεγάλος όγκος νερού (150 λίτρα/στρέμμα) να χρησιμοποιείται με τη χαμηλή δόση σκευάσματος ανά εκατόλιτρο (50 κ.εκ. σκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού) έτσι ώστε η τελική δόση να μην ξεπερνάει τα 75 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει Υπέρβαση του Μέγιστου Επιτρεπόμενου Ορίου Υπολειμμάτων.

<b>9.</b> Εικονογράμματα κινδύνου:	 <b>GHS05</b> <b>GHS07</b> <b>GHS08</b> <b>GHS09</b>
<b>10.</b> Δηλώσεις επικινδυνότητας:	<b>H317:</b> Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. <b>H318:</b> Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. <b>H361d:</b> Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. <b>H411:</b> Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
<b>11.</b> Δηλώσεις προφύλαξης:	<b>P102 + P405:</b> Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. <b>P264:</b> Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό. <b>P270:</b> Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. <b>P280:</b> Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. <b>P391:</b> Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
<b>11<sup>α</sup>.</b> Συμπληρωματικές πληροφορίες EUH:	<b>EUH210</b> Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί <b>EUH401</b> Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης
<b>11β.</b> Ειδικές φράσεις για χρήση ως φυτοπροστατευτικό προϊόν:	<b>SP1</b> Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Μη καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη μόλυνση του αγροτικού περιβάλλοντος και των δρόμων).
<b>12.</b> Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:	<b>P305+P351:</b> ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. <b>Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:</b> Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή. <b>Σε περίπτωση κατάποσης:</b> Να μην προκληθεί εμετός. Συνιστάται πλύση στομάχου ή/και λήψη ενεργού άνθρακα. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. Δεν υπάρχει αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. <b>Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777</b>

Παρατήρηση: Η ανωτέρω ταξινόμηση και επισήμανση που είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, θα είναι υποχρεωτική από την 1<sup>η</sup> Ιουνίου 2015. Μέχρι τότε το σκεύασμα δύναται να κυκλοφορεί με τη σήμανση που αναγράφεται στη με αριθ. 188104/18.8.10 Απόφασή μας.

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

<b>Φυτικά προϊόντα</b>	<b>Ημέρες</b>
Μηλιά	35 ημέρες
Ροδακινιά	7 ημέρες
Νεκταρινιά	7 ημέρες
<b>Αμπέλι (Επιτραπέζιες ποικιλίες)</b>	<b>Εφαρμογή μέχρι το τέλος της άνθησης</b>
Αμπέλι (Οινοποιήσιμες ποικιλίες)	21 ημέρες
Σπαράγγι	6 μήνες

**Β.** Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 188104/18.8.10 Απόφασή μας.

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ**  
**ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**  
**α/α**

**Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ**