



ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 10.07.2012.
Αριθ. πρωτ: 7578/76753

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Πιταροκοίλη
Τηλέφωνο: 210 928 7254
e-mail: syg081@minagric.gr

Προς: **Greenfarm Χημικά Α.Ε.**
Μεσογειών 467 & Γούναρη 40
153 43 Αγία Παρασκευή
Τηλ.: +30 210 6990932
Fax.: +30 210 6990862
(με απόδειξη)

Κοιν.: **ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 7904 οριστικής έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) **BROXION 350 SE (terbuthylazine/bromoxynil)** ως προς τον υπεύθυνο επικοινωνίας, τον υπεύθυνο για την τελική συσκευασία και σήμανση και την ημερομηνία λήξης της έγκρισης»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 80 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τη με αριθμό **7904** οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **BROXION 350 SE**, η οποία χορηγήθηκε με την αριθμ. 125350/23.12.2008 Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4. Τη με αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/Β/22.05.2009) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για "Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με «Εντολή Υφυπουργού»».
5. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 820/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Αυγούστου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών terbuthylazine.
6. Την από 30.12.2011 αίτηση της εταιρείας **Greenfarm Χημικά Α.Ε.**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε τη με αριθ. **7904** οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) **BROXION 350 SE** που χορηγήθηκε με την αριθ. **125350/23.12.2008** Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς τον υπεύθυνο επικοινωνίας, τον υπεύθυνο για την τελική συσκευασία και σήμανση και την ημερομηνία λήξης της έγκρισης και η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

7904
23-12-2008
31.12.2015

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

Broxion 350 SE

1.2.β Μορφή¹:

Γαλάκτωμα-Εναιώρημα (SE)

1.3 Δραστική ουσία (ες)²

α) Κοινή ονομασία των δραστικών ουσών κατά ISO³

1. Bromoxynil (ομάδα βενζονιτρίλια)
2. Terbutylazine (ομάδα τριαζίνες)

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

1. Bromoxynil: Bromoxynil heptanoate: 93% min Bromoxynil octanoate: 92% min
2. Terbutylazine: 96% min

γ) Παρασκευαστής των δ.ο.:

1. Bromoxynil: Bayer CropScience Nufarm Limited, Αγγλία.
2. Terbutylazine: Oxon Italia SpA, Ιταλία

δ) Εργοστάσιο παρασκευής των δ.ο.⁴

Bromoxynil: Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: Bayer CropScience Nufarm Limited.
Terbutylazine: Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: Oxon Italia Spa (οι Δ/νσεις των εργοστασίων είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).

¹ Κατά GIFAP π.χ. υδατοδιαλυτή σκόνη, (SP), υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC) κ.λ.π.

² Σε περίπτωση σκευασμάτων που περιέχουν περισσότερες της μιας δραστικές ουσίες, οι πληροφορίες θα επαναλαμβάνονται για την κάθε δραστική ουσία

³ Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κοινή κατά ISO ονομασία της δραστικής ουσίας, δίνεται η χημική της ονομασία κατά IUPAC ή CA.

ε) Τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών ουσιών:

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας bromoxynil (heptanoate 93% & octanoate 92%) όπως προσδιορίζονται στο Review report SANCO/4347/2000 final/13-2-2004 των με αρ. πρωτ. ΥΑΑ&Τ 116567/29-2-2008 και 122728/2-10-2008 αιτήσεων και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας terbuthylazine όπως προσδιορίζονται από το οίκο Oxon Italia SpA κατά τη διαδικασία της συμμόρφωσης με την την οδηγία καταχώρησης και προσδιορίζονται στο Τμήμα J της αίτησης με ημερομηνία 30.12.2011 (Αρ. Πρ. ΥΑΑΤ 104089) παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης⁵:

Nufarm Italia Srl,
Ιταλία

Με υπεύθυνο επικοινωνίας την εταιρία:

Greenfarm Χημικά Α.Ε.
Μεσογείων 467 & Γούναρη 40,
Αγία Παρασκευή
ΑΜΕ⁶:

Τ.Κ. 153 43

Τηλ.: 210 6990 932

Fax: 210 6990 862

E-mail: info@gr.nufarm.com

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης)

Greenfarm Χημικά Α.Ε.

Μεσογείων 467 & Γούναρη 40,
Αγία Παρασκευή
ΑΜΕ⁷:

Τ.Κ. 153 43

Τηλ.: 210 6990 932

Fax: 210 6990 862

E-mail: info@gr.nufarm.com

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Nufarm Italia Srl

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

Nufarm S.A.S.

(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).

⁴ Αναγράφεται η διεύθυνση του κατόχου του εργοστασίου. Τα στοιχεία που αφορούν την διεύθυνση του εργοστασίου παραμένουν στα αρχεία της υπηρεσίας.

⁵ Είναι ο αιτών και έχει έδρα σε κάποιο ΚΜ της ΕΕ.

⁶ Αριθμός Μητρώου Εταιρείας (ΑΜΕ). Δίδεται από την Αρμόδια Αρχή.

⁷ Αριθμός Μητρώου Εταιρείας (ΑΜΕ). Δίδεται από την Αρμόδια Αρχή.

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
Nufarm S.A.S.
 (η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Bromoxynil (heptanoate/octanoate): 10,00% β/ο
 Terbutylazine: 25,00% β/ο
 Βοηθητικές ουσίες: 63,25% β/β
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στις με αρ. πρωτ. ΥΑΑ&Τ 116567/29-2-2008 και 122728/2-10-2008 αιτήσεις και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

2 Συσκευασία(ες)

2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	1, 1.5,	1. HDPE
2	Δοχεία	2.5, 3, 5, 10 λίτρων	2. COEX

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους με 30-50 λίτρα ψεκαστικού υγρού το στρέμμα. Το ψεκαστικό να λειτουργεί με συνεχή ανάδευση, με πίεση που να μη ξεπερνά τις 3 ατμόσφαιρες (45 PSI) και να χρησιμοποιούνται μπεκ τύπου σκούπας.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινείστε το σκεύασμα καλά και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Ξεπλύνετε το δοχείο με νερό τουλάχιστον 3 φορές, ρίχνοντας τα αποπλύματα στο ψεξαστικό.

Συνδυαστικότητα:

Μπορεί να αναμειχθεί με ειδικά ζιζανιοκτόνα για την διεύρυνση του φάσματος των καταπολεμούμενων ζιζανίων και τη συνδυασμένη καταπολέμηση των αγρωστωδών ζιζανίων. Συνδυάζεται με τα παρακάτω σκευάσματα: **Rush 75 WG** (rimsulfuron 75%), **Equip 2.25 OD** (foramsulfuron 2.25%), **Steadfast** (nicosulfuron 5% + rimsulfuron 2.5%)

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μίγμα δύο εκλεκτικών ζιζανιοκτόνων για τη μεταφωτρωτική καταπολέμηση πλατυφύλλων ζιζανίων στις καλλιέργειες καλαμποκιού με υπολειμματική διάρκεια. Το bromoxynil δρα δια της επαφής και αναστέλλει τη φωτοσύνθεση και την αναπνοή και η terbutylazine που έχει υπολειμματική δράση, απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και μεταφέρεται στα φύλλα όπου παρεμποδίζει τη φωτοσύνθεση. Προτείνεται η χρήση του και σε μίγμα με διάφορα άλλα ζιζανιοκτόνα ώστε να επιτυγχάνεται η συνδυασμένη καταπολέμηση πλατυφύλλων και αγρωστωδών ζιζανίων.

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		Κ.εκ./ στρέμμα (max)	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Αραβόσιτος	Καταπολέμηση ετησίων πλατυφύλλων ζιζανίων	150-200*	30-50	Μεταφυτρωτικά, έως τα 3-5 φύλλα (περίπου 10 εκ.) και τα ζιζάνια είναι στα πρώτα στάδια ανάπτυξης (μέχρι το 4 ^ο φύλλο)	1

***Παρατηρήσεις:** Η μικρή δόση να εφαρμόζεται σε ελαφριάς σύστασης ενώ η μεγάλη σε μέσης ή βαριάς σύστασης εδάφη

Καταπολεμούμενα ζιζάνια: Αγριοβαμβακιά (*butylon theophrasti*), Αγριοτοματιά (*Solanum nigrum*), Αντράκλα (*Portulaca oleracea*), Βλήτο τραχύ (*Amaranthus retroflexus*), Γκαλισόγγκα (*Galisonga parviflora*), Καφέλλα (*Capsella bursa-pastoris*), Λουβουδιά (*Chenopodium album*), Στελλάρια (*Stelaria media*), Τάτουλας (*Datura stramonium*).

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκτόνα:

- SZ1 Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.
- SZ2 Χρησιμοποιείται χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.
- SZ4 Αποφύγετε τη χρήση του σε πολύ αμμώδη, ελαφρά, φτωχά σε οργανική ουσία (<1%) εδάφη, σε περιοχές με πολλές βροχοπτώσεις.
- SZ5 Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
- SZ6 Αν ρυπανθούν τα νερά αρδευσεως να μη χρησιμοποιηθούν για άμεση άρδευση.
- SZ7 Μη ψεκάζετε όταν φυσάει
- SZ8 Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις.
- SZ9 Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 3 ATM (45 PSI).
- SZ10 Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας.
- SZ11 Μη το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δε συνιστάται.
- SZ12 Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με άφθονο νερό και απορρυπαντικό.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα
-
- Μη σπέρνετε και μη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια εκτός από αραβόσιτο ή σόργο πριν περάσουν 10 μήνες από την εφαρμογή του.
-
- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.
- Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
- 9** Σήμανση σκευάσματος:
- Xn:** **Επιβλαβές**
N: **Επικίνδυνο για το περιβάλλον**
- 10** Φράσεις R
- R20/22** Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης.
R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
R63 Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.
R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
- 11** Φράσεις S
- S2** Μακριά από παιδιά.
S13 Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.
S24 Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα.
S36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
S46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
S60/61 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες / Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.
SP1 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία.
- 12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο
- Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Να ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

13 Προστασία των καταναλωτών**13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)⁸**

Bromoxynil (heptanoate/octanoate), Terbutylazine

Φυτικά προϊόντα	Προσωρινά σε mg/kg
Έχουν καθοριστεί Ευρωπαϊκά MRLs στον Κανονισμό 396/2005, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 149/2008	

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αραβόσιτος	60

14Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος⁹.

Στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, προστατευμένο από άμεση ηλιακή ακτινοβολία, παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

15**Α. Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχεθήκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων αυτή χορηγήθηκε.

Η έγκριση θα ανακληθεί στις **31.12.2013** εάν δεν υποβληθεί από τον κάτοχο της έγκρισης αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο που πληρεί τις απαιτήσεις του Παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 545/2011 για την αξιολόγηση των στοιχείων σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

⁸ Ορίζονται μόνο στις περιπτώσεις που δεν υφίστανται εθνικά ή κοινοτικά MRLs ή τα υφιστάμενα δεν ικανοποιούν την εγκρινόμενη Ορθή Γεωργική Πρακτική. Στις περιπτώσεις που έχουν οριστεί κοινοτικά MRLs αναγράφεται η φράση: «Έχουν οριστεί κοινοτικά MRLs».

⁹ Η ημερομηνία λήξης θα αναγράφεται στην ετικέτα εάν είναι μικρότερη των δύο (2) ετών

Β Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση του από τη χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί παράπτωμα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
 2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
 3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού 1107/2009 και την παρούσα απόφαση.
 4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
- Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ