



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 14.11.2012
Αριθ. πρωτ: 6732/69280

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Πιταροκοίλη
Τηλέφωνο: 210 928 7254
e-mail: syg081@minagric.gr

Προς: **INDUSTRIAL QUIMICA KEY S.A.**
(δια της ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε.)
Μουρούζη 9, 10674 Αθήνα
E-mail: info@anorgachim.com
(με απόδειξη)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 7834 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) **KEYFEN 48 SC (oxyfluorfen)** ως προς την περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία, τον παρασκευαστή της δ.ο., τα εργοστάσια παρασκευής της δ.ο., τον υπεύθυνο για την τελική συσκευασία και σήμανση, το εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος, τα μεγέθη συσκευασίας, τον τρόπο εφαρμογής και την ημερομηνία λήξης της άδειας»

Κοιν.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 80 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τη με **7834** οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **KEYFEN 48 SC**, η οποία χορηγήθηκε με την αριθμ. 121766/10.09.2007 Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4. Τη με αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/Β/22.05.2009) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με «Εντολή Υφυπουργού»».

5. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 798/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Αυγούστου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών oxyfluorfen.
6. Τις από 28.12.2011 και 19.06.2012 αιτήσεις της εταιρείας INDUSTRIAL QUIMICA KEY S.A.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. **7834** οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) **KEYFEN 48 SC** που χορηγήθηκε με την αριθ. **121766/10.09.2007** Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς την περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία, τον παρασκευαστή της δ.ο., τα εργοστάσια παρασκευής της δ.ο., τον υπεύθυνο για την τελική συσκευασία και σήμανση, το εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος, τα μεγέθη συσκευασίας, τον τρόπο εφαρμογής και την ημερομηνία λήξης της άδειας.

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης

7834 10.09.2007 31.12.2015

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
1.2.β Μορφή:

KEYFEN 48 SC
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

1.3 Δραστική ουσία

Δραστική ουσία	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	Oxyfluorfen
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	97,9% (β/β) min.
Χημική ομάδα	Διφαινυλαιθέρες
Παρασκευαστής	Oxyfluorfen Data Development Agreement (ODDA) με εκπρόσωπο την SAPEC AGRO S.A. Alameda dos Oceanos lote 1.06.1.1 – 3ºA Parque das Nações, Lisboa, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: Nantong Jiahe Chemicals Co., Ltd Daqing Road, Chemical Industry Park, Qinglong Harbor, Haimen, Jiangsu, Postal code 226121, Κίνα Jiangsu Flag Chemical Industry Co., Ltd. Changfenghe Road, Nanjing Chemical Industrial Park, Luhe, Nanjing, Postal Code 210047, Κίνα

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας oxyfluorfen όπως προσδιορίζονται στο Annex II - Doc J της αίτησης με ημερομηνία 28.12.2011 (Αρ . Πρ. ΥπΑΑΤ 103783) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
---	--

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

INDUSTRIAL QUIMICA KEY S.A.
Av. Cervera s/n, 25300 Tarrega (Lleida), Spain.
Τηλ.: +34 973 310102
Fax: +34 973 311416
E-mail: key@key.es

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε.
Μουρούζη 9, 10674 Αθήνα
Τηλ.: +30 210 7236700, +30 210 7236676
Fax: +30 210 7236410
E-mail: info@anorgachim.com

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

ΕΛΛΑΓΡΕΤ Α.Β.Ε.Ε.
Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

INDUSTRIAL QUIMICA KEY S.A.
Av. Cervera s/n, 25300 Tarrega (Lleida), Spain.

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
INDUSTRIAL QUIMICA KEY S.A.
Av. Cervera s/n, 25300 Tarrega (Lleida), Spain.

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
1) INDUSTRIAL QUIMICA KEY S.A.
Av. Cervera s/n, 25300 Tarrega (Lleida), Spain.
2) ΕΛΛΑΓΡΕΤ Α.Β.Ε.Ε.
Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Oxyfluorfen 48% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 57,71% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στην αίτηση με ημερομηνία 05.03.2007 και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

2 Συσκευασία(ες)

2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	100 κ.εκ., 125 κ.εκ., 200 κ.εκ., 250 κ.εκ., 500 κ.εκ., 1 λίτρο, 2 λίτρα	Φιάλη από HDPE ή PET ή COEX
2	Δοχείο	3 λίτρα, 5 λίτρα	Δοχείο από HDPE ή PET ή COEX

3 Οδηγίες χρήσης:**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες**

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους (σε λωρίδες κοντά στο έδαφος) από το φθινόπωρο έως τις αρχές της άνοιξης, με μπεκ τύπου σκούπας και πίεση μικρότερη από δύο (2) atm.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινείτε καλά το δοχείο πριν τη χρήση του. Γεμίστε το ψεκαστικό κατά τα $\frac{3}{4}$ με νερό και προσθέστε τη δόση που χρειάζεται. Ξεπλύντε πολλές φορές τα κενά δοχεία και ρίξτε τα νερά στο ψεκαστικό. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση.

Συνδυαστικότητα: --

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Ζιζανιοκτόνο ετήσιων και πολυετών πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων.

5 5.1 Φάσμα δράσης

Καλλιέργειες	Στόχοι	Δόσεις (κ.εκ./στρ.)	Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.)	Χρόνος και τρόπος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Πορτοκαλιά Μανταρινιά Λεμονιά Γκρέιπ φρουτ Κιτριά	Ετήσια και πολυετή πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια (1) <u>Αγρωστώδη</u>	250	60	Προφυτρωτικά	1
ΜΗΛΟΕΙΔΗ Μηλιά Αχλαδιά	Αγριάδα (<i>Cynodon dactylon</i>), Αιματόχορτο	250	60	Προφυτρωτικά	1

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Ροδακινιά Βερικοκιά Δαμασκηνιά Νεκταρινιά Κορομηλιά Κερασιά Βυσσινιά	(<i>Digitaria sanguinalis</i>), Αλεπονουρά (<i>Alopecurus myosuroides</i>), Βέλιουρας από σπόρο (<i>Sorghum halepense</i>), Ήρα	250	60	Προφυτρωτικά	1
ΑΜΠΕΛΙ (Σταφίδες, Οινοποιήσιμο, Επιτραπέζιο) (2)	(<i>Lolium spp.</i>), Κύπερη (<i>Cyperus spp.</i>) Μουχρίτσα (<i>Echinochloa crus-galli</i>), Σετάρια (<i>Setaria spp.</i>),	250	60	Προφυτρωτικά	1
Ελιά		250	60	Προφυτρωτικά	1
Μελιτζάνα	<u>Πλατύφυλλα</u> Αγριοβαμβακιά (<i>Abutilon theophrasti</i>), Αγριομελιτζάνα (<i>Xanthium pensylvanicum</i>),	125-150	60	Πριν τη μεταφύτευση και ακολουθεί κατάκλιση.	1
Κρεμμύδι (5)	Αγριοτομάτα (<i>Solanum nigrum</i>), Αντράκλα (<i>Portulaca oleracea</i>), Βερόνικα (<i>Veronica spp.</i>), Βλήτο (<i>Amaranthus retroflexus</i>), Δωδεκάνθι (<i>Lamium amplexicaule</i>),	75	60	Α) Μεταφυτρωτικά ως προς την καλλιέργεια, στο στάδιο των 3-4 φύλλων στο κρεμμύδι από σπόρο. Β) Εντός δύο (2) ημερών από τη φύτευση στο κρεμμύδι από κοκκάρι.	1
Κουνουπίδι Λάχανο	Ελευσίνη (<i>Eleusine indica</i>), Ζωχός (<i>Sonchus oleracea</i>),	125-150	60	Πριν τη μεταφύτευση και ακολουθεί κατάκλιση.	1
Αγκινάρα	Λουβουδιά (<i>Chenopodium album</i>),	150	60	Προ της βλαστήσεως του ξηροφύτου.	1
Ηλίανθος (4)	Μαρτιάκος (<i>Senecio vulgaris</i>), Μικρή τσουκνίδα (<i>Urtica urens</i>),	50	60	Μετά τη σπορά και πριν το φύτερωμα της καλλιέργειας.	1
Βαμβάκι	Οξαλίσ (<i>Oxalis pes-caprae</i>),	50-150	60	Πριν το φύτερωμα της καλλιέργειας.	1

Καπνός	Ραπανίδα (<i>Raphanus spp.</i>), Στελλάρια (<i>Stellaria spp.</i>), Τάτουλας (<i>Datura stramonium</i>), Τριβόλι (<i>Tribulus terrestris</i>), Φυσαλίδα (<i>Physalis spp.</i>)		20-40	Ψεκασμός σε λωρίδες σε όλη την επιφάνεια του εδάφους, σε έδαφος ψιλοχωματισμένο και απαλλαγμένο από τα ζιζάνια.	1
A) Ανατολικά καπνά και Virginia		A) 100-150		A) Πριν τη μεταφύτευση, ψεκασμός σε γυμνό έδαφος.	
Καπνά Burley		150-200			
B) Ανατολικά καπνά		B) 50		B) Κατά το παράχωμα ή «γέμισμα», με κατευθυνόμενο ψεκασμό του εδάφους μεταξύ των γραμμών.	
Καπνά Burley		100-150		Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται υπό συνεχή ανάδευση, με μπεκ τύπου σκούπας και με πίεση όχι μεγαλύτερη από 3 atm.	

Παρατηρήσεις:

1. Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα από το στάδιο του σπόρου μέχρι τα 2-4 φύλλα. Τα ζιζάνια *Calendula arvensis* (Καλέντουλα) και *Rumex spp* (Λάπαθα) είναι ανθεκτικά στο KEYFEN 48 SC.
2. Το αμπέλι πρέπει να είναι ηλικίας πάνω από 3 χρόνια και να είναι υποστυλωμένο ή αναρριχώμενο, γιατί αν είναι σε πολύ μικρή απόσταση από το έδαφος υπάρχει κίνδυνος φυτοτοξικότητας.
3. Στον ηλιάνθο δόση μεγαλύτερη από 60 κ.εκ./στρέμμα, δρα φυτοτοξικά.
4. Στο κρεμμύδι: να χρησιμοποιείται μόνο στο κρεμμύδι που προορίζεται για παραγωγή ξηρών βολβών. Να μην εφαρμόζεται με κρύο και υγρό καιρό.
5. Η εφαρμογή του να γίνεται σε ποτισμένο έδαφος.
6. Να μη γίνεται δεύτερη εφαρμογή τον ίδιο χρόνο.
7. Για τις κράμβες και τη μελιτζάνα η μεγάλη δόση εφαρμόζεται όταν ο πληθυσμός των ζιζανίων είναι μεγάλος και τα ζιζάνια βρίσκονται σε μεσαίο ή μέγιστο στάδιο ανάπτυξης.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί.

Αποφεύγετε τη χρήση του σε οργανικά εδάφη.
Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
Αν ρυπανθούν τα νερά αρδύσεως, να μη χρησιμοποιηθούν για άμεση άρδευση.
Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών.

7.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μην σπέρνετε και μη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια πριν περάσουν δέκα (10) μήνες από την εφαρμογή του και πριν καλλιεργήσετε καλά το έδαφος μετά την εφαρμογή του.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Στις καλλιέργειες που δεν συνιστάται μπορεί να προκαλέσουν φυτοτοξικότητα ακόμη και σταγονίδια του ψεκαστικού υγρού. Στον ηλίανθο προκαλείται φυτοτοξικότητα όταν γίνεται υπέρβαση της δόσης. Στο κρεμμύδι συνήθως παρατηρείται και νέκρωση των άκρων των φύλλων, που όμως δεν έχει επιπτώσεις στην παραγωγή, γιατί είναι παροδική. Η φυτοτοξικότητα αυτή είναι πιο έντονη όταν ο καιρός είναι κρύος και υγρός.

9 Σήμανση σκευάσματος:

N - Επικίνδυνο για το περιβάλλον

10 Φράσεις R

R50/53, Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

11 Φράσεις S

Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία:
S1/2, Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
S13, Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S20/21, Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.
S24, Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα.
S36/37, Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια.
S45, Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν).
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

Προφυλάξεις για το οικοσύστημα:

S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.

S61 Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

SP1 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Αποφεύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες.

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλείτε εμετό. Ζητείστε τη συμβουλή γιατρού.

Σε επαφή με το δέρμα πλυθείτε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Απομακρύνετε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναφορέσετε.

Σε επαφή με τα μάτια πλύντε τα αμέσως με άφθονο τρεχούμενο νερό, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Εάν εμφανιστεί ερεθισμός ζητείστε τη συμβουλή οφθαλμιάτρου.

Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)

Φυτικά προϊόντα	MRL's σε mg/kg
Έχουν καθοριστεί Ευρωπαϊκά MRLs στο Παράρτημα II του κανονισμού 396/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008.	

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Κρεμμύδι, Καπνός	63 ημέρες
Λοιπές καλλιέργειες	21 ημέρες

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

15 A. Ανάκληση της άδειας-παράταση της άδειας

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της άδειας δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων αυτή χορηγήθηκε.

Η άδεια θα ανακληθεί στις **31.12.2013** εάν δεν υποβληθεί από τον κάτοχο της άδειας αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο που πληρεί τις απαιτήσεις του Παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 545/2011 για την αξιολόγηση των στοιχείων σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

Β Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η άδεια.
2. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της άδειας του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ