



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 11-12-2012
Αριθ. πρωτ: 12720/125557

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 9287211
e-mail: syg046@minagric.gr

Προς: ΕΛΛΑΓΡΕΤ Α.Β.Ε.Ε.
Θέση Ξηροπήγαδο
196 00 – Μάνδρα Αττικής
ΚΟΙΝ : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 1933 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος LUBRAN, ως προς τα μεγέθη συσκευασίας και την ημερομηνία λήξης της έγκρισης »

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 80 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η δραστική ουσία **paraffin oil CAS No 97862-82-3**.
4. Τη με αριθ. 182179/16.3.2010 (ΦΕΚ 322/Β'/24.3.2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση για την «Καταχώριση των δραστικών ουσιών παραφινέλαια CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 και **CAS 97862-82-3** στο παράρτημα Ι του Προεδρικού διατάγματος αριθ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α' 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/116/ΕΚ της Επιτροπής της 25^{ης} Ιουνίου 2009 ».
5. Τη με αριθ. 102696/23.7.2002 (ΦΕΚ 1047/Β'/9.8.2002) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας για «επανεγκριση των σκευασμάτων μετά την καταχώριση στο Παρ/μα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ της/των δραστικών ουσιών του σκευάσματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2008.

7. Τη με αριθ. 280665/6.4.2009 (ΦΕΚ 970/Β'/22.5.2009) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με «Εντολή Υφυπουργού».
8. Την από 22-12-2009 αίτηση της εταιρείας ΕΛΛΑΓΡΕΤ Α.Β.Ε.Ε. (αριθ. πρωτ. 135516).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Τροποποιούμε την με αριθ. **1933** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **LUBRAN**, η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 92363/14.3.2002 Απόφασή μας, τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 119128/20.7.2004 και 124337/4.11.2008 Αποφάσεις μας και ανανεώθηκε με τη με αριθ. 123484/23.10.2008 Απόφασή μας, ως προς τα μεγέθη συσκευασίας και την ημερομηνία λήξης της έγκρισης. Η έγκριση διαμορφώνεται ως ακολούθως:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης

1933
14.03.2002
30.06.2014

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
1.2.β Μορφή:

LUBRAN
εναιώρημα, λάδι σε νερό (EW)

1.3 Δραστική ουσία (ες)

- α) Κοινή ονομασία της/των δραστική/ζών ουσιών/ών κατά ISO

paraffin oil CAS No 97862-82-3

- β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

100%

- γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

TOTAL FLUIDES 24 cours Michelet, 92069 Paris La Défense, Γαλλία
--

- δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: TOTAL FLUIDES, Γαλλίας
--

- ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

έχουν υποβληθεί από τον υποστηρικτή της δραστικής ουσίας και παραμένουν στα αρχεία της αρμόδιας αρχής.
--

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

- α) Κάτοχος της έγκρισης:

ΕΛΛΑΓΡΕΤ Α.Β.Ε.Ε. θέση Ξηροπήγαδο, 196 00 – Μάνδρα Αττικής Τηλ: 210 55 55 220 Fax: 210 55 56 100 E-mail: regulatory@ellagret.gr

β) Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά σύμφωνα με το ν. 4036/2012

ΕΛΛΑΓΡΕΤ Α.Β.Ε.Ε.
θέση Ξηροπήγαδο, 196 00 – Μάνδρα Αττικής
Τηλ: 210 55 55 220
Fax: 210 55 56 100
E-mail: regulatory@ellagret.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

ΕΛΛΑΓΡΕΤ Α.Β.Ε.Ε.
θέση Ξηροπήγαδο, 196 00 – Μάνδρα Αττικής
Τηλ: 210 55 55 220
Fax: 210 55 56 100
E-mail: regulatory@ellagret.gr

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
ΕΛΛΑΓΡΕΤ Α.Β.Ε.Ε.
θέση Ξηροπήγαδο, 196 00 – Μάνδρα Αττικής
Τηλ: 210 55 55 220
Fax: 210 55 56 100
E-mail: regulatory@ellagret.gr

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
ΕΛΛΑΓΡΕΤ Α.Β.Ε.Ε.
θέση Ξηροπήγαδο, 196 00 – Μάνδρα Αττικής
Τηλ: 210 55 55 220
Fax: 210 55 56 100
E-mail: regulatory@ellagret.gr

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: 80% β/β ή 72% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 20% β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος έχει υποβληθεί και παραμένει στα αρχεία της υπηρεσίας μας.

2 Συσκευασία(ες)

2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλες	50, 80, 100, 200, 250, 500 κ.εκ. και 1 λίτρο	πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)
2.	Δοχεία	5, 15, 17, 20, 25 και 200 λίτρα	>>

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος με ψεκαστήρες κοινού όγκου (5-6 atm) ή μηχανοκίνητους (25-30 atm) και μπεκ τύπου σκούπας.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

-Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση
-Αραιώνουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού ανακατεύοντας μέχρι να γίνει ομοιόμορφο γαλάκτωμα και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας.

-Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού.

-Σε περίπτωση που πρέπει να προστεθούν άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, αυτό γίνεται αφού πρώτα το γαλάκτωμα του ορυκτελαίου αναδευτεί καλά.

-Σε περίπτωση που το αναμειξουμε με βρέξιμη σκόνη, ετοιμάζουμε πρώτα το αραιωμένο γαλάκτωμα ορυκτελαίου και μετά προσθέτουμε την ήδη διαλυμένη σε νερό βρέξιμη σκόνη.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Νερό και απορρυπαντικό

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα:

Συνδυάζεται με οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα, καθώς και με μυκητοκτόνα όπως ο οξυχλωριούχος χαλκός, το thiram και το ziram.

Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα και ιδιαίτερα με βορδιγάλαιο πολτό, βρέξιμο θειάφι, θειασβέστιο, captan.

Να μην εφαρμόζεται για τουλάχιστον 20-30 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή άλλου σκευάσματος με το οποίο απαγορεύεται ο συνδυασμός του. Στα μηλοειδή και ιδίως στην ποικιλία αχλαδιάς κρυστάλλι, να μην προηγείται ή έπεται εφαρμογή captan σε διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Γαλάκτωμα ορυκτελαίου που δρα ασφυκτικά κατά κοκκοειδών, ακάρεων και άλλων εντόμων.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ			ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργ. περίοδο
		κ.εκ. σκευάσματος /100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/ στρ.)	κ.εκ. σκευάσματος / στρ		
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Λεμονιά, μανταρινιά, πορτοκαλιά	-Κόκκινη ψώρα (Aonidiella aurantii), -Ψευδόκοκκος (Planococcus citri), -Άσπρη ψώρα (Aspidiotus nerii), -Μυτιλόμορφη ψώρα (Mytilococcus beckii) -Ανθοτρήτης (Prays citri) -Αφίδες (Aphis sp.) -Ακάρεα	1100-1650	200-400	2200-6600	Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Γενικά όμως οι ψεκασμοί πρέπει να αρχίζουν με το ξεκίνημα της βλάστησης. Για τις ψώρες, η καλύτερη εποχή είναι από αρχές Ιουνίου μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Σε περίπτωση έντονης προσβολής μπορεί να γίνει ψεκασμός και τον χειμώνα.	4
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Μηλιά, αχλαδιά	-Βαμβακάδα (Diaspis pentagona), -Μυτιλόμορφη ψώρα (Lepidosaphes sp.), -Άσπρη ψώρα (Aspidiotus nerii), -Αυγά ακάρεων -Προνύμφες αφίδων και άλλων εντόμων.	1100-1650	100-200	1100-3300	α) Ψεκασμοί καλύψεως την άνοιξη, με το ξεκίνημα της βλάστησης. β) Ψεκασμοί φθινοπώρου.	4
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Βερικοκιά, κερασιά, ροδακινιά, δαμασκηλιά	-Βαμβακάδα (Diaspis pentagona), -Μυτιλόμορφη ψώρα (Lepidosaphes sp.), -Άσπρη ψώρα (Aspidiotus nerii), -Αυγά ακάρεων -Προνύμφες αφίδων και άλλων εντόμων.	1100-1650	150-250	1650-4125	α) Ψεκασμοί καλύψεως την άνοιξη, με το ξεκίνημα της βλάστησης. β) Ψεκασμοί φθινοπώρου.	4
ΕΛΙΑ	-Παυλατόρια (Parlatoria oleae), -Λεκάνιο (Saissetia oleae), -Άσπρη ψώρα (Aspidiotus nerii), -Προνύμφες άλλων εντόμων	1100-1650	150-300	1650-4950	α) Ψεκασμοί καλύψεως την άνοιξη, με το ξεκίνημα της βλάστησης. β) Ψεκασμοί φθινοπώρου.	4

Παρατηρήσεις:

1. Σε περίπτωση συνδυασμού του σκευάσματος με οργανοφωσφορικά ή άλλα εντομοκτόνα, η δόση μειώνεται σε 550-1.100 κ.εκ. ανά 100 λίτρα νερό.
2. Κατά τη χρήση του θερινού πολτού τα δένδρα πρέπει να είναι ποτισμένα. Ποτίζουμε μία εβδομάδα πριν από τον ψεκάσμό.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτούγειας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

-

-

-

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες δόσεις, καλλιέργειες και τρόπους εφαρμογής.

Να τηρούνται οι χρονικές αποστάσεις εφαρμογής του πριν ή μετά την εφαρμογή άλλου σκευάσματος με το οποίο απαγορεύεται ο συνδυασμός του.

Δεν πρέπει να εφαρμόζεται κατά την περίοδο που τα δένδρα έχουν μικρή, τρυφερή βλάστηση, πριν γίνει προηγουμένως δοκιμαστική εφαρμογή μικρής έκτασης.

Δεν πρέπει να εφαρμόζεται κατά την περίοδο της ανθήσεως, του δεσίματος των καρπών και του γυαλίσματος (αρχή αλλαγής χρώματος προς ωρίμανση).

Δεν πρέπει να εφαρμόζεται όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32⁰C.

9 Σήμανση σκευάσματος:

10 Φράσεις R:

Κίνδυνοι για τον άνθρωπο: ---

Κίνδυνοι για το οικοσύστημα:

R53 Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

11 Φράσεις S:

Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία:

- S1/2 Να φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
 S13 Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
 S20/21 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.
 S23 Μην αναπνέετε το ψεκαστικό νέφος.
 S25 Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.
 S27 Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό.
 S35 Το υλικό και ο περιέκτης του να διατεθεί με ασφαλή τρόπο.
 S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/ προσώπου.
 S62 Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.
 Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό
 Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του.

Προφυλάξεις για το οικοσύστημα:

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Αποφεύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης.

12 Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. Εάν μετά το πλύσιμο ο ερεθισμός επιμένει, ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Αν υπάρχει αναπνευστικό πρόβλημα: Ο παθών να μεταφερθεί σε καθαρό αέρα. Εάν χρειαστεί ζητείστε ιατρική βοήθεια.

Αντίδοτο: Συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

13 Προστασία των καταναλωτών**13.1** Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs):

Φυτικά προϊόντα	Προσωρινά σε mg/kg
Έχουν καθοριστεί Ευρωπαϊκά MRL's με τον κανονισμό 396/2005	

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Για όλες τις καλλιέργειες	21 ημέρες
Σε περίπτωση αναμίξεως με άλλο σκεύασμα οφείλουμε να τηρούμε την “τελευταία επέμβαση” του άλλου σκευάσματος (αν αυτή είναι πάνω από 21 μέρες).	

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο περιβάλλον. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων αυτή χορηγήθηκε.

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση του από τη χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί παράπτωμα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ