



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 17.12.2012
Αριθ. πρωτ: 3901/43494

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Πιταροκούλη
Τηλέφωνο: 210 928 7254
e-mail: syg081@minagric.gr

Προς: Dow AgroSciences Ltd, Ηνωμένο Βασίλειο
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
Μεσογειών 449,
153 43 Αγία Παρασκευή)
E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com
(με απόδειξη)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 7831 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) **TIGRON 24 EC** (πρώην **Oxyfluorfen ΒΙΟΡΥΛ 24 EC**) ως προς το εμπορικό όνομα, τον παρασκευαστή της δ.ο., τα εργοστάσια παρασκευής της δ.ο., τον κάτοχο της άδειας, τον υπεύθυνο για την τελική διάθεση στην αγορά, τον παρασκευαστή του σκευάσματος, το εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, το μέγεθος συσκευασίας, τον τρόπο εφαρμογής, τη σήμανση και την ημερομηνία λήξης της άδειας»

Κοιν.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 80.5 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τη με **7831** οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **TIGRON 24 EC** (πρώην **Oxyfluorfen ΒΙΟΡΥΛ 24 EC**), η οποία χορηγήθηκε με την αριθμ. 120771/24.07.2007 Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως ισχύει σήμερα.
4. Τη με αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/Β/22.05.2009) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υφυπουργού»».
5. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 798/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Αυγούστου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών oxyfluorfen.
6. Την από 28.12.2011 αίτηση της εταιρείας Dow AgroSciences Ltd δια του υπευθύνου επικοινωνίας της καθώς και τις από 19.01.2012 και 06.04.2012 συμπληρωματικές αιτήσεις.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. **7831** οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) **TIGRON 24 EC (πρώην Oxyfluorfen ΒΙΟΡΥΛ 24 EC)** που χορηγήθηκε με την αριθ. **120771/24.07.2007** Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς το εμπορικό όνομα, τον παρασκευαστή της δ.ο., τα εργοστάσια παρασκευής της δ.ο., τον κάτοχο της άδειας, τον υπεύθυνο για την τελική διάθεση στην αγορά, τον παρασκευαστή του σκευάσματος, το εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, το μέγεθος συσκευασίας, τον τρόπο εφαρμογής, τη σήμανση και την ημερομηνία λήξης της άδειας.

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**1.1 Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

7831**24.07.2007****31.12.2015****1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

TIGRON 24 EC

1.2.β Μορφή:

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

1.3 Δραστική ουσία

Δραστική ουσία	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	Oxyfluorfen
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	97% (β/β) min.
Χημική ομάδα	Διφαινυλαιθέρες
Παρασκευαστής	Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville rd., Indianapolis, IN, 46268, ΗΠΑ
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: Rohm & Haas Company 5000 Richmond Street, Philadelphia, PA 19137, ΗΠΑ Tel: +(001) 989-636-3179 Facsimile: +(001) 989-638-6619 Shangyu Nutrichem Co. Ltd No.9 Weijiu Rd Hangzhou Gulf Fine Chemical Zone, Zhejiang 312369, Κίνα Tel.: +(001) 989-636-3179
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας oxyfluorfen όπως προσδιορίζονται στ με ημερομηνία 28.11.2012 (Αρ . Πρ. ΥπΑΑΤ 12095/119081) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

Dow AgroSciences Ltd,
Latchmore Court,
Brand Street, Hitchin,
Hertfordshire, SG5 1HZ,
Ηνωμένο Βασίλειο

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή
ΑΜΕ6:
Τηλ.: 210-6860100
Fax: 210-6860200
E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή

ΑΜΕ6:

Τηλ.: 210-6860100
Fax: 210-6860200
E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Dow AgroSciences LLC,
9330 Zionsville rd.,
Indianapolis, IN, 46268,
ΗΠΑ

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

Diachem S.p.A, S.S.
11 Padana Superiore Km. 185,
24043 Caravaggio (BG)
Ιταλία (toll manufacturer)

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1) **Diachem S.p.A, S.S.**
11 Padana Superiore Km. 185,
24043 Caravaggio (BG)
Ιταλία

2) **K+N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.,**
ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης.

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Oxyfluorfen 24 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες 77,1 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στην αίτηση με ημερομηνία 28.11.2012 (Αρ . Πρ. ΥπΑΑΤ 12095/119081) και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	εκατό (100), εκατό πενήντα (150), διακοσίων (200), διακοσίων πενήντα (250), πεντακοσίων (500) και χιλίων (1000) κ.εκ.	Πλαστικό τύπου COEX PET (πολυεστέρα)
2	Μπετόνια	δύο (2), τριών (3) , τρισήμισυ (3,5), πέντε (5) και δέκα (10), είκοσι (20) λίτρων, είκοσι πέντε (25) λίτρων	Πλαστικό τύπου COEX PET (πολυεστέρα)

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός του εδάφους με μπεκ τύπου σκούπας και πίεση μικρότερη από δύο (2) atm. Ψεκασμός σε λωρίδες κοντά στο έδαφος από το φθινόπωρο έως τις αρχές της άνοιξης.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

- Ανακινείτε καλά τη φιάλη ή το δοχείο, πριν τα χρησιμοποιήσετε.
- Γεμίστε το ψεκαστικό μέσο μέχρι τη μέση με νερό και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. Υπό συνεχή ανάδευση προσθέστε το υπόλοιπο νερό.
- Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλύνετε τα, ρίχνοντας τα νερά στο ψεκαστικό διάλυμα.

Συνδυαστικότητα: Να μη συνδυάζεται με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστικό εξοπλισμό & ξεπλύνετε το εσωτερικό του με καθαρό νερό. Αφήστε το νερό να κυκλοφορήσει στο σύστημα για 10 λεπτά τουλάχιστον και έπειτα ψεκάστε τα νερά του ξεπλύματος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων (αγρωστώδων και πλατύφυλλων) ζιζανίων.

5 5.1 Φάσμα δράσης

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ (κυβ. εκατ. /στρ.)	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρέμμα	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Αριθμός εφαρμογών
-Εσπεριδοειδή Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ φρούτ, Κίτρο	Ετήσια και πολυετή ζιζάνια (Πλατύφυλλα και αγρωστώδη) (1), (9)	500	30-60	Προφυτρωτικά	1

- Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά)	»	500	30-60	Προφυτρωτικά (2), (3)	1
Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά, Νεκταρινιά, Κορομηλιά, Κερασιά, Βυσσινιά)	»	500	30-60	Προφυτρωτικά	1
- Αμπέλια (Σταφίδες, Οινοποιήσιμα, Επιτραπέζια) (4)	»	500	30-60	Προφυτρωτικά	1
- Ελιές	»	500	30-60	Προφυτρωτικά	1
Κράμβες (Κουνουπίδι, Λάχανο) (5)	»	250-300	30-60	Πριν τη μεταφύτευση και ακολουθεί κατάκλιση.	1
Μελιτζάνα (5)	»	250-300	30-60	Πριν τη μεταφύτευση και ακολουθεί κατάκλιση.	1
Αγκινάρα	»	300	30-60	Προ της βλαστήσεως του ξηροφύτου.	1
Κρεμμύδι	»	150	30-60	α)Μεταφυτρωτικά ως προς την καλλιέργεια, στο στάδιο των 3-4 φύλλων (στο κρεμμύδι από σπόρο) β) Εντός δύο (2) ημερών από την φύτευση (στο κρεμμύδι από κοκκάρι).	1
Ηλιάνθος	»	100	30-60	Μετά την σπορά και πριν το φύτρωμα της καλλιέργειας.	1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα από το στάδιο του σπόρου μέχρι τα 2-4 φύλλα.
2. Να μη γίνεται δεύτερη εφαρμογή τον ίδιο χρόνο.
3. Η εφαρμογή να γίνεται σε ποτισμένο έδαφος.
4. Το αμπέλι πρέπει να είναι ηλικίας άνω των τριών (3) ετών και να είναι υποστυλωμένο ή αναρριχώμενο, γιατί αν είναι σε πολύ μικρή απόσταση από το έδαφος υπάρχει κίνδυνος φυτοτοξικότητας.
5. Για τις κράμβες και τη μελιτζάνα η μεγάλη δοσολογία εφαρμόζεται όταν ο πληθυσμός των ζιζανίων είναι μεγάλος και τα ζιζάνια βρίσκονται σε μεσαίο ή μέγιστο στάδιο ανάπτυξης.
6. Να χρησιμοποιείται μόνο στο κρεμμύδι που προορίζεται για παραγωγή ξηρών βολβών.
7. Στο κρεμμύδι να μην εφαρμόζεται με κρύο και υγρό καιρό.
8. Στον ηλιάνθο δόση μεγαλύτερη από 120 κ.εκ./στρ. δρα φυτοτοξικά.

9. Ζιζάνια:**α) Καταπολεμούμενα ζιζάνια**

Αγριομπαμπακιά (*Abutilon theophrasti*), Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis*), Αλεπονουρά (*Alopecurus myosuroides*), Αντράκλα (*Portulaca oleracea*), Βερόνικα (*Veronica spp.*), Δωδεκάνθι (*Lamium amplexicaule*), Ελευσίνη (*Eleusine indica*), Ζωχοί (*Sonchus spp.*), Ήρες (*Lolium spp.*), Λουβουδιά

(*Chenopodium album*), *Μαρτιάκος* (*Senecio vulgaris*), *Μεγάλο βλήτο* (*Amaranthus retroflexus*), *Μικρή τσουκνίδα* (*Urtica urens*), *Μουχρίτσα* (*Echinochloa crus-galli*), *Οξαλίδα* (*Oxalis pes-carpae*), *Περιπλοκάδα* (*Convolvulus arvensis*), *Ραπανίδα* (*Raphanus raphanistrum*), *Σετάριες* (*Setaria spp*), *Στελλάρια* (*Stellaria spp*), *Στόφνος* (*Solanum nigrum*), *Τάτουλας* (*Datura stramonium*), *Φυσαλίδα* (*Physalis spp.*).

β) Ανθεκτικά ζιζάνια

Καλεντούλα (*Calendula arvensis*), Λάπαθα (*Rumex spp.*).

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί.

Αποφεύγετε τη χρήση του σε οργανικά εδάφη.
Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
Αν ρυπανθούν τα νερά αρδύσεως, να μη χρησιμοποιηθούν για άμεση άρδευση.
Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών.

7.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μη σπέρνετε και μη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια πριν περάσουν δέκα (10) μήνες από την εφαρμογή του.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Στις καλλιέργειες που δεν συνιστάται μπορεί να προκαλέσουν φυτοτοξικότητα ακόμα και τα σταγονίδια του ψεκαστικού υγρού. Στον ηλιάνθο προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν γίνει υπέρβαση της δόσης. Στο κρεμμύδι συνήθως παρατηρείται και νέκρωση των άκρων των φύλλων, που όμως δεν έχει επιπτώσεις στην παραγωγή, γιατί είναι παροδική. Η φυτοτοξικότητα αυτή είναι πιο έντονη όταν ο καιρός είναι κρύος και υγρός.

9 Σήμανση σκευάσματος:

T - Τοξικό
N - Επικίνδυνο για το περιβάλλον

10 Φράσεις R

R38 Ερεθίζει το δέρμα.
R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
R61 Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.
R65 Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περιπτωση κατάποσης.
Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα και πουλιά.
Μέτρια τοξικό για τις μέλισσες.

11 Φράσεις S

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, ή καπνίζετε.
S35 Το υλικό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατεθεί με ασφλή τρόπο
S37 Να φοράτε κατάλληλα γάντια
S53 Αποφεύγετε την εκθεση- εφοδιαστείτε με τις ιδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
S57 Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.

Μην ψεκάζετε όταν οι μέλισσες είναι παρούσες.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Σε περίπτωση ατύχηματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

Ποτέ μη χορηγείτε υγρά και μην προκαλείτε εμετό εάν ο ασθενής δεν έχει τις αισθήσεις του ή παρουσιάζει σπασμούς.

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε ιατρική βοήθεια. Ο γιατρός θα αποφασίσει εάν θα προκληθεί εμετός.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο εάν εμφανιστεί ερεθισμός.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυνθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Συμβουλευθείτε γιατρό εάν εμφανιστεί ερεθισμός.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον πάσχοντα στον καθαρό αέρα. Συμβουλευθείτε γιατρό.

Για το γιατρό: Υποστηρικτική & συμπτωματική θεραπεία. Το προϊόν περιέχει μίγμα διαλυτών. Ο κίνδυνος εισόδου από πνεύμονες σε περίπτωση γαστρικής πλύσης πρέπει να ληφθεί υπ όψιν.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

13 Προστασία των καταναλωτών**13.1** Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)

Φυτικά προϊόντα	MRL's σε mg/kg
Έχουν καθοριστεί Ευρωπαϊκά MRLs στο Παράρτημα II του κανονισμού 396/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008.	

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Κρεμμύδι	60 ημέρες
Λοιπές καλλιέργειες	21 ημέρες

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του, σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασίες άνω των 5°C, μακριά από άμεση έκθεσή του στο φως, παραμένει σταθερό για 2 (δύο) χρόνια.

15 **Α. Ανάκληση της άδειας-παράταση της άδειας**

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της άδειας δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων αυτή χορηγήθηκε.

Η άδεια θα ανακληθεί στις **31.12.2013** εάν δεν υποβληθεί από τον κάτοχο της άδειας αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο που πληρεί τις απαιτήσεις του Παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 545/2011 για την αξιολόγηση των στοιχείων σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

B **Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η άδεια.
2. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της άδειας του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

M. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ