



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΠ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 28-1-2016  
Αριθ. πρωτ: 991/11648**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 928 7211  
e-mail: [inasiopoulos@minagric.gr](mailto:inasiopoulos@minagric.gr)**

**Προς: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.  
Παραδείσου 2 & Κηφισίας  
151 25 Μαρούσι  
Κοιν.: ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ**

**ΘΕΜΑ: «1. Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά (επανεγκριση) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) SEGETHION 80 WG (δραστική ουσία: sulphur).  
2. Ανάκληση της με αριθ. 6780 άδειας διάθεσης στην αγορά »**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup>-10-2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011, όπως ισχύει, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνεται η δραστική ουσία sulphur.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10<sup>ης</sup>-6-11 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
7. Τον Κανονισμό 1272/2008 του Ε. Κ. και του Συμβουλίου της 16-12-08 “για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006”.
8. Τη με αριθ. 14309/162816/22.12.14 Απόφασή μας με θέμα “Αντικατάσταση των εθνικών απαιτήσεων κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστ. προϊόντων βάση του Καν. 1107/2009”.

9. Τη με αριθ. 150/1085/7.1.16 Απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 60.493 άδεια διάθεσης στην αγορά στο πανομοιότυπο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) KUMULUS S 80 WG (δραστική ουσία: sulphur).
10. Τη με αριθ. 102443/19.7.99 Απόφασή μας, η οποία τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 92298/19.1.11, 2767/30662/11.3.13 και 3447/37808/2.12.14 Αποφάσεις μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 6780 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) SEGETHION 80 WG (δραστική ουσία: sulphur, αρχική ονομασία SULFOLAC 80 WG).
11. Τη με αριθ. 11893/1374969/11.11.13 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής για τη «Διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων».
12. Τις με αριθ. πρωτ. 7184/73206/29.6.12, 393/5260/15.1.14 και 3447/37808/20.3.14 σχετικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.
13. Τη με αριθ. Υ 26/6.10.15 (Β' 2144) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.
14. Τη με αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β' 2367/4.11.15) με θέμα την «*Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων*».
15. Το από .....-1-2016 Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- A.** Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά (επανεγκριση) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) SEGETHION 80 WG (δραστική ουσία: sulphur). Η έγκριση χορηγείται με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΑΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης  
1.1.β Ημερομηνία λήξης

<b>60.502</b>
<b>28.1.2016</b>
<b>31.12.2020</b>

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα  
1.2.β Μορφή:

<b>SEGETHION 80 WG</b>
<b>Βρέξιμοι κόκκοι (WG)</b>

**1.3 Δραστική ουσία**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	<b>sulphur</b>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	<b>990 g/kg.</b>
Χημική ομάδα	
Παρασκευαστής	BASF SE Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen Γερμανία
Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.	1. BASF SE 67056 Ludwigshafen Γερμανία 2. Solvadis Königsberger Str. 1 60487 Frankfurt am Main Γερμανία
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας sulphur προσδιορίζονται στο Part C του dRR της αίτησης με ημερομηνία 29-06-2012 (Αρ. Πρωτ. 8529/95112) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της έγκρισης:

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε  
Παραδείσου 2 & Κηφισίας,  
151 25 Μαρούσι  
ΑΜΕ: BASGR  
Τηλ.: 2106860120  
Fax: 2106860200  
E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε  
Παραδείσου 2 & Κηφισίας,  
151 25 Μαρούσι  
ΑΜΕ: BASGR  
Τηλ.: 2106860120  
Fax: 2106860200  
E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε  
Παραδείσου 2 & Κηφισίας,  
151 25 Μαρούσι  
ΑΜΕ: BASGR  
Τηλ.: 2106860120  
Fax: 2106860200  
E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

BASF SE  
Carl-Bosch-Strasse 38,  
67056 Ludwigshafen  
Γερμανία

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

1. BASF SE  
Carl-Bosch-Strasse 38,  
67056 Ludwigshafen  
Γερμανία  
2. BASF S.A.  
Av Brasil 791  
Bairro Eng. Neiva  
12521-900 Guaratinguetá - SP/Βραζιλία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

1. BASF SE  
Carl-Bosch-Strasse 38,  
67056 Ludwigshafen  
Γερμανία  
2. BASF S.A.  
Av Brasil 791  
Bairro Eng. Neiva  
12521-900 Guaratinguetá - SP/Βραζιλία  
3. Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε., 57022 ΒΙ.ΠΕ.  
Σίνδου, Θεσσαλονίκη  
4. AGROTECHNICA Ο.Β.Ε.Ε., ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου,  
Θεσσαλονίκη  
5. AGROPHARM Α.Β.Ε.Ε., Οινόφυτα Βοιωτίας  
6. ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ, Οινόφυτα Βοιωτίας

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία Sulphur 80 % β/β  
Βοηθητικές ουσίες 19.2% β/β  
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στο Part C του dRR της αίτησης με ημερομηνία 29-06-2012 (Αρ. Πρωτ. 8529/95112) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

## 2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Σακίδια μέσα σε κουτί	100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800 γρ., 1 κιλού, (1,2), (1,25), (1,4), (1,5), 2, (2,5), 3, 4 και 5 κιλών	Σακίδιο πολυαιθυλενίου, μέσα σε κουτί χάρτινο
2	Σακίδια	100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800 γρ., 1 κιλού, (1,2), (1,25), (1,4), (1,5), 2, (2,5), 3, 4 5, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 30 και 50 κιλών	Σακίδιο πολυαιθυλενίου
3	Σάκοι	100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800 γρ., 1 κιλού, (1,2), (1,25), (1,4), (1,5), 2, (2,5), 3, 4 5, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 30 και 50 κιλών	Χάρτινοι σάκοι με εσωτερική επένδυση πολυαιθυλενίου

<b>3</b> Οδηγίες χρήσης:	<b>Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες</b>
	<u>Τρόπος εφαρμογής:</u> Ψεκασμοί φυλλώματος
	<u>Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:</u> Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αργά στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
	<u>Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:</u> Αμέσως μετά το τέλος του ψεκασμού, αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύντε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, δυο-τρεις (2-3) φορές με καθαρό νερό. Επειδή το θειάφι διαβρώνει τα μέταλλα, οι ψεκαστήρες πρέπει να πλένονται πολύ καλά αμέσως μετά το τέλος του ψεκασμού.
	<u>Συνδυαστικότητα:</u> Δεν συνδυάζεται με παραφινικό λάδι καθώς και με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης.
<u>Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:</u> Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακίδια, σάκοι) μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.	

<b>4</b> Κατηγορία και τρόπος δράσης:	Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση
---------------------------------------	---

**5** 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο. Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		γραμ./100 λίτρα ψεκ. υγρό	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα	γραμ./στρ		
Εσπεριδοειδή	<b>Άκαρι</b> ( <i>Eriophyes sp.</i> )	200 - 500	50 - 300	750	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων	8/7
Μηλιά Αχλαδιά	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Podosphaera leucotricha</i> )	400-500	100-150	600	Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών  Πριν την άνθηση στα στάδια πράσινη και ρόδινη κορυφή.	8/7

	<b>Φουζικλάδιο</b> ( <i>Venturia inaequalis</i> )	200-300			Μετά την άνθηση στην πτώση των πετάλων	
Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Κερασιά, Δαμασκηινιά	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Sphaerotheca pannosa</i> )	300 - 400	50-150	600	Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας, στα στάδια πτώσης πετάλων, απόσπασης του κάλυκα και στο στάδιο καρπιδίου.	8/7
Φουντουκιά	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Phyllactinia guttata</i> )  <b>Ακάρεια</b> ( <i>Eriophyes sp.</i> , <i>Phytoptus avelanae</i> )	200 - 500	50-100	500	Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας  Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων	8/7  2/7
Αμυγδαλιά	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Sphaerotheca pannosa</i> )	200 - 500	50-100	500	Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας	8/7
Ελιά (ποικιλία πράσινη ελιά Χαλκιδικής)	Ακάρεια της οικογένειας <i>Eriophyidae</i>	320	100-120	384	Ψεκασμός φυλλώματος. Εφαρμογή κατά το στάδιο σχηματισμού των ανθοφόρων οφθαλμών (Απρίλιο) & κατά την πτώση των πετάλων (τέλος ανθοφορίας).	2/30
Λωτός Αβοκάντο Παπάγια Μάγκο	<b>Ωίδιο</b>	200-500	50 - 150	750	Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας	8/7
Αμπέλι (οινοποιήσιμες και επιτραπέζιες ποικιλίες)	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Uncinula necator</i> )	200-400  100 - 200	50-150	600  300	Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών  Όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκατ.  Κατά την άνθηση, μετά το δέσιμο των ραγών και κάθε 15-20 μέρες μέχρι το στάδιο του «γυαλίσματος» των ραγών ανάλογα πάντοτε με την	8/10

	<b>Ερίνωση</b> ( <i>Eriophyes vitis</i> )	1000	50-150	1500	ένταση της προσβολής.  Λίγο πριν τη διόγκωση των οφθαλμών.	
Φράουλα (Υ - Θ)	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Sphaerotheca macularis</i> , <i>Podosphaera aphanis</i> )  <b>Άκαρι</b> ( <i>Eriophyes sp.</i> , <i>Aculops lycopersici</i> )	--	50-100	500  500 - 750	Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας ή της προσβολής	8/10-14
Βατόμουρα, Σμέουρα, Μύρτιλλα	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Sphaerotheca macularis</i> , <i>Podosphaera aphanis</i> )	--	50-100	500	Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας	6/14
Καρότα (Υ -Θ) Παντζάρι, Ραπάνια, Λαγόχορτο, Παστινάκι	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Erysiphe spp</i> , <i>Oidium spp.</i> )	--	50-100	300 – 400	Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας	8/7 - 10
Σκόρδο, Κρεμμύδι	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Leveillula taurica</i> )	--	50-100	300 – 400	Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας	8/7 - 10
Τομάτα Μελιτζάνα Πιπεριά (Υ -Θ)	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Leveillula taurica</i> <i>Oidium spp.</i> <i>Erysiphe cichoracearum</i> ) <b>Ακάρια</b> Τετράνυχος ( <i>Tetranychus urticae</i> ) <i>Eriophyes sp.</i> Παραμορφωτικό άκαρι ( <i>Aculops lycopersici</i> )		50-100	300	Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας ή της προσβολής	8/7 - 10
Κολοκυνθοειδή: -Αγγούρι -Αγγουράκι -Κολοκυθάκι, - Κολοκύθα -Πεπόνι -Καρπούζι (Υ -Θ)	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> <i>Sphaerotheca fuliginea</i> , <i>Podosphaera xanthii</i> )		50-100	300	Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών	8/7 - 10
Λάχανο, Κουνουπίδι, Μπρόκολο Λαχανάκι	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Erysiphe spp</i> , <i>Sphaerotheca spp.</i> )	--	50 - 100	300	Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας ή της	8 / 7-15

Βρυξελλών (Υ -Θ)	<b>Τετράνυχος</b> ( <i>Tetranychus</i> <i>sp.</i> )				προσβολής	
Μαρούλι και λοιπά σαλατικά, Σπανάκι Λυκοτρίβολο, Σκαρόλα, Κιχώριο, Αντίδι κατσαρό, Ραδίκι	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Oidium spp.</i> , <i>Erysiphe</i> <i>cichorasearum</i> ) <b>Τετράνυχος</b> ( <i>Tetranychus</i> <i>urticae</i> )	--	50 - 100	400	Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας ή της προσβολής	8 / 7-10
Φασόλια (φρέσκα με λοβό και χωρίς λοβό) (Υ -Θ)	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Oidium spp.</i> , <i>Erysiphe spp</i> )	--	50 - 100	300-400	Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας	8 / 7 - 10
Μπιζέλια (αρακάς) (φρέσκα με λοβό και χωρίς λοβό) (Υ -Θ)	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Oidium spp.</i> , <i>Erysiphe spp</i> )	--	50 - 100	300-400	Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας	8 / 7 - 10
Αγκινάρα	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Leveillula</i> <i>taurica</i> , <i>Oidium spp</i> ) <b>Τετράνυχος</b> ( <i>Tetranychus</i> <i>urticae</i> )	--	50 - 100	500	Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας ή της προσβολής	8 / 7 - 10
Φασόλια ξηρά (όσπρια)	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Oidium</i> <i>spp.</i> , <i>Erysiphe</i> <i>spp</i> )	--	50 - 100	300-400	Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας	8 / 7 - 10
Μπιζέλια ξηρά (αρακάς- ρεβίθι) (όσπρια )	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Oidium</i> <i>spp.</i> , <i>Erysiphe</i> <i>spp</i> )	--	50 - 100	300-400	Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας	8 / 7 - 10
Πατάτα	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Leveillula</i> <i>taurica</i> )	--	50 - 100	500	Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας	8 / 7
Ηλιάνθος	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Erysiphe spp</i> )		50 – 100	500	Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας	2/ 7
Σόγια			60 - 100			2 /14
Ζαχαρότευτλα	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Erysiphe</i> <i>betae</i> )	--	20 - 60	750-1000	Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας	2/14
	Τετράνυχος ( <i>Tetranychus</i> <i>urticae</i> )	240-480	40-100	480	Με την έναρξη της προσβολής και επανάληψη ανάλογα με την εξέλιξη αυτής.	3
Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη.	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Erysiphe</i> <i>graminis</i> )	--	20-60	750-1000	Συνήθως μία εφαρμογή όταν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα.	2/14



					Σε περίπτωση σοβαρής προσβολής του τελευταίου φύλλου, απαιτείται μία δεύτερη εφαρμογή στην αρχή του ξεσταχυάσματος.	
Λυκίσκος	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Podospheera macularis</i> ) <b>Τετράνυχος</b> ( <i>Tetranychus urticae</i> )	--	100-200	750-1200	Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας ή της προσβολής	8 / 7
Καπνός	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> )	--	50-100	400	Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας	8 / 7
Καλλωπιστικά- Ανθοκομικά: Τριανταφυλλιά	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Oidium spp.</i> <i>Sphaerotheca spp.</i> <i>Podospheera pannosa</i> ) <b>Άκαρι</b> ( <i>Panonychus ulmi</i> , <i>Tetranychus urticae</i> )	200-300	50-100	300	Μόλις οι βλαστοί αποκτήσουν μήκος 10-15 εκατ. και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής.	8 / 7
Δασικά δένδρα Λεύκα (φυτώριο)	<b>Ωίδιο</b>	--	50-100	500	Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας	3 / 7

## Παρατηρήσεις

1. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με το στάδιο ανάπτυξης του φυτού.
2. Η δόση / HL να συνδυαστεί κατάλληλα με τον όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην υπερβαίνεται η μέγιστη επιτρεπτή δόση / στρ.
3. Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών.
4. Στις καλλιέργειες και στις περιοχές που εφαρμόζονται, να ακολουθούνται τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.
5. Η χρήση του σκευάσματος μπορεί να ενταχτεί σε προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών
6. Το θειάφι δεν δρα σε θερμοκρασία μικρότερη των 18°C.
7. Δρα καλύτερα σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 20 °C
8. Διακοπή ψεκασμών το λιγότερο 2-3 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή των ζαχαρότευτλων.
9. Στα καλλωπιστικά (πλην τριανταφυλλιάς) να διενεργείται δοκιμή μικρής έκτασης (σε 1-2 φυτά) πριν από τη γενικευμένη χρήση, για την αποφυγή φαινομένων φυτοτοξικότητας.

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο [Παράρτημα II](#) της παρούσας

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Στην καλλιέργεια του αμπελιού να μην εφαρμόζεται πολύ κοντά στη συγκομιδή καθώς αφήνει σημάδια πάνω στους καρπούς

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
  - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
  - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

--

--

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκάστηκα υγρό στα φυτά

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Μη χρησιμοποιείτε το σκεύασμα μέσα σε 4 εβδομάδες από την εφαρμογή πολλού, γιατί προκαλεί φυτοτοξικότητα.  
 Σε υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 30 °C) μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στα φυτά.  
 Μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα στα κολοκυνθοειδή, καθώς και σε ορισμένες ποικιλίες μηλιάς (όπως STARKING, DELICIOUS κ.α.), αχλαδιάς (όπως D'ANJOU κ.α.) και βερικοκιάς κάτω από συνθήκες υψηλής ηλιοφάνειας και υψηλών θερμοκρασιών.

- 9** Εικονογράμματα Κινδύνου:

--  
 Προειδοποιητική λέξη --

- 10** Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

--

- 11** Δηλώσεις Προφύλαξης:

**P102+P405** Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.  
**P234** Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη  
**P270** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
 “Φοράτε κατάλληλα γάντια, προστατευτικά ενδύματα και μάσκα κατά την ανάμιξη/φόρτωση»  
 “Φοράτε κατάλληλα γάντια, προστατευτικά ενδύματα και μπότες κατά την εφαρμογή»  
 «Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια σε περίπτωση που εισέλθουν στον αγρό μετά την εφαρμογή»  
**SP1** Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τα κενά συσκευασίας του  
**SPe 3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια ανέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα  
**SPe 3** Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήσετε μια ανέκαστη ζώνη ασφαλείας από ακαλλιέργητη γη:  
**5 μέτρων** σε αμπέλια, τροπικά δένδρα, ελιές, λυκίσκος, καλλωπιστικά όταν η εφαρμογή γίνεται με συμβατικά ακροφύσια  
**10 μέτρων** σε άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες και σε δασικά δένδρα λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή γίνεται με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή **5 μέτρων** με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75% ή **3 μέτρων** με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 90% .  
**EUH401** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό).  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. Μην χορηγήσετε τίποτα από το στόμα και μην προκαλέσετε εμετό σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.  
**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε θεραπεία συμπτωματική.  
**ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:** 210-77.93.777

**13** Προστασία των καταναλωτών**13.1** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Ελιά	90
Ζαχαρότευτλα	μη εφαρμόσιμο
Λοιπές καλλιέργειες του φάσματος δράσης	---

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο και μακριά από εστίες φωτιάς. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο(2) χρόνια.

**15.** Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχεθήκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16.** Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο Παράρτημα III της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**B.** Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/11 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Γ.**

**Ανακαλούμε** τη με αριθ. **6780** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SEGETHION 80 WG (δραστική ουσία: sulphur, αρχική ονομασία SULFOLAC 80 WG), η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 102443/19.7.99 Απόφασή μας και τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 92298/19.1.11, 2767/30662/11.3.13 και 3447/37808/2.12.14 Αποφάσεις μας, και ορίζουμε τα ακόλουθες περιόδους χάριτος για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος στην αγορά:

1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς της επιχειρήσεις χονδρικής και λιανικής πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων για 3 ακόμη μήνες.
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπάρχοντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης για έξι μήνες από την υπογραφή της παρούσας.
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπάρχοντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω.
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες (μετά το πέρας των προθεσμιών που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 ανωτέρω), θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.
5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

**Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης  
Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής**

**ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ**