



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Αθήνα, 12 – 07 - 2013  
Αριθ. πρωτ: 7311/80246**

**Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 928 72 11  
e-mail: [syg046@minagric.gr](mailto:syg046@minagric.gr)**

**Προς: BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ  
Σωρού 18 - 20  
15125 – Μαρούσι**

**ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) CONFIDOR 200 SL σε εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού 485/2013/ΕΕ και ως προς τα εργοστάσια παρασκευής και τις συσκευασίες του σκευάσματος»**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24-11-2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
2. Το Νόμο υπ' αριθ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012/τΑ') με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις».
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό αριθ. 540/2011/ΕΕ (L 153/11-6-2011) "σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών", όπως ισχύει.
4. Τον Κανονισμό 485/2013/ΕΕ (L 139/25-5-2013) με θέμα την "τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011, όσον αφορά τους όρους έγκρισης των δραστικών ουσιών clothianidin, thiamethoxam και imidacloprid και για την απαγόρευση της χρήσης και πώλησης σπόρων που έχουν υποστεί επέμβαση με φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτές τις δραστικές ουσίες".
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 280665/06-04-2009 (ΦΕΚ 970/22-5-2009/τΒ') απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με Έντολή Υφυπουργού».
6. Τη με αριθ. πρωτ. 7311/80246/28.6.13 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

1. **Τροποποιούμε** την με αριθ. **1616** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **CONFIDOR 200 SL**, ως προς τα εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος, τις συσκευασίες, το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή. Οι παράγραφοι 1.4.δ), 2.2, 5.1 και 13.2 της με αριθ. 183711/21.4.10 Υπ. Απόφασης, διαμορφώνονται ως ακολούθως:

1.4.δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση):	
1.	Bayer CropScience AG Alte Heerstrasse 41538 Dormagen, Germany
2.	Bayer CropScience S.r.l. Divisione Agraria Produzione Stabilimento di Filago Via delle Industrie 9 24040 Filago (Bergamo), Italy
3.	Bayer CropScience AG Industriepark Höchst 65926 Frankfurt, Germany
4.	Bayer Türk Kimya San. Ltd. Sti. Bayer CropScience Baris Mahallesi Anibal Caddesi No. 1 41410 Gebze / Kocaeli, Turkey
5.	Bayer CropScience LP 8400 Hawthorn Road Kansas City, MO 64120, USA
6.	Bayer CropScience AG Chemiepark Knapsack 50354 Hürth, Germany
7.	Bayer SAS, Bayer CropScience Site de Marle Rue Antoine Laurent de Lavoisier ZI BP2 02250 Marle-sur-Serre, Zone Industrielle France
8.	Bayer (Pty) Ltd. Fifth Avenue, Vorsterkroon PO Box 1318, Nigel 1491 South Africa
9.	Bayer CropScience, S.L. A-3, Madrid – Valencia, KM 342 46930 – Quart de Poblet (Valencia) Spain
10.	SBM Formulation S.A. Z.I. AV. Jean Foucault, CS 621 34535 Beziers Cedex, France
11.	Schirm GmbH Geschwister-Scholl-Strasse 127 39218 Schönebeck (Elbe) Germany
12.	Bayer SAS, Bayer CropScience Site de Villefranche 1 avenue Edouard Herriot, BP 442–Limas 69656 Villefranche-sur-Saone Cedex FranceBP 442 - Limas 69656 Villefranche-sur-Saône Cedex, France

## 2.2 Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιαλίδια	10 κ.εκ.	-HDPE - PA / ADHESIVE / HDPE (από μέσα προς τα έξω) - EVOH / ADHESIVE / HDPE (από μέσα προς τα έξω) - HDPE / ADHESIVE / EVOH / ADHESIVE / HDPE (από μέσα προς τα έξω)
2	Φιαλίδια	2 x 5 κ.εκ. (10 κ.εκ.)	
3	Φιάλη	20 κ.εκ.	
4	Φιάλη	100 κ.εκ.	
5	Φιάλη	200 κ.εκ.	
6	Φιάλη	250 κ.εκ.	
7	Φιάλη	300 κ.εκ.	
8	Φιάλη	500 κ.εκ.	
9	Φιάλη	1 λίτρο	
10	Φιάλη	2 λίτρα	
11	Φιάλη	5 λίτρα	

## 5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα εφαρμογών
		κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκάστικ ού υγρού/ στρέμμα	κ.εκ./ στρέμμα		
Εσπεριδοειδή: Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ-φρούτ	-Εριώδης αλευρώδης ( <i>Aleurothrixus floccosus</i> )	75	200-400	150-300	Ψεκάσμος φυλλώματος <b>μετά την περίοδο της ανθοφορίας.</b> Με την εμφάνιση των νυμφών του εντόμου (στάδια L1 και L2).	2 εφαρμογές ανά 20-30 ημέρες
	-Φυλλοκνίστης ( <i>Phyllocnistis citrella</i> )	50-75*	200-400	100-300	Ψεκάσμος φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής, <b>μετά την περίοδο της ανθοφορίας.</b>	
Αχλαδιά	Ψύλλα αχλαδιάς ( <i>Cacopsylla pyri</i> )	60	150	90	Ψεκάσμος φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής, μετά την καρπόδεση έως την έναρξη αλλαγής χρώματος (BBCH 71-79).	1
Ροδακινιά	-Αφίδες ( <i>Myzus persicae</i> , <i>M. nicotianae</i> )	25-30*	150-250	37,5-75	Ψεκάσμος φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής, μετά την καρπόδεση έως την έναρξη αλλαγής χρώματος (BBCH 71-79).	2 εφαρμογές ανά 28 ημέρες
Τομάτα υπαίθρου	-Αφίδες ( <i>Macrosiphum euphorbiae</i> ) -Αλευρώδης ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> )	50	50-100	25-50	Ψεκάσμος φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής.	2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες
Τομάτα θερμοκηπίου	-Αλευρώδης ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> )	---	---	75-125 (5)	Ριζοπότισμα με το νερό της άρδευσης.	2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες

Αγγούρι (θερμοκηπίου)	Αλευρώδης ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> )	---	---	75-125 (5)	Ριζοπότισμα - προληπτική εφαρμογή	2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες
Βαμβάκι	Αφίδες ( <i>Aphis gossypii</i> )	---	50-80	50	Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής <b>μετά την περίοδο της ανθοφορίας.</b>	2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες
Πατάτα	-Αφίδες ( <i>Macrosiphum euphorbiae</i> ) -Δορυφόρος ( <i>Leptinotarsa decemlineata</i> )	---	50-100	50	Με την έναρξη της προσβολής και μέχρι 4 αφίδες ανά φύλλο. Να μην εφαρμόζεται όταν υπάρχει μελίτωμα.	2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες
Καπνός	-Αφίδες ( <i>Myzus persicae</i> , <i>M. nicotianae</i> )	25-60	50-100	25-30	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται με την επανεμφάνιση της προσβολής	2 εφαρμογές ανά 20-30 ημέρες
		---	---	50-100 (5)	<u>Ριζοπότισμα</u> με το νερό της μεταφύτευσης	1

\*: το εύρος της δόσης εξαρτάται από την ένταση της προσβολής

### **Παρατηρήσεις:**

- (1): Στα εσπεριδοειδή σε προγράμματα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης συνιστάται να εφαρμόζεται όταν υπάρχει μικρός πληθυσμός ακμαίων του παρασίτου *Cales noacki* ωρίμων για ωοτοκία.
- (2): Στα εσπεριδοειδή σε περίπτωση προχωρημένης προσβολής (μικτός πληθυσμός) ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται 20-30 ημέρες από τον προηγούμενο.
- (3): Στα εσπεριδοειδή για την καταπολέμηση του Φυλλοκνίστη (*Phyllocnistis citrella*) η μικρή δόση συνιστάται για μικρή πίεση προσβολής ενώ η μεγάλη δόση για μεγάλη πίεση προσβολής.
- (4): Στα εσπεριδοειδή σε περίπτωση προχωρημένης προσβολής εριώδη αλευρώδη (μικτός πληθυσμός) συνιστάται η προσθήκη (TANK-MIX) θερινού λαδιού σε δόση 1 λίτρου.
- (5): Στις περιπτώσεις εφαρμογής με ριζοπότισμα, το εύρος των δόσεων εξαρτάται από την πυκνότητα των φυτών
- (6) Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα όταν οι μέλισσες είναι σε φάση έντονης κινητικότητας.
- (7) Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα κατά την περίοδο της άνθισης.
- (8) Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα σε περίπτωση που εμφανίζεται μελίτωμα (π.χ. περισσότερο από 4 αφίδες ανά φύλλο).

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αγλαδιά, Τομάτα Υπαίθρου, Τομάτα Θερμοκηπίου, Αγγούρι Θερμοκηπίου, Καπνός	7
Καπνός (ριζοπότισμα)	Μία εφαρμογή κατά τη μεταφύτευση
Ροδακινιά, Πατάτα	14
Εσπεριδοειδή	21
Βαμβάκι	28

2. Από τις **30/9/2013** και μετά επιτρέπεται η τιμολόγηση του σκευάσματος από τον κάτοχο της έγκρισης ή τον υπεύθυνο για τη διάθεση του σκευάσματος στην αγορά, μόνο εφόσον φέρει ετικέτα σύμφωνη με τα οριζόμενα στην παρούσα Απόφαση.

3. Επιτρέπουμε την **πώληση** των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος με την παλιά ετικέτα από τα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, μέχρι τις **30/11/2013**. Μετά την ημερομηνία αυτή, τυχόν αδιάθετες ποσότητες του σκευάσματος φέρουσες την παλιά ετικέτα, να επιστραφούν στην εταιρεία BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ.
4. Επιτρέπουμε τη χρήση του σκευάσματος από τους επαγγελματίες χρήστες σύμφωνα με την παλιά ετικέτα, μέχρι τις **30/11/2013**. Μετά την ημερομηνία αυτή, η χρήση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Απόφαση.
5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
6. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 183711/21.4.10 Απόφασή μας, όπως ισχύει σήμερα.

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ**