



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 24-10-2013
Αριθ. πρωτ: 6719/72940

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Άννα Παπαμιχαήλ
Τηλέφωνο: 210 928 7220, 7237
e-mail: syg039@minagric.gr

Προς: AGROLOGY Παπαιοκονόμου ΑΒΕΕ
Τ.Θ. 1089, Βι.Πε. Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57 022, Σίνδος

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 60298 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) MANCORON 80 WP (mancozeb) ως προς τα εργοστάσια παρασκευής της δραστικής ουσίας, τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, τις συσκευασίες, το φάσμα δράσης, την τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή και τις φράσεις S»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Την με αριθ. **60298** οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **MANCORON 80 WP (mancozeb)**, η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 188162/6-9-2010 Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4. Τη με αριθ. 462/106101/3.9.2013 (Β' 2240/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για "Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος" του δικαιώματος να υπογράφουν «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού».
5. Την από 13-6-2013 αίτηση της εταιρείας AGROLOGY Παπαιοκονόμου ΑΒΕΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

I. Τροποποιούμε τη με αριθ. **60298** οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **MANCORON 80 WP** (mancozeb) που χορηγήθηκε με την αριθ. 188162/6-9-2010 Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς τα εργοστάσια παρασκευής της δραστικής ουσίας, τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, τις συσκευασίες, το φάσμα δράσης, την τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή και τις φράσεις S.

Συγκεκριμένα τα σημεία **1.3.δ., 1.4.δ., 1.4.ε., 2.1., 5.1., 11 και 13** διαμορφώνονται ως εξής:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

δ) Εργοστάσια παρασκευής των δ.ο.

1. Cerexagri B.V., Ολλανδίας

Tankhoofd 10 , 3196 KE Vondelingenplaat/Rotterdam
The Netherlands

Tel. + (31) 10 472 5395

Fax. + (31) 10 472 5318

Person to contact: Adrie Van Beijnen

Telephone No.:+ (31) 10 472 5380

Telefax No.:+ (31) 10 472 5318

e-Mail: Adrie.Van-Beijnen@uniphos.com

2. United Phosphorous Limited, Ινδίας

Plot No. 750. GIDC Jhagadia, Bharuch, PIN 396-195,
Gujarat, India

Person to contact: Paresh Talati

Telephone No.: +91 (22) 2604 1265

e-mail: talatipv@uniphos.com

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

1. Cerexagri B.V. , Ολλανδίας

Tankhoofd 10, 3196 KE Vondelingenplaat/Rotterdam
The Netherlands

Tel. + (31) 10 472 5395

Fax. + (31) 10 472 5318

Person to contact: Adrie Van Beijnen

Telephone No.:+ (31) 10 472 5380

Telefax No.:+ (31) 10 472 5318

e-Mail: Adrie.Van-Beijnen@uniphos.com

2. United Phosphorous Limited, Ινδίας

Plot No. 750. GIDC Jhagadia, Bharuch, PIN 396-195,
Gujarat, India

Person to contact: Paresh Talati

Telephone No.: +91 (22) 2604 1265

e-Mail: talatipv@uniphos.com

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1) **AGROLOGY Παπαικονόμου ΑΒΕΕ**
ΒΙ.ΠΕ.Θ., Σίνδος, Τ.Κ.57022
- 2) **ΑΛΦΑ Γεωργικά Εφόδια ΑΕΒΕ**
Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτίας, Τ.Κ.32011
- 3) **Cerexagri B.V., Ολλανδίας**
- 4) **United Phosphorous Limited, Ινδίας**

2 Συσκευασία(ες)

2.1. Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Κουτί με εσωτερικό σακίδιο.	200, 250, 300, 400, 500, 600γρ. και 1κιλού 1.2 , 2 , 2.5 , 3 , 6 και 10 κιλών	Χάρτινο κουτί με εσωτερικό σακίδιο πολυαιθυλένιο.
2.	Σακίδια	200, 250, 300, 400, 500, 600γρ. και 1κιλού 1.2 , 2 , 2.5 , 3 , 6 , 10 , 20 και 25κιλών	Πολυαιθυλένιο ή Πολυαιθυλένιο – Πολυεστέρας ή Πολυαιθυλένιο – Πολυεστέρας – Αλουμίνιο πάχους 150μ.
3.	Σάκοι	2,5 , 3 , 5 , 6 , 10 , 20 και 25 κιλών	Propylene/πολυαιθυλένιο ή Χαρτόσακος πολλαπλών στρώσεων με εσωτερική επένδυση πολυαιθυλένιο ή με εσωτερικό σακίδιο πολυαιθυλένιο.

5

5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		Γρ./ στρ. (max)	Γρ./ 100 λίτρα υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		

-Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά)	Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i> , <i>V. pirina</i>)	200	150-200	50-100	Εφαρμογές στα στάδια της πράσινης, ρόδινης /λευκής κορυφής, πτώσης πετάλων και 7-10 μέρες αργότερα.	Μέχρι 4 εφαρμογές εφόσον απαιτείται
-Αμπέλι (επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο)	Περονόσπορος (<i>Plasmopara viticola</i>) Φόμοψη (<i>Cryptosporella Phomopsis viticola</i>) Μαύρη σήψη (<i>Guignardia bidwellii</i>)	200	200	50-100	Εφαρμογές όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ. και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων 1-3 ανοιζιάτικες εφαρμογές κατά την έκπτυξη των οφθαλμών, αμέσως μετά το σχηματισμό του 1 ^{ου} φύλλου, στο στάδιο των 2-3 φύλλων	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται
-Καρότο	Αλτερνάρια (<i>Alternaria dauci</i>)	200	220	50-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση των συμπτωμάτων της ασθένειας	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον υπάρχει πρόβλημα.
-Κρεμμύδι (ξηρό)	Περονόσπορος (<i>Peronospora destructor</i>)	250	200-250	40-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας.	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται
-Τομάτα (υπαίθρου)	Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>) Σεπτόρια (<i>Septoria lycopersici</i>) Αλτερναρίωση (<i>Alternaria solani</i>).	200	200	50-100	Εφαρμογές από το στάδιο των νεαρών σποροφύτων Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται
-Μελιτζάνα, Πιπεριά (Υπαίθρου)	Αλτερναρίωση (<i>Alternaria solani</i>)	200	200	50-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται

-Κολοκυνθο- ειδή: Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθι (Υπαίθρου)	Κλαδοσπορίωση (<i>Cladosporium cucumerinum</i>)	200	200	50-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται
-Μαρούλι (Υπαίθρου)	Περονόσπορος (<i>Bremia lactucae</i>)	200	200	60-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται
-Πατάτα	Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>) Αλτερναρίωση (<i>Alternaria solani</i>)	200		50-100	Εφαρμογές όταν τα φυτά έχουν ύψος περίπου 15-20 εκ., μετά από 7 ημέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση.	Μέχρι 8 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται

Παρατηρήσεις:

- Να μην χρησιμοποιούνται ως τροφή τα αμπελόφυλλα σε περίπτωση χρήσης του **MANCORON 80WP**.
- Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας
- Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο της έντασης της προσβολής
- Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται τα προγράμματα γεωργικών προειδοποιήσεων να ακολουθούνται οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων
- Η χρήση στο σκόρδο (υπαίθρου) θα χορηγηθεί όταν και εάν καθοριστούν στον κανονισμό 396/2005 MRLs σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή.

-Σκόρδο (ξηρό)	Περονόσπορος (<i>Peronospora destructor</i>)	250 γρ. σκ./ στρ	200- 250 γρ.σκ. /100L	40-100 Όγκος ψεκαστι- κού υγρού L/στρ.	Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας.	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται	PHI 28 ημέρες
---------------------------	---	---------------------------	--------------------------------	--	---	---	---------------------

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II της παρούσας

11 Φράσεις S

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
S13 Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.
S24 Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα.
S36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
S46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
 «Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική μάσκα κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατάλληλες μπότες κατά την εφαρμογή»
 «Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια εάν εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής λίγο μετά τον ψεκασμό»
«Κατά την εφαρμογή σε οπωρώνες συνιστάται η χρήση τρακτέρ με κλειστή καμπίνα»

S61 Αποφύγετε τη λευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες /δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
SP1 ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΪΑ ΤΟΥ.
SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μian απσέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες του κρεμμυδιού, (του σκόρδου), της πατάτας και **10 μέτρων** για την καλλιέργεια του αμπελιού και **30 μέτρων** για τις δενδρώδεις καλλιέργειες.

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

13 Προστασία των καταναλωτών

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργειες	PHI(ημέρες)
Αμπέλι (επιτραπέζιο και οиноποιησιμο)	28 ημέρες
Κρεμμύδι	28 ημέρες
Μαρούλι (Υπαίθρου)	28 ημέρες
Καρότο	30 ημέρες
Τομάτα, Μελιτζάνα Πιπεριά , Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθι (Υπαίθρου)	3 ημέρες
Πατάτα	7 ημέρες

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 188162/6-9-2010 Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α/α**

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ