



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 14-10-2020
Αριθ. πρωτ: 10487/277848

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 9212090
Πληροφορίες: Νίκος Παπανικολάου
Τηλέφωνο: 210 9287230
e-mail: npapanikolaou@minagric.gr

Προς: **Belchim Crop Protection Greece ΜΕΠΕ**
Ακτή Μιαούλη 93, 185 38 Πειραιάς
(δια της εταιρείας
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.
«Agribiz»
Ξενίας 1, 115 27 Αθήνα)
e-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 70173 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) PROMAN (metobromuron 50% β/ο) ως προς τον υπεύθυνο επικοινωνίας, τα εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος, τις συσκευασίες, τις οδηγίες χρήσης, την κατηγορία και τον τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, το χρονικό διάστημα ασφάλειας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργεια και της σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν, τις δηλώσεις προφύλαξης και τις πρώτες βοήθειες, καθώς και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 40 και 45 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τα με αριθ. πρωτ. 11384/272404/24-10-2019 και 12004/286623/7-11-2019 έγγραφα της Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης (Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο).
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/195 της Επιτροπής της 3ης Φεβρουαρίου 2017 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών που περιλαμβάνονται στο μέρος Β του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 686/2012 (πρόγραμμα ανανέωσης AIR IV).
5. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης" και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
6. Την αριθ. 4933/75184/25-05-2018 (Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας.
7. Το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ».

8. Το με αριθ. 10487/277848/06-10-2020 έγγραφο της Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης (Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο).
9. Τις με αριθ. πρωτ. 11412/150861/02-11-2018, 2468/43664/05-03-2019 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε τη με αριθ. 70173 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) PROMAN (metobromuron 50% β/ο), που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 9145/99824/12.09.2016 απόφασή μας, ως προς τον υπεύθυνο επικοινωνίας, τα εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος, τις συσκευασίες, τις οδηγίες χρήσης, την κατηγορία και τον τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές, υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, το χρονικό διάστημα ασφάλειας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργεια και της σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν, τις δηλώσεις προφύλαξης και τις πρώτες βοήθειες, καθώς και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Συγκεκριμένα, τα σημεία 1.4α,δ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Belchim Crop Protection Greece ΜΕΠΕ
Ακτή Μιαούλη 93
185 38 Πειραιάς
Τηλ.: 210 4290620

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz»
Ξενίας 1, 115 27 Αθήνα
Τηλ.: 210 7471000
Φαξ: 210 7471009
E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος

1. Phyteurop S.A.
ZI Grande Champagne,
49260 Montreuil-Bellay, Γαλλία
2. Arysta LifeScience SAS
Route d'Artix
64 150 Noguères
Γαλλία
3. Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG
Stader Elbstraße 28
21683 Stade, Γερμανία

2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	200 κ.εκ. έως 2 λίτρα	HDPE, HDPE-F (φθοριωμένο HDPE), HDPE/PA ή COEX
2	Φιάλη μέσα σε κουτί	200 κ.εκ. έως 500 κ.εκ.	HDPE, HDPE-F (φθοριωμένο HDPE), HDPE/PA ή COEX Κουτί χάρτινο
3	Δοχείο	2 έως 15 λίτρα	HDPE/PA

3 Οδηγίες χρήσης

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ομοιόμορφος ψεκασμός σε κατάλληλα προετοιμασμένο έδαφος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Ανακινείτε το δοχείο πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέστε την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό με συνεχή ανάδευση κατά την διάρκεια του ψεκασμού. Μην προετοιμάζετε περισσότερη ποσότητα ψεκαστικού υγρού από την απαραίτητη.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Καθαρίστε με τριπλό ξέπλυμα αμέσως μετά τη χρήση. Ξεπλύνετε τη δεξαμενή και τα εξαρτήματά της τρεις φορές με καθαρό νερό μέχρι ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος να έχουν απομακρυνθεί.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα:

Το Proman® δεν χρησιμοποιείται μαζί με άλλα προϊόντα.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης

Το Proman® είναι εκλεκτικό προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο ετήσιων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων σε διάφορες καλλιέργειες. Η δ.ο. metobromuron απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και δευτερευόντως από τα φύλλα. Αναστέλλει την φωτοσύνθεση με αποτέλεσμα την καταστροφή των ζιζανίων.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιαστήματα εφαρμογής
		κ.εκ./ στρέμμα	κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψ.υ. λίτρα /στρ.		
Πατάτα SOLTU	Πλατύφυλλα ζιζάνια και ορισμένα ετήσια αγρωστώδη	400	1334 – 2000	20 – 30	Προφυτρωτικά, με καθολικό ψεκάσμο της επιφάνειας του εδάφους. (BBCH 00-08)	1
Ηλίανθος HELAN	Πλατύφυλλα ζιζάνια και ορισμένα ετήσια αγρωστώδη	200-300 ⁽³⁾	--	20 – 30	Προφυτρωτικά, με καθολικό ψεκάσμο της επιφάνειας του εδάφους. (BBCH 00-08)	1
Σόγια GLXMA	Πλατύφυλλα ζιζάνια και ορισμένα ετήσια αγρωστώδη	200-300 ⁽³⁾	--	20 – 30	Προφυτρωτικά, με καθολικό ψεκάσμο της επιφάνειας του εδάφους. (BBCH 00-08)	1

Παρατηρήσεις:

1. Το **Proman**[®] πρέπει να εφαρμόζεται πριν την εμφάνιση των ζιζανίων. Η δραστηριότητα μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες.
2. Η εδαφική υγρασία ευνοεί τη δραστηριότητα του προϊόντος. Για καλύτερη αποτελεσματικότητα, η εφαρμογή πρέπει να γίνεται όταν το έδαφος είναι στο ρώγο του.
3. Η δόση εφαρμογής εξαρτάται από τον τύπο του εδάφους. Σε αμμώδες έδαφος (ποσοστό της άμμου μεγαλύτερο από 65%) ή σε έδαφος με περιεκτικότητα σε οργανική ουσία μικρότερη από 3%, να μειώσετε τη δόση σε 200 κ.εκ./στρ. Προβλήματα εκλεκτικότητας μπορούν να εμφανιστούν σε αυτά τα εδάφη σε περίπτωση μεγάλης βροχόπτωσης μετά την εφαρμογή.
4. Ψεκάστε σε κατάλληλα προετοιμασμένο έδαφος.

ΠΑΤΑΤΑΚαταπολεμούμενα - ευαίσθητα ζιζάνια:

Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima- BEAVA (Τεύτλο)
Bidens tripartita – BIDTR (Αγριοκατιφές, Διόδοντο το τριμερές)
Chenopodium album - CHEAL (Λουβουδιά)
Digitaria sanguinalis - DIGSA (Αιματόχορτο)
Diploaxis erucoides - DIPER
Echinochloa crus-galli - ECHCG (Μουχρίτσα)
Fallopia sp. - FOPSS (Πολύγωνο)
Fallopia convolvulus - POLCO (Άγριο Φαγόπυρο-Αναρριχώμενο πολύγωνο)
Lolium rigidum - LOLRI (Λεπτή ήρα)
Matricaria chamomilla - MATCH (Χαμομήλι)
Rosa annua - ROAAN (Κοινή πόα)
Polygonum aviculare - POLAV (Πολυκόμπι)
Polygonum lapathifolium - POLLA (Λαπάτσα – πολύγωνο λαπαθόφυλλο)

Portulaca oleracea - POROL (Αντράκλα-γλυστρίδα)
Reseda phyteuma - RESPH
Senecio vulgaris - SENVU (Μαρτιάκος)
Sinapis arvensis - SINAR (Βρούβα-λαψάνα-άγριο σινάπι)
Solanum nigrum - SOLNI (Στύφνος-αγριοντοματιά)
Sonchus arvensis- SONAR (Πολυετής ζωχός)

Καταπολεμούμενα - Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:

Aethusa cynapium - AETCY (Αιθούσα)
Amaranthus albus- AMAAL (Άσπρο βλήτο)
Amaranthus retroflexus - AMARE (Τραχύ βλήτο)
Convolvulus arvensis - CONAR (Περιπλοκάδα)
Diplotaxis erucooides - DIPER
Euphorbia chamaesyce - EPHCH (Χαμαισική)
Fumaria officinalis - FUMOF (Καπνόχορτο)
Mercurialis annua - MERAN (Σκαρολάχανο)
Setaria adhaerens - SETAD (Σετάρια)

ΣΟΓΙΑ-ΗΛΙΑΝΘΟΣ

Καταπολεμούμενα - ευαίσθητα ζιζάνια:

Amaranthus retroflexus - AMARE (Τραχύ βλήτο)
Centaurea sp.- CENSS (Κενταύρια)
Chenopodium album - CHEAL (Λουβουδιά)
Digitaria sanguinalis - DIGSA (Αιματόχορτο)
Echinochloa crus-galli - ECHCG (Μουχρίτσα)
Polygonum aviculare - POLAV (Πολυκόμπι)
Portulaca oleracea - POROL (Αντράκλα-γλυστρίδα)
Solanum nigrum - SOLNI (Στύφνος-αγριοντοματιά)

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Διαχείριση Ανθεκτικότητας

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης και η εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης ζιζανίων όπως αμειψισπορά, μηχανική μέθοδος, κ.λ.π., όπου αυτό είναι δυνατό.

Μη φυτεύετε φυλλώδη ψυχανθή ή σιτηρά σε λιγότερο από 120 ημέρες από την εφαρμογή του σκευάσματος.

Σε περίπτωση που φυτεύονται ριζωματώδεις καλλιέργειες σε λιγότερο από 120 ημέρες από την τελευταία εφαρμογή του σκευάσματος, μην χρησιμοποιείτε τα εναέρια μέρη των εν λόγω καλλιεργειών για ζωτροφή.

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας όπου εφαρμόστηκε το σκεύασμα σε δόση 200 – 300 κ.εκ./στρ. μπορούν να σπαρθούν/φυτευτούν: πατάτα μετά από επιφανειακή κατεργασία του εδάφους ή καλαμπόκι, φασόλια, μπιζέλια, καρότα, μετά από βαθύ όργωμα.

- σποράς ή φύτευσης των καλλιιεργειών που ακολουθούν

Σε χωράφι όπου εφαρμόστηκε το σκεύασμα σε δόση 200 – 300 κ.εκ./στρ θα πρέπει να γίνει βαθύ όργωμα πριν την σπορά/φύτευση με τις ακόλουθες καλλιέργειες: σταυρανθή, τεύτλα.

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

48 ώρες

11

Δηλώσεις προφύλαξης

P102+405: Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.

P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν τη χρήση.

P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ενδυμασία ατομικής προστασίας.

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Φοράτε γάντια, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και μπότες κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.

Κατά την επανείσοδο στον αγρό μετά τον ψεκασμό φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας.

SP1 Μην ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από αυλές αγροκτημάτων ή περιφερειακές οδούς.

Spe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, αφήστε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης:

- 20 μέτρων για την καλλιέργεια της πατάτας

- 10 μέτρων για τις καλλιέργειες σόγιας και ηλίανθου

Spe3 Για να προστατέψετε φυτά μη στόχους να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη για τις καλλιέργειες της πατάτας, της σόγιας και του ηλίανθου .

EUH401: «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

12 Πρώτες βοήθειες
- Αντίδοτο

P301+P312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Μην προκαλείτε εμετό όταν ο παθόντας έχει χιάσει τις αισθήσεις. Ξεπλύνετε σχολαστικά το στόμα με νερό. Συμβουλευθείτε γιατρό.

P308+313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Αν τα συμπτώματα επιμένουν, ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση εισπνοής: Κρατείστε τον ασθενή ήρεμο και μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ενδύματα και πλύντε το δέρμα με σαπούνι και άφθονο νερό. Συμβουλευθείτε γιατρό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Το metobromuron μπορεί να προκαλέσει τον σχηματισμό μεθαμσοφαιρίνης. Αντίδοτο: Κυανό του μεθυλενίου.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Όλες οι καλλιέργειες	Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος (προφυτρωτικά)

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 9145/99824/12-09-2016 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
κ.α.α.

Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ