



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Αθήνα, 26-08-2014
Αριθ. πρωτ: 8936/98214**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7211
e-mail: syg046@minagric.gr**

**Προς: Greenfarm Χημικά Α.Ε.
Μεσογείων 467 & Γούναρη 40
15343-Αγία Παρασκευή**

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 60.187 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) MYSTIC 25 EC (δραστική ουσία: tebuconazole), ως προς το φάσμα δράσης, τα εργοστάσια παρασκευής της δραστικής ουσίας, τα εικονογράμματα κινδύνου (πρώην σημάνσεις), τις δηλώσεις κινδύνου (πρώην φράσεις κινδύνου), τις δηλώσεις προφύλαξης (πρώην φράσεις προφύλαξης) και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή»

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο**

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 80 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον Κανονισμό 1272/08 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-12-08 “για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006”, καθώς και τη με αριθ. 7923/87577/12.7.13 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
4. Τον Κανονισμό 61/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24-1-14, “για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες cyromazine, fenpropidin, formetanate, oxamyl και tebuconazole μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα”.
5. Τη με αριθ. 462/106101/3.9.13 (ΦΕΚ 2240/Β'10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”».
6. Το σχετικό Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
7. Τις με αριθ. πρωτ. 3622/39257/24.3.14, 8465/93076/17.7.14 και 8936/98214/30.7.14 αιτήσεις της εταιρείας Greenfarm Χημικά ΑΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Α. Τροποποιούμε την με αριθ. **60.187** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (**μυκητοκτόνο**) **MYSTIC 25 EC** (δραστική ουσία: tebuconazole), που χορηγήθηκε με τη αριθ. 119461/2.6.08 Απόφασή μας και τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 186830/2.7.10, 93731/1.3.11 και 6585/68137/15.10.12 Αποφάσεις μας, ως προς το φάσμα δράσης, τα εργοστάσια παρασκευής της δραστικής ουσίας, τα εικονογράμματα κινδύνου (πρώην σημάνσεις), τις δηλώσεις κινδύνου (πρώην φράσεις κινδύνου), τις δηλώσεις προφύλαξης (πρώην φράσεις προφύλαξης) και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή. Οι παράγραφοι 1.3δ 5, 9, 10, 11 και 13.2 της με αριθ. 186830/2.7.10 Απόφασής μας, διαμορφώνονται ως ακολούθως:

1.3δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
 Astec LifeScience Limited
 B-16 / 17 M.I.D.C.,
 Mahad 402 302,
 Dist: Raigad,
 Maharashtra,
 India.
 και
 Shangyu Nutrichem Co., Ltd.
 No. 9 Weijiu Road,
 Hangzhou Gulf Fine Chemical Zone,
 Zhejiang, 312369,
 CHINA

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες
		κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα	κ.εκ./ στρέμμα (Μέγιστο)		
Μηλιά	<i>Φουζικλάδιο</i> (<i>Venturia inaequalis</i>)	40	100-150	60	Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του παθογόνου από την πράσινη κορυφή μέχρι την πτώση των πετάλων και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από τους DMIs Θεραπευτικές εφαρμογές μόνο κατόπιν σχετικής σύστασης από τα Κέντρα των γεωργικών προειδοποιήσεων.	2/14
Ροδακινιά, Νεκταρινιά	<i>Ωίδιο</i> (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	50	150	75	Εφαρμογές από το στάδιο της εμφάνισης του καρπιδίου έως την πλήρη ωρίμανση και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από τους DMIs.	2/14

	<i>Μονίλια</i> (<i>Monilinia laxa</i>)	50-75*	100-150*	75	Μία (1) εφαρμογή για προστασία των ώριμων καρπών πριν από τη συγκομιδή και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Η μεγάλη δόση να εφαρμόζεται μόνον εφόσον οι καρποί πρόκειται να αποθηκευτούν σε ψυγεία μετά τη συγκομιδή τους.	
Αμπέλι (Επιτραπέζιες ποικιλίες)	<i>Ωίδιο</i> (<i>Uncinula necator</i>)	40	80-100	40	Εφαρμογές από την έναρξη της άνθησης μέχρι το τέλος της άνθησης ανά 12-14 ημέρες.	2/12-14
Αμπέλι (Οινοποιήσιμες ποικιλίες)	<i>Ωίδιο</i> (<i>Uncinula necator</i>)	40	80-100	40	Εφαρμογές από το στάδιο της καρπόδεσης μέχρι το κλείσιμο της σταφυλής ανά 12-14 ημέρες.	2/12-14
Σπαράγγι	<i>Σκορίαση</i> (<i>Puccinia asparagi</i>)	100	100	100	Εφαρμογές μετά τη συγκομιδή από Ιούλιο μέχρι Σεπτέμβριο εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας με μεσοδιάστημα 14 ημέρες.	2/14

***Παρατήρηση:** Στα **Πυρηνόκαρπα** για την καταπολέμηση της **Μονίλιας** ο μεγάλος όγκος νερού (150 λίτρα/στρέμμα) να χρησιμοποιείται με τη χαμηλή δόση σκευάσματος ανά εκατόλιτρο (50 κ.εκ. σκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού) έτσι ώστε η τελική δόση να μην ξεπερνάει τα 75 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει **Υπέρβαση του Μέγιστου Επιτρεπόμενου Ορίου Υπολειμμάτων**.

9. ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:



Κίνδυνος
GHS05, GHS08, GHS09

10. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:

H315	Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H318	Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H317	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H361d	Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
H411	Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

11. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

P102	Μακριά από παιδιά.
P405	Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P270	Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P264	Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
P280	Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
	- Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.
	- Να μη χρησιμοποιείται παρουσία εγκύων γυναικών.
P302+P352	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
P333+P313	Εάν παρατηρεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευτείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
P305+P351+P338	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

ΕUH401	Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
SP1	Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Παρατήρηση: Η ανωτέρω ταξινόμηση και επισήμανση που είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, θα είναι υποχρεωτική από την 1^η Ιουνίου 2015. Μέχρι τότε το σκεύασμα δύναται να κυκλοφορεί με τη σήμανση που αναγράφεται στη με αριθ. 186830/2.7.10 Απόφασή μας.

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Μηλιά	35 ημέρες
Ροδακινιά	7 ημέρες
Νεκταρινιά	7 ημέρες
Αμπέλι (Επιτραπέζιες ποικιλίες)	Εφαρμογή μέχρι το τέλος της άνθησης
Αμπέλι (Οινοποιήσιμες ποικιλίες)	21 ημέρες
Σπαράγγι	6 μήνες

Β. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 186830/2.7.10 Απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 93731/1.3.11 και 6585/68137/15.10.12 Αποφάσεις μας.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
α/α

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ