



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

18 - 12 - 2014

Αθήνα,

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Αριθ. πρωτ: 13388/152305

**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87 161
e-mail: sygo36@minagric.gr

Προς: SINON EU GmbH
ImAltenDorfe 37 (Volksdorf),
D-22359 Hamburg/Germany
Δια μέσου της
RDP ΟΕ-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΦΑΡΙΔΗΣ
Φυλής 232, 11252 Αθήνα
E-mail: marketing@rdp.gr

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής άδειας
διάθεσης στην αγορά στο
φυτοπροστατευτικό προϊόν
(μυκητοκτόνο) SINPRO (δ.ο.
Iprodione)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 80.5 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.
4. Τον Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα

τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ 823/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με παρέκκλιση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τις ημερομηνίες λήξης της έγκρισης των δραστικών ουσιών iprodione
7. Τη με αριθ. 10791/107308/17.10.2012 (ΦΕΚ 2979/Β/8.11.2012) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία τροποποιείται η Απόφαση 124831/12.12.2007 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση προσωρινών εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 80.5 του Κανονισμού 1107/2009
8. Την έγκρισή του στην Γαλλία.
9. Το εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
10. Τη με αριθ. 462/106101 (ΦΕΚ 2240/Β/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράψουν «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού»»
11. Την από 17—1-2011 και 24/4/2014 αίτηση της εταιρείας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 80.5 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **SINPRO** της εταιρείας SINON EU GmbH Γερμανίας, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

60435
18/12/2014
31-10-2016

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

SINPRO

1.2.β Μορφή:

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ(SC)

1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες)

Δραστική ουσία 1	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	Iprodione
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	98,2 % (β/β) min
Χημική ομάδα	ομάδα δικαρβοξιμίδιων
Παρασκευαστής	<p>SINON CORPORATION No 23 Sec. 1, Mei Chuan W. Road, Taichung 40357, Taiwan</p> <p>EU CONTACT</p> <p>SINON EU GMBH Im Alten Dorfe 37 (Volksdorf) 22359 HAMBOURG Germany Mr. Hans BRANDT Tel. +49 4065995039 Mob. +49 1708643415 Fax. +49 4065995158 Email. sinoneu@aol.com</p>
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): SINON CORPORATION, No. 101, Nanrong Rd., Ta-Tu District, Taichung 43245, Taiwan, ROC
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας profoxydim, όπως αυτές κατατέθηκαν με το με αριθ. πρωτ. 92189/17-1-2011 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

<p>SINON EU GmbH ImAltenDorfe 37 (Volksdorf), D-22359 Hamburg/Germany tel: +49-406599 5039 fax: +49-406599 5158 e-mail: sinoneu@aol.com Contact: Mr Hans Brandt</p>
--

- α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:
- RDP ΟΕ-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΦΑΡΙΔΗΣ
Φυλής 232, 11252 Αθήνα
Tel.: 210 8623144/ Fax: 210 8663978
E-mail: marketing@rdp.gr
- β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)
- Μαρία Δαλαγιώργου
Θεμιστοκλή Σοφούλη 72, 54655 Θεσσαλονίκη
Τηλ.2310 415351, 6937 093057
e-mail: dalagiorgou@gmail.com
- γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:
- SINON CORPORATION, No. 23, Sec. 1, Mei Chuan W. Road, Taichung 40357, Taiwan, ROC
- δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος
- Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
SINON CORPORATION, No. 101, Nanrong Rd., Ta-TuDistrict, Taichung 43245, Taiwan, ROC
- ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος
- Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
1) SINON CORPORATION, No. 101, Nanrong Rd., Ta-TuDistrict, Taichung 43245, Taiwan, ROC
2) ΣΕΓΕ, Οινόφυτα Βοιωτίας
3) ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε., 190 14 Αφίδνες, Αττική
4) Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΕΒΕ, ΒΙΠΕΘ Σίνδος, Θεσ/νικη
- στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:
- Δραστική ουσία iprodione: 50 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 56,1% β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το με 5207/53340/24-4-2014 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας και στην έκθεση αξιολόγησης της αρμόδιας Αρχής της Γαλλίας παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ

2 Συσκευασία(ες)

2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες εντός χαρτοκουτίου	50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 900 κ.εκ και 1 λίτρο	Φιάλες πλαστικές HDPE, κουτί χάρτινο
2	Φιάλες	50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 900 κ.εκ και 1 λίτρο	Φιάλες πλαστικές HDPE
3	Δοχεία	2, 3, 4, 5, 10, 15 και 20 λίτρων	Φιάλες πλαστικές HDPE

3. Οδηγίες
χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: ΑΝΑΚΙΝΕΙΣΤΕ ΚΑΛΑ ΤΗ ΦΙΑΛΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Συνδυαστικότητα: ---

Καθαρισμός ψεκαστήρα Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. Πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε ξεπλύνετε το πάλι με άφθονο νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή με τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα ή σχίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και
τρόπος
δράσης:

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Δρα με παρεμπόδιση της ανάπτυξης του μυκηλίου και της βλάστησης των σπορίων των ευαίσθητων μυκήτων.



5 5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		Κ.εκ/ στρέμμα	Γρ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
ΑΜΠΕΛΙ	Βοτρυτής (Botrytis cinerea)	150	150-1000	15-100	στην αλλαγή του χρωματισμού των ραγών ως την πλήρη ωρίμανση	1
ΦΡΑΟΥΛΑ (ύπαιθρος, θερμοκήπιο)	Βοτρυτής (Botrytis cinerea)	150	300	50	από την άνθηση ως την πλήρη ωρίμανση	1

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II της παρούσας

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί	
---	--

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: <ul style="list-style-type: none"> - σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα 	--
	--
	Οι εργάτες μπορούν να εισέρχονται στην καλλιέργεια όπου έχει γίνει εφαρμογή μετά από 6 ώρες (ύπαιθρο) και 8 ώρες (θερμοκήπιο)

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.	Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα.
---	--

9 Προειδοποιητικές λέξεις/ Εικονογράμματα Κινδύνου	<p style="text-align: center;">Προσοχή</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  (GHS08) </div> <div style="text-align: center;">  (GHS09) </div> </div>
10 Δηλώσεις Επικινδυνότητας	<p>H351: Υποπτο για πρόκληση καρκίνου</p> <p>H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.</p> <p>EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.</p>
11 Δηλώσεις Προφύλαξης	<p>P405+102 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά</p> <p>P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.</p> <p>P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση</p> <p>P202 Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες φύλαξης</p> <p>P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.</p>

P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα**Για την προστασία του χρήστη φορέστε :**

-Κατά τη διάρκεια της ανάμειξης : Γάντια νιτριλίου σύμφωνα με το πρότυπο EN 374-3, Φόρμα εργασίας από 65% πολυεστέρα, 35% βαμβάκι 245g/m² με DWR (αδιάβροχο) και Μπλούζα προστασίας (EPI) κατηγορίας 3 και τύπου BP(3), πάνω από τη φόρμα εργασίας.

-Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής: φόρμα εργασίας από 65% πολυεστέρα, 35% βαμβάκι 245g/m² με DWR (αδιάβροχο).

Εάν η εφαρμογή γίνεται με τρακτέρ με καμπίνα: γάντια νιτριλίου σύμφωνα με το πρότυπο EN374-3 (στην περίπτωση τρακτέρ με καμπίνα νέου τύπου η χρήση γαντιών δεν είναι απαραίτητη παρά μόνο κατά τη διάρκεια εργασιών με το σύστημα εκτόξευσης και τα γάντια θα πρέπει να είναι αποθηκευμένα εκτός της καμπίνας).

Εάν η εφαρμογή γίνεται με τρακτέρ χωρίς καμπίνα: γάντια νιτριλίου σύμφωνα με το πρότυπο EN374-3 για χρήση μόνο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

Εάν η εφαρμογή γίνεται με ψεκαστήρα πλάτης ή αυλό: γάντια νιτριλίου σύμφωνα με το πρότυπο EN374-3.

-Κατά τον καθαρισμό του εξοπλισμού ψεκασμού: Φόρμα εργασίας από 65% πολυεστέρα, 35% βαμβάκι 245g/m² με DWR (αδιάβροχο) και μπλούζα προστασίας (EPI) κατηγορίας 3 και τύπου BP(3), πάνω από τη φόρμα εργασίας.

Για την προστασία του εργάτη: να φορά φόρμα εργασίας από 65% πολυεστέρα, 35% βαμβάκι 245g/m² με DWR (αδιάβροχο).

SP1 Μη ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους)

SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μian απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων για όλες τις καλλιέργειες από τα επιφανειακά ύδατα.

Για την προστασία των υπόγειων υδάτων μην εφαρμόζετε σε όξινα εδάφη (pH μικρότερο από 6).

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

P308 + P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό για 10-15 λεπτά. Αφαιρέστε τυχόν φακούς επαφής. Ζητείστε ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα. Ξεπλυθείτε καλά με νερό για 15 λεπτά. Ζητείστε ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα.

Σε περίπτωση εισπνοής: Βγάλτε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατείστε τον σε ανάπαυση, καθιστό. Ζητείστε ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύντε το στόμα με νερό (μόνο αν το άτομο έχει τις αισθήσεις του). Μην προκαλείτε εμετό. Ζητήστε ιατρική βοήθεια και δείξτε την ετικέτα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77-93-777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αμπέλι	21
Φράουλα	1

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευόμενων μελετών

Στο **Παράρτημα III** της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει μέχρι την 31^η/12/2015 να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα:

Μία ενδοεργαστηριακή αξιολόγηση (ILV) της μεθόδου Ανάλυσης για τον καθορισμό του IPRODIONE στα τρόφιμα ζωϊκής προέλευσης.

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ ηλεκτρονικά τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α/α

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ