



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 09.04.2014
Αριθ. πρωτ: 4685/47174

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
ΤΕΛΕΦΑΧ: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Δ. Πιταροκοίλη
Τηλέφωνο: 210 92 87 254
e-mail: syg081@minagric.gr

Προς: Quena Plant Protection, N.V.
Pos Cabai Office Park, Unit 13,
P.O. Box 403, Curacao
Διά της αντιπροσώπου εταιρείας
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

ΘΕΜΑ: “Α. Επανεγκριση της οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) GOLTIX 70 SC.
Β. Ανάκληση της με αριθ. 7600 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) GOLTIX 70 SC»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και και ειδικότερα τα άρθρα 43 και 80 παρ. 5 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.
4. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο έχει συμπεριληφθεί η δραστική ουσία metamitron.
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
7. Τη με αριθ. Πρωτ. 462/106101 (ΦΕΚ 2240/Β/10.09.2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους

Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράψουν «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού».

8. Την από 28.11.2011 αίτηση της εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.
9. Το Εισηγητικό Σημείωμα της Υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με τα άρθρα 43 και 80 παρ. 5 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **GOLTIX 70 SC** της εταιρείας **Quena Plant Protection, N.V.**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

70.079
09.04.2014
31.08.2020

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
- 1.2.β Μορφή:

GOLTIX 70 SC
Συμπυκνωμένο Αιώρημα (SC)

1.3 Δραστικές ουσίες

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Metamitron

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

98% β/β min

Χημική ομάδα

τριαζιόνες

Παρασκευαστής

<p>Agan Chemical Manufacturers Ltd. Northern Industrial Zone, P.O. Box 262, Ashdod 77102, Israel Dr. Tali Ehrlich Tel.: +972 7 3232 1330 Fax: +972 7 3232 1505 Email: tali.ehrlich@ma-industries.com</p>

<p><i>Με εκπρόσωπο στην Ευρώπη</i> FEINCHEMIE SCHWEBDA GmbH Edmund Rumpler Strasse 6, 51149 Cologne , Germany Wolfgang Busch Tel: +49-(0)2203-5039-000 Fax: +49-(0)2203-5039-111 Email: wolfgang.busch@fcs-feinchemie.com</p>
--

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

Hebei WanQuan HongYu Chemical Co. Ltd.

Guoleizhuang, Wanquan, Zhangjiakou

Hebei Province 076271, Κίνα

Mr. Lu Zhengquan

Tel: +86-313-4831054

Fax: +86-313-4833001

Punjab Chemicals and Crop Protection Ltd.

Milestone 18, Ambala Kalka Road

P O Bhankhanpur, Derabassi

Dist SAS Nagar (Mohali) – 140201

Punjab, Ινδία

Shalil Shroff

Tel:+91 22 26747900

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως αυτές κατατέθηκαν με το αριθ. πρωτ. 131667/26-8-2009 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Quena Plant Protection, N.V.

Pos Cabai Office Park, Unit 13, P.O. Box 403, Curacao.

Mr. David Hebel

Τηλ: 00599-9-738-4040

Fax: 00599-9-738-4005

E-mail: quena@macuracao.com

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 73,

T.K.152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Τηλ.: 211 120 5570

Fax.: 211 120 5572

E-mail: technical@alfagro.gr

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 73,

T.K.152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Τηλ.: 211 120 5570

Fax.: 211 120 5572

E-mail: technical@alfagro.gr

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Agan Chemical Manufacturers Ltd.

Northern Industrial Zone P.O. Box 262

77102 Ashdod, Ισραήλ

Dr. Shlomo Windreich

Telephone number: +972 8 8515331

Fax: + 972 8 8522806

E-mail: Shlomo.W@agan.co.il

ε) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
Agan Chemical Manufacturers Ltd.
 Northern Industrial Zone P.O. Box 262
 77102 Ashdod, Ισραήλ
 Dr. Shlomo Windreich
 Telephone number: +972 8 8515331
 Fax: + 972 8 8522806
 E-mail: Shlomo.W@agan.co.il

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Agan Chemical Manufacturers Ltd.
 Northern Industrial Zone P.O. Box 262
 77102 Ashdod, Ισραήλ
 Dr. Shlomo Windreich
 Telephone number: +972 8 8515331
 Fax: + 972 8 8522806
 E-mail: Shlomo.W@agan.co.il

2. ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ ,
 Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτία
 32 011 –Οινόφυτα ,Βοιωτία
 Τηλ. 22620-30821-3
 Φαξ. 22620-30820
 e-mail: nikos.kosmidis@alfagro.gr

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: 70% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 40,5% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2

Συσκευασίες

2.2 Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλες	500 κ.εκ. & 1 λίτρο	Πλαστικό HDPE
2.	Δοχεία	5 λίτρα	Πλαστικό HDPE
3.	Δοχεία	10 λίτρα	Πλαστικό Co-extruded HDPE
4.	Δοχεία	20 λίτρα	Πλαστικό HDHMWPE

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους, με μπεκ τύπου σκούπας, πίεση ψεκαστικού μέχρι 3 ατμ., με σταθερή ταχύτητα και υπό συνεχή ανάδευση

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Ανακινείτε καλά το δοχείο/φιάλη πριν από την χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος με τον αναδευτήρα σε λειτουργία. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό & απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό

Συνδυαστικότητα:

Στις μεταφυτρωτικές εφαρμογές μπορεί να εφαρμοστεί σε μίγμα με το ETHOFUMESATE ΑΛΦΑ 50 SC ή το ETHOSAT 50 SC.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για τη καταπολέμηση ετησίων πλατύφυλλων ζιζανίων στις καλλιέργειες ζαχαρότευτλα και κτηνοτροφικά τεύτλα . Απορροφάται κυρίως από τις ρίζες αλλά και από το φύλλωμα των ζιζανίων. Αναστέλλει την φωτοσύνθεση.

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά Καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ		
Ζαχαρότευτλα και κτηνοτροφικά τεύτλα	Για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων ζιζανίων (4)	200 -400 50-200 (3)	35-40	α. Προφυτρωτικά, αμέσως μετά τη σπορά: Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους (1) και Μεταφυτρωτικά: Ψεκασμός μετά το φύτευμα των τεύτλων όταν τα τεύτλα έχουν 2-4 φύλλα και τα ζιζάνια έως 4-6 φύλλα. (2)	1 1 - 3
	Για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων ζιζανίων (4)	100	20-50	β. Μεταφυτρωτικά: Ψεκασμός μετά το φύτευμα των τεύτλων όταν τα τεύτλα έχουν 2-4 φύλλα και τα ζιζάνια έως 4-6 φύλλα. (2)	3
	Για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων ζιζανίων (5)	(200-250) + (120-150) ETHOFUM ESATE ΑΛΦΑ 50 SC ή ETHOSAT 50 SC	30	γ. Προφυτρωτικά, αμέσως μετά τη σπορά: Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους	1
	Για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων ζιζανίων (6)	(62.5-100) + (37.4-60) ETHOFUM ESATE ΑΛΦΑ 50 SC ή ETHOSAT 50 SC	25	δ. Μεταφυτρωτικά: Ψεκασμός μετά το φύτευμα των τεύτλων όταν τα τεύτλα έχουν 2-4 φύλλα και τα ζιζάνια έως 4-6 φύλλα.	3

Παρατηρήσεις:

1. Η προφυτρωτική εφαρμογή συνιστάται σε εδάφη με επιφανειακή υγρασία και καλή προετοιμασία. Να αποφεύγεται η εφαρμογή σε πολύ ελαφρά ή σε οργανικά εδάφη. Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται εάν ακολουθηθεί βροχή ή τεχνητή βροχή.
2. Η μεταφυτρωτική εφαρμογή δίνει καλύτερα αποτελέσματα από τη προφυτρωτική σε βαρεία εδάφη. Ο ψεκασμός γίνεται από το στάδιο των δύο πρώτων πραγματικών φύλλων των τεύτλων όταν δεν έχει προηγηθεί ψεκασμός προφυτρωτικά ή ψεκάστηκε μόνο GOLTIX και από το στάδιο των τεσσάρων πραγματικών φύλλων όταν έχει προηγηθεί προφυτρωτικός ψεκασμός με άλλα ζιζανιοκτόνα.
3. Η συνολική ποσότητα σκευάσματος / καλλιεργητική περίοδο δεν πρέπει να ξεπεράσει τα 500 κ.εκ./στρ.

4. Καταπολεμούμενα ζιζάνια**Προφυτρωτική + μεταφυτρωτικές εφαρμογές****Ευαίσθητα ζιζάνια:**Λουβουδιά (*Chenopodium album*)Τάτουλας (*Datura stramonium*)**Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:**Αγριομελιτζάνα (*Xanthium strumarium*)Πολυκόμπι (*Polygonum aviculare*)**Μεταφυτρωτικές εφαρμογές****Ευαίσθητα ζιζάνια:**Αγριοτοματιά (*Solanum nigrum*)Βλήτα (*Amaranthus retroflexus*)Ηλιοτρόπιο (*Heliotropium eurpaeum*)Λουβουδιά (*Chenopodium album*)Τάτουλας (*Datura stramonium*)**5. Καταπολεμούμενα ζιζάνια****Ευαίσθητα ζιζάνια:**Λουβουδιά (*Chenopodium album*)Ζωχός (*Sonchus oleraceus*)**Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:**Τσουκνίδα (*Urtica urens*)Πικρίς (*Picris echioides*)Καπνόχορτο (*Fumaria officinalis*)**6. Καταπολεμούμενα ζιζάνια****Ευαίσθητα ζιζάνια:**Βλήτα (*Amaranthus retroflexus*)Αγριοτοματιά (*Solanum nigrum*)**Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:**Λουβουδιά (*Chenopodium album*)

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί.

Για αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, να χρησιμοποιούνται ζιζανιοκτόνα διαφορετικών χημικών ομάδων, με διαφορετικούς τρόπους δράσης στα ίδια χωράφια.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προσ-τατευόμενης καλλιέργειας

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας μπορούν να σπαρούν, εκτός από Ζαχαρότευτλα και κτηνοτροφικά τεύτλα, αρακάς, κουκιά, πατάτες καθώς και αραβόσιτος αφού προηγηθεί άροση (15-20 εκ.).

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

Μην σπέρνετε ή φυτεύετε άλλη καλλιέργεια, εκτός από τις παραπάνω,

πριν περάσουν τουλάχιστον 4 μήνες από την εφαρμογή και αφού γίνει άροση και καλλιέργεια του εδάφους σε βάθος 15 – 20 εκ.

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

103 ημέρες για την είσοδο των ζώων.

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό (1 ημέρα) για τους ανθρώπους.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Είναι εκλεκτικό για την καλλιέργεια των ζαχαρότευτλων και κτηνοτροφικών τεύτλων και δεν παρουσιάζει καμία φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης και τον τρόπο εφαρμογής.

Σε περιπτώσεις έντονης ηλιοφάνειας και υψηλής θερμοκρασίας συνιστάται ο ψεκασμός να γίνεται τις απογευματινές ώρες.

9 Εικονογράμματα κινδύνου – Προειδοποιητικές λέξεις



GHS07



GHS09

ΠΡΟΣΟΧΗ

10 Δηλώσεις επικινδυνότητας

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

11 Δηλώσεις προφύλαξης

P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτικά ενδύματα.

«Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση».

«Φοράτε κατάλληλα γάντια, ολόσωμη φόρμα και μπότες κατά την εφαρμογή»

«Συνιστάται η εφαρμογή του προϊόντος να γίνεται με τρακτέρ με κλειστή καμπίνα».

«Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν γάντια, ολόσωμη φόρμα και μπότες εάν εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής λίγο μετά τον ψεκασμό».

SP1 Μην ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

SPe3 Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη από μη γεωργική γη:

- **10 μέτρων** όταν χρησιμοποιείτε συμβατικά ακροφύσια ή
- **5 μέτρων** με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.
- Δεν απαιτείται απέκαστη ζώνη προστασίας με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90%.

EUH208: «Περιέχει ένα μίγμα 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση».

EUH 401 «Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

P301+312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

P330: Ξεπλύνετε το στόμα.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε το παθόντα στο καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : (210) 7793777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Για τις όλες τις καλλιέργειες, έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή της ΕΕ κοινοτικά Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) με την αιτούμενη Ο.Γ.Π. (Ορθή Γεωργική Πρακτική)

13.1 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Ζαχαρότευτλα και κτηνοτροφικά τεύτλα	Δεν ορίζεται, λόγω του χρόνου εφαρμογής του προϊόντος

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, καλά κλειστό, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχεθήκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο Παράρτημα III της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει μέχρι **09-04-2017** να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα:

Πειράματα αποτελεσματικότητας για την καταπολέμηση των:

- *Amaranthus retroflexus*, *Solanum nigrum* και *Heliotropium europaeum* κατόπιν 3 μεταφυτρωτικών εφαρμογών του GOLTIX 70 SC (1 L/ha ανά εφαρμογή).

- *Polygonum aviculare*, *Datura stramonium* και *Xanthium strumarium* μετά από 1 προφυτρωτική και 2 μεταφυτρωτικών εφαρμογών του GOLTIX 70 SC (2 L/ha, 1 L/ha, και 2 L/ha, αντίστοιχα).
- *Amaranthus retroflexus*, *Chenopodium album* και *Solanum nigrum* κατόπιν 3 μεταφυτρωτικών εφαρμογών του GOLTIX 70 SC σε tank mix με το Ethofumesate 50 SC (ethofumesate) στις δόσεις 0.625 L/ha + 0.374 L/ha (1^ο σενάριο) ή 0.75 L/ha + 0.45 L/ha (2^ο σενάριο) ή 1 L/ha + 0.6 L/ha (3^ο σενάριο).

B

Ανακαλούμε τη με αριθ. **7600** έγκριση κυκλοφορίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνου) **GOLTIX 70 SC**, η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 89088/29.02.2000 Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Συγκεκριμένα :

1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση του σκευάσματος από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για 3 μήνες ακόμη (έως **09/07/2014**).
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις χονδρικής και λιανικής πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων για έξι επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας (έως **09/10/2014**).
3. Επιτρέπεται τη χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα επιπλέον έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω (έως **09/10/2015**).
4. Ορίζεται ότι τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες του σκευάσματος μετά το πέρας των ορισθεισών προθεσμιών, θα πρέπει να επιστραφούν στον υπεύθυνο για τη διάθεση του σκευάσματος στην αγορά για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.
5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Γ

Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
α/α**

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ